

# HERBÁŘ.



## Seznam všech léčivých bylin

v Čechách a na Moravě buď volně v přírodě rostoucích neb i v zahradách pěstovaných, jichž se v domácnosti jako léku upotřebovalo a některých až posud upotřebuje,

s udáním,

proti kterým nemocim a jakým způsobem se jich užívá, jak u lidí, tak i u dobytka,

který čas pro lékárny se sbírají,

jakož i k čemu v hospodářství a průmyslu užitečny jsou,

a seznam rostlin jedovatých, kterých jest se chrániti.

Sepsal

MDr. VLADISLAV ŠÍR.

• ⊗ • Se 157. vyobrazeními rostlin. • ⊗ •



V PRAZE 1889.

NAKLADATEL M. KNAPP, KNIHKUPEC  
V KARLÍNĚ



## Předmluva.

---

Nikdo na světě nemá snad tolik pomáhačů jako lékař. Každý, kdo nemocného navštíví, ví mu co raditi. Často jest to soucit, který člověka povzbuzuje, aby svému příteli poradil a pomohl, zvláště když jej to nic nestojí, leda několik slov. Často však se nacházejí lidé, kteří z podobné porady hledí míti zisk, kteří neoprávněným léčením se zabývají a celou moudrost ze staletých herbářů čerpají.

Starý herbář není od nich za žádnou cenu k dostání, neb v něm leží poklad náramný, který přechází v rodině z jednoho dědice na druhého. Každý z potomků v herbáři čtoucí nabývá slávy a vážnosti ve své dědině a chová knihu pod zámek uzavřenou, aby nikdo jiný učenosti z ní nenabyl. Málo komu ji ukáže, jedině se chlubí, že rozumí všemu a že to má z herbáře, jakého jinde na světě již ani není.

Staré knihy nejsou k zavržení, jest v nich mnoho dobrého, však pro náš věk velmi mnoho již nepotřebného. Starých herbářů ani není tak mnoho, za to však tradicí rozšířilo se domácí léčení takovou měrou, že snad není domu — zvláště na venkově — kde by nějaké koření k užívání nebylo uschováno. Jsou vesnice, že tam nebývá lékař k nemocnému nikdy povolán; léčí tam lidé, kteří buď přímo dle herbáře, neb dle návodu, od jiných předchůdců jim sděleného, nějakých znalostí rostlin nabyli a svým stářím u občanů důvěry si získali.

Ovšem bývá takové léčení velmi často nemocnému ku škodě, proto že se obyčejně léčí, aniž by se vědělo, co vlastně

nemocnému schází, a kde příčina nemoce, která by se měla odstraniti, vězí. Záleží totiž hlavně a nejdříve na tom, poznati a zjistiti nemoc, což ovšem může jedině lékař, který v nemocnici dlouholetým a bedlivým pozorováním se tomu naučil a pak i další praxí zkušenosti nabyt.

Knížek, pod jménem „Domácí lékař“, „Domácí přítel“ atd. vyšlo již tiskem dost, zvláště v Německu, a v mnohých rodinách se dle nich léčí. Často však se stává, že přece lékař bývá povolán, zvláště za tou příčinou, jen aby se vyjádřil, co nemocnému vlastně je. Když pak nemoc se ví, poděkuje se lékaři za další návštěvy, otevře se knížka, vynajde se od lékaře označená nemoc a léčí se dále, avšak opět nejistě a na mnoze chybně, proto že nemoc nemá vždy stejný, pravidelný průběh a často spojena bývá s jinými ještě vedlejšími příznaky neb nemocemi.

To však nezabrání domácímu léčení i kdyby se všechny slabé stránky jeho dopodrobna vylíčily; lid od něho neupustí.

Známo je vůbec, že nemocný, i kterého lékař ošetřuje, dostává mimo to potaji rozličné domácí prostředky, a že se konečně řekne, ty že pomohly, když nemocný se pozdravil.

Zvyk ten je tak zakořeněn, že se nedá vypuditi. Někde se dá i omluviti, zvláště při chudší třídě, která nemá peněz ani na lékaře ani do lékárny, a hledí si pomoci neb alespoň ulehčiti prostředky domácími; jinde opět na odlehlých místech, kde se hledí nemocnému poskytnouti prozatím něčeho, nežli lékař, někdy i dosti vzdálený, přijde.

Vzhledem k těmto a podobným okolnostem, jakož i k poučení má posloužit knížka tato. Pojednává o bylinách našich, volně v přírodě rostoucích nebo i v zahradách pěstovaných, jichž se v domácnosti jako léku upotřebovalo a některých až posud upotřebuje s udáním, proti kterým nemocem a jakým způsobem se jich užívá. Udává dále rostliny, které ještě nyní v lékárnách se chovají a v který čas se sbírají a pak rostliny jedovaté, kterých jest se chrániti. Konečně uvádí mezi nimi jednotlivé, proti některým nemocem dobytka doporučené, mnohé pak rozličným způsobem v hospodářství a průmyslu užitečné.

Jest to proti starým silným herbářům malá knížečka, avšak ještě dosti objemná a obšírná. Z kalendáře vzadu připojeného sezná každý, jak málo bylin v lékárnách se upo-

třebuje. Většina z nich jest tam na skladě jedině pro lidi, kteří je pro domácí léčení sami nenasbírali a po krejcarech kupují. Zbývá jich pouze několik, které od lékařů bývají předpisovány.

Z toho lze nejlépe poznati, jak klesla cena všech těch za dávných časů vychválených bylin, které zaznamenány jsou ve starých herbářích, na kterých až posud lid se vši důvěrou a láskou lpí, dle nich se řídí a léčí.

Že přišly přemnohé byliny v lékařství v zapomenutí, stalo se tím, že pokrokem vědy vynašly se léky mnohem lepší a mocnější, kterými lékař rychleji, jednodušeji a jistěji může účinkovati. Dále bylo shledáno, že mnohé dříve vychvalované byliny, ani těch účinků nemají, jakých se jim přisouvalo a mnohé byly uznány v rukou neznalých za škodlivé i životu lidskému nebezpečné.

V knížce této jest popis a pojmenování jednotlivých rostlin, vyňato z Analitické květeny české od Dra. Ladislava Čelakovského (1879). Článek „O rostlinách vůbec“, částečně dle Botaniky školní od prof. F. V. Rosického (1884). Prostonárodní jména bylin, jakož i některá upotřebení jich jsou z Rostlináře Dra. Jana Svatopluka Presla (1823) a z jeho Všeobecného rostlinopisu (1846). Pojednání léčební jest pak sestaveno z rozličných starších i nejnovějších spisů lékařských i lékárnických.

Konečně jsou zde i některé výňatky ze starých rostlinářů, zvláště Dra. Pet. Andr. Matthioliho herbáře, který roku 1586 od Dra. Jach. Cameraria opravený a rozmnožený ve Frankobrodu n. M. vytištěn byl na 495 celoarchových listech.

Obsahuje přemnoho zvláštních, báječných léků, o kterých by se nyní ani psáti nemohlo a nesmělo. Ty doby báchor, pověr a čár pomínuly, věda znamenitě pokročila a lid stal se vzdělanějším.

Matthioli ve svém herbáři uvádí přes 90 prostředků proti moru, z nichž pro případ jsou zde pouze 3 udány. U nás mor ani tak nestraší, v zemích však, kde časem se objevuje, až po dnes nemají proti němu léku, neznají jiného prostředku, leda dědinu, kde vypukl, opustiti a všechna stavení zapáliti.

Matthioli má přes 98 léků proti hlístům (červům, roupům, škrkavkám), nyní zastane to citvar neb z něho vyráběný Santonin.

Po dobu sta let léčena byla zimnice rozličnými bylinami, z nichž v této knížce pouze malá část udána jest, při tom mnozí lidé dlouho se trápili, chřadnuli i zemřeli.

Nyní, avšak teprvé od 50 let, znám je prostředek jistý. Každý, kdo spozoruje, že navštíven je zimnicí, ať dvou-, tří- neb čtvrtodenní, koupí si v lékárně „Chinin“, prášek z kůry Chinového stromu vyráběný, a zbaví se zimnice hned, zvláště když Chininu více najednou (70—140 ctgrm.) asi dvě hodiny před záchvatem užije.

Každému, kdo herbář tento a třebaš jen seznam jeho byl prohlédl, nápadné bude množství doporučených prostředků léčivých při některých nemocech, jako na př. proti vodnatelnosti, žloutenici a j.

Vodnatelnost jmenuje lid, když nohy a život napuchnou, naběhnou neb zvodnatí, což se obyčejně stává ku konci déle trvajících nemocí jater, ledvin, srdce a j., na které se vlastně léky působiti má, aby zmizela vodnatelnost, ku které základ daly.

K tomu však se nehledí, léčí se jednoduše vodnatelnost, jakého původu koliv, obyčejně prostředky, na moč ženoucími, v domnění, že močem voda z těla se vypudí.

Na ten způsob má se to i se žloutenicí, která se ovšem pozná, když bělina očí nebo i kůže na těle sežloutne. Povstati může žloutenice rozličným způsobem, na př. zácpou žlučvodů, kamenky žlučnými, hlísty, vedlejšími naběhlými žlázami, rakovitými a jinými nádory, zahrklením žlučvodů, nemocemi jater, střev, zvláště dvanáctníku, sleziny atd. Příčiny žloutenice však lid ani nezná, také po nich nepátrá a léčí prostě žloutenici nejvíce prostředky počišťujícími neb na stolicí účinkujícími. — Tak a podobně se léčí od laiků neb nezavěcenců i ostatní nemoce, velmi často ku zkáze nemocného. Zvláště choulostivé a nebezpečné jest léčení očí. „Má zanícené neb bolavé oči,“ na tom je dosti, o bližší poznání nemoce se nejedná, herbář se vezme k ruce a dle libosti se některý prostředek vyhledá, nepomůže-li hned, vezme se jiný. Nařiká-li nemocný, že dobře nevidí, řekne se, že

má zákal, temnotu, nebo je-li na rohovce nějaká skvrna vidět, že má bělmo, mrak atd.

Konečně když je nejhůř a nemocný nic nevidí, jde se na poradu k lékaři, který často již nemůže pomoci. Kdo onemocní na oči, učiní vždy dobře, když zanechá všeho sebeléčení a obrátí se záhy na zkušeného lékaře.

Někdo se zajisté pozastaví nad tím, že v tomto herbáři proti psotníku pouze dva prostředky udány jsou. I ty jsou zbytečné. Psotník, totiž křeč u dítěte, není pro sebe žádná zvláštní nemoc, nýbrž úkaz druhotný neb vedlejší. Vždy dlužno pátrati po příčině neb původní nemoci a tu pak, je-li možno, hledět odstraniti. Na venkově, kde lékař k nemocnému volán nebývá a kde se příčina křečí nezná, označuje každý druhý od představeného psaný úmrtní lístek, že dítě zemřelo na psotník.

Ostatně najde každý v knížce této dosti značný výběr prostředků, kterých bude v domácnosti moci užítí, při nemocích méně povážlivých, zvláště když je byl dostatečně zjistil.

---

## O rostlinách vůbec.

Krásná, příjemná, zajímavá i užitečná jest nauka o rostlinách, vyžaduje však zvláštního, důkladného studování, a není tak snadno přiučiti se jistému poznání a určování jednotlivých rostlin.

V tomto spisu není ani možno vědeckou soustavu rostlin rozebírat, uvádí se však přece popis jednotlivých rostlin dle nejnovějšího názvosloví, které od starého se velmi liší. Jakým jiným způsobem by se měly rostliny také zde nebo jinde popisovati?



*Vyklíček rostlina.* 1. kořen, 2. větve kořenné, 3. stonek čili pníček, 4. dělohy, 5. pupen, 6. listy.

Lidé, kteří se zanášejí sbíráním rostlin pro lékárny a domácím léčením, znají dotyčné rostliny od pouhého ukázání dosti dobře, aniž by je popsati dovedli, i prospěje jim, když se přiučí alespoň těm nejhlavnějším novým a patřičným názvům a když při tom blíže si povšímnou rostlin, aby je určitě rozeznati uměli od jiných podobných, často i škodlivých a zdraví nebezpečných.

Časné na jaře sbírají se na bylinkovou polévku mladé listy oponce, sedmikrásy, fialky, řebříčku a jiných ještě rostlin, při čemž i dosti cizích se přitrhá. Stává se dosti často, že i místo petržele, přece tak dobře známé, natrhá se do polévky velmi podobného listu, bolehlavu blámatého, kterýž omyl již mnoho neštěstí způsobil. — Tím větší pozornosti vyžaduje sbírání takových rostlin, které nemocnému za lék sloužiti mají.


Jest záhodno, aby každý, kdo za jakým koliv účelem, třeba jen povrchně s rostlinami se zabývá, znal alespoň nejhlavnější jejich

částky a znal je také pojmenovati, i postačí, když si přivlastní to, co zde ve vší krátkosti o rostlinách vůbec je podáno.

Hlavní částky rostliny jsou: *kořen, stonk, list, květ a plod.*

## K o ř e n.

*Kořen* jest ona část rostliny, která do země vniká, rostlinu upevňuje a potravu přijímá.



*Druhy kořenů.* 1. Jednoduchý kořen (penízku), 2. větevnatý (slezu lesního), 3. řepovitý (řepy), 4. mrcasatý neb svazčitý (ječmene), 5. větvenovitý (mrkve).

Kořen mívá tvar rozličný, jest na př. *jednoduchý* (penízek rolní), *vřetenovitý* (mrkev), *koulovitý* (řepa), *větvenatý* (slez), *svazčitý* (ječmen), *hlizovitý* (vstavač obecný).

U rostlin jedno- neb dvouletých bývá kořen *dužnatý*, u mnoholetých *dřevnatý*.

## S t o n e k.

*Stonk* jest listy opatřená část rostliny, buď nad zemi nebo i pod zemi, v kterém případě pak se jmenuje *oddenek*, jenž v obecném životě bývá omylem za pravý kořen považován.

Část stonku od jednoho listu ke druhému jmenuje se *člen*; jsou-li listy dále od sebe, jsou články delší a tudíž se zove pak *stonk dlouhočlenný*, naopak jsou-li listy hustě nad sebou, *krátkočlenný*.




1. Cibule, 2. oddenek (puškvorce).

naopak jsou-li listy hustě nad sebou,



Oddenek bývá nejčastěji pokryt drobnými listy šupinatými (u šišvorce) a slove *oddenek pravý*. Je-li oddenek nebo i kořen



1. Dvojité hlízy (vstavače), a) hlíza jedno-  
roční, b) dvojitá; 2. hlízy (bramboru).

a pak často kořínky vypouštějící (jahoda), jindy opět *otáčivý* (*popínavý, povláčivý*), totiž po jiných předmětech, zdích, stromech atd. se pnoucí, neb okolo nich se otáčející (chmel, břechan, svlačec, kokotice).



1. Větévka v trn přeměněná  
(trnky), 2. lodyha levotočivá  
(svlačce).

nuje *kmen*. — Rostliny se stonkem štavnatým slují *byliny*, a jsou dle trvání *jednoleté, dvou-* i *mnoholeté*, když z jejich oddenku po více let listnaté lodyhy vyrůstají.


místy naduřelý, činí buď *hlízy* (bambule, bulvy), jako na př. u bramboru, buď *cibule*, na kterých bývají i mladé, k rozmnožování určené cibulky, tak zvané *pacibulky* (česnek).

Stonk nadzemní jest zřídka kdy jednoduchý, obyčejně jest rozvětven. Někdy jest *přímý* a

sluje též *peň*, někdy jest *převislý*, na zemi *položeny, plazivý*


Stonk nadzemní trvá u některých rostlin pouze jeden rok a sluje pak *lodyha*. Lodyha dutá, kolínky přepažená nazývá se *stéblo* (trávy, obilí). — Peň neb lodyha bezlistá, leda šupinatá, nahoře listeny a květy nesoucí, zove se *stvol*.

Stonk je buď *štavnatý* neb *dřevnatý*, více let trvající, který se pak jme-



Stonk plazivý, (jahody) kořínky  
vypouštějící.

*Strom* sluje rostlina s dřevnatým, zřetelně vyvinutým hlavním kmenem. *Keř* je rostlina hned od země rozvětvená, *polokeř* taková, jejíž mladší větvičky každým rokem hynou (šalvěj lékařská, lavandule).



*Listy rozličného druhu.* 1. List lichozpeřený (růže plané), 2. kopistovitý (sedmikrásy), 3. střelovitý (svlačce rolního), 4. klínovitý (petrkliče), 5. nestejně čili přetrhávané zpeřený (bramboru), 6. dlanitodílný (pryskyřníka prudkého), 7. sudozpeřený (lechy jarní), 8. dvakrát sudozpeřený (akacie), 9. čárkovitý (tisu), 10. terčovitý (řeřichy kapucínské), 11. kopinatý (vrby bílé), 12. kracovitě přenodílný (pampelišky), 13. sedmičetný dlanitý (kaštanu divokého neb koňského), 14. pikovitý (šťovíku), 15. celokrajný (šefíku), 16. objímavý (penízku), 17. srostlé listy (kožího listu), 18. prorostlý (prorostlíku), 19. podlouhlý.

## L i s t.

*List* neb *lupen* sestává z pošvy, řapíku a čepele. *Pošva* objímá stonek buď částečně neb kolkolem. *Řapík* jest tenká, stopkovitá část listu a *čepele* část jeho konečná, rozšířená a největší.



*Listy rozličného druhu.* 1. List peřenolaločný (dubu), 2. trojlaločný (jaterníka), 3. dlanitožilný (babyky), 4. zašpicatěný (višně), 5. opak srdčitý (štavele), 6. zubatý (dubu), 7. srdčitý (lípy malolisté), 8. přikrouhlý (žahavky), 9. vroubkovaný (opence), 10. vejčitý (buku), 11. ledvinkovitý (kopytníka), 12. list hrachu *a*), zpeřený list s úponkami *b*), jáma listová *c*), palisty *d*), květ *e*), štopka květná s listenem *f*); 13. část stébla trávy, *a*) pošva listová, *b*) jazýček, *c*) čepele, *d*) stéblo, *e*) kolénko; 14. list sbíhavý, *a*) stonek, *b*) čepele, *c*) část čepele po stonku sbíhající; 15. listy vzplývavé *a*), listy ponořené *b*) (pryskyřníka vodního).

Tyto tři částky nejsou vždy vyvinuté, tak na př. nemá list jabloně pošvy a list trav řapíku. (Viz obr. 7. a 8. str. 10. a 11.) Schází-li řapík, jsou listy *přisedlé* neb na lodyze bez stopky sedící; objímají-li rozšířeným čepelem lodyhu, zovou se *objímavé*, srůstají-li objímavým okrajem: *prorostlé* a splývají-li dva vstříčné listy svými spodinami: *srostlé* (kozí list obecný).


*Sbíhavý* list sluje, jehož kraje na zpodu ještě po samé lodyze křídlovitě se táhnou (divizna, kostival, bodlák).

Co se týče celkové podoby listů, zvláště čepele, jest mnoho rozdílů. Popisování jednotlivých bylo by na tomto místě obšírné a také každému, kdo rostlinopis nestudoval, nepochopitelné. Avšak obrázky jednotlivých listů s nejpotřebnějšími poznámkami postačí k poznání alespoň těch nejhlavnějších a nejpotřebnějších odznaků. Snáž se pochopí ostatní pojmenování, jako: *list pýřitý*, totiž pýřím neb krátkými, měkkými chloupky porostlý, list *roztroušeně* nebo *drsně chlupatý*, *huňatý*, *vlnatý*, *plstnatý*, nebo naopak *lysý*, to jest bez chlupů.

## K v ě t.


Hlavní částky květu jsou: pestík, tyčinky a obaly květné.

*Pestík* je ve středu květu, podoby nejčastěji kuželovité. *Nadufelá* jeho část spodní, zárodky semenné obsahující, jmenuje se *semenník*, nitkovitá část *čnělka* a její lepkavý vrchol *blizna*.



1. Pestík s přisedlou bliznou (tulipán), 2. pestík s čnělkou nahoře mnohohdílnou (topolovky), 3. pestík s čnělkou a bliznou (snědka), 4. semenník spodní (kosatce), 5. tyčinka (šalvěje), 6. tyčinka (česneku klatohlavého), 7. tyčinka (pšenice), 8. tyčinka ze dvou srostlá a proto se 2 prašníky (vrby nachové), 9. tyčinka s přímým prašníkem (tulipán), 10.—13. pylová zrnka rozličných rostlin, zvětšená, 14. květ s jednoduchým okvětím (snědka okoličnatého), 15. a 16. nahé, dvojaké květy (vrby křehké), první s tyčinkami, druhý s pestíkem, 17. a 18. dokonalý květ, první s hořejška vyobrazen s tyčinkami a pestíkem, druhý z doljška s kalichem.

*Tyčinky* skládají se obvykle z tenké, vláknovité *nitky* a z vavkovitého *prašníku*. V tyčinkách kolem pestíku umístěných, vyvíjejí se *buňky oplozovací* neboli *pyl*.



*Nepravidelné srostloplátečné koruny.* 1. Koruna tlamatá (hledíka většho), 2. dvojpyská (šalvěje luční), 3. jazykovitá (lociky ozimé). *Pravidelné srostloplátečné koruny.* 4. Koruna kolovitá (mochyně), 5. kulovitá (borůvky), 6. baňkovitá (eriky), 7. zvonkovitá (zvonku), 8. nálevkovitá (petrklíče), 9. trubkovitá (řebříčka), 10. řepicovitá (plamenky), 11. řasnatě nálevkovitá (durmanu).

*Obaly květné* bývají obvykle vyvinuty pod tyčinkami a skládají se buď z jednoho nebo ze dvou kruhů listových. Jsou-li dva kruhy obalů květných, bývá svrchní obvykle jemnější i pestře zbarven a jmenuje se *koruna*; jednotlivé částky její slují *plátky korunní*. Spodní kruh bývá nejčastěji tužší a zelený, nazývá se *kalich* a jednotlivé části jeho *lupeny kališní*.



*Pravidelné prostoplátečné koruny.* 1. Křížatá (fialy žluté), 2. růžovitá (mochny jarní), 3. slezovitá (slezu lesního), 4. karafiátová (hvozdíku).



*Nepravidelné prostoplátečné koruny.* 1. Květ macešky, 2. koruna motýlovitá žanovce.

V některých případech (lilie) jsou kalich a koruna stejné povahy, nebo jest pouze jediný kruh vyvinut a pak se jmenní obaly prostě i *okvěti*, které se nazývá *kalichovité*, podobá-li se kalichu neb *korunovité*, je-li více koruně podobné.

Květy, které mají kalich i korunu, slují *dokonalé*, jinak jsou *nedokonalé*. Jak kalich tak i koruna bývají složené buď z lístků nespojených (mák) a jmenují se pak *kalich prostolupenný* a *koruna prostoplátečná*, nebo sestávají z lístků srostlých (zvoněk) a slují pak *kalich srostlolupenný* a *koruna srostloplátečná*.

Další pojmenování objasní přiložené obrázky.

## K v ě t e n s t v í .

Někdy bývají stopky květonosné pouze jediným květem zakončené, někdy však jsou dle určitých pravidel rozvětvené, v celek sestavené a činí tak zvané *květenství*, které je pak buď *hroznovité* neb *vrcholíkovité*.

*Hrozen* jest květenství, kde stojí květy na vyvinutých stopečkách a listeny pod květnými stopkami někdy nebývají vyvinuty. Nejstarší květy stojí nejniže (rybíz, dřívěšník).

Hrozen, jehož nejspodnější větve jsou nejdelší a čím dál k vrcholku postupně kratší, že všechny květy as v jedné rovině stojí, sluje *chocholík*. (Viz obr. 13. str. 15.)

*Klas* má květy k stopce přisedlé, nebo jsou květy na velmi kratičkých stopečkách, více méně od sebe oddálených a listenem podepřených. — Klas se větvením chabým, ohebným sluje *jehněda* neb *kočička* (dub, bříza, vrba), se větvením dužnatým, naduřelým *palice* (kukuřice), se větvením a šupinami dřevnatými *šiška*.


*Okolík* je květenství, kde květy stojí na vyvinutých stopečkách, které pohromadě ze větve velmi krátkého vynikají (petrklíč). Listeny tvoří na větveně tak zvaný *obal*.

*Strboul* nebo *hlávka* jest květenství, jehož květy bez stopek na skrácené, zato však často rozšířené ose sedí (jetel). Kalichovitý obal, z listenů neb šupin, slove zde *zákrov*. — Strboul u některých bylin na př. heřmánku, pampelišky, rmenu, vratiče a j. jmenuje se *úbor*.

*Vrcholík* jest květenství, jehož větve stále do vyšších stupňů se rozvětvují, při čemž každá větvička květ předcházející (mateřské) větve přerůstá. — Vrcholík jest buď *jednoramenný* (*lichoklas*, *lichohrozen*), jestliže z každé stopky květní vždy jen zas jedna stopka vyniká, z této opět atd., neb *dvouramenný* čili *vidličnatý*, když z každé větve pod konečným květem dvě vstříčné větve vynikají, neb *víceramenný*, jak na př. u černého bezu.

## P l o d.

Zúrodněním zárodků semenných podléhá semenník mnohým proměnám a přechází v *plod*, který *semena* v sobě chová.




1. Jehnědy (lísky), 2. jednoduchý klas (jitrocele), 3. chocholík (mahaleb), 4. složený klas (jílku), 5. palice (kukuřice), 6. hrozen visutý (čilimník). 7. složitý okolík (třebule), 8. přímý hrozen (kokošky), 9. vrcholík okolíkovitý (bezu černého), 10. strboul (jetele lučního), 11. lata (psinečka), 12. úbor (heřmánku), 13. jednoduchý okolík (petrklíče).

Plody se rozdělní vědecky rozmanitě, zde možno pouze některé a sice nejhlavnější druhy uvést, zvláště k porozumění dále uvedeným názvům při jednotlivých rostlinách.

*Nažka* jest plod suchý, namnoze jednosemenný, nepukavý, to jest až do klíčení obalený jemnou slupkou, ze semenníka povstalou,

oplodí zvanou (trávy, obilí). Je-li oplodí tvrdé, dřevnaté, nazývá se plod oříšek (líška, ořech).



**Plody.** 1. Tobolka (šeršika), 2. tobolka (máku), 3. tobolka (knotovky), 4. tobolka (blínu), 5. tobolka (ocánu), 6. tobolka (pupalky), 7. lusk (brachu), 8. šešulka (fialy žluté), 9. měchýřky (oměje), 10. šešulinka (kokošky), 11. křídlatá dvojnážka (javoru polního), 12. nažka (zlatovlasce), 13. nažka (radyku), 14. nažka (lípy), 15. nažka (obilky žita), 16. nažka (dvojjzubky), 17. oříšek (líšky), 18. bukvice (nažka buku), 19. nažka (jasanu), 20. křídlatá nažka (jilmu), 21. peckovice (vlašského ořechu), 22. a 23. peckovice (dřínu), 24. a 25. bobule (chřestu), 26. a 27. bobule (borůvky), 28. a 29. bobule (vinné révy), 30. a 31. bobule (dřšťalu), 32. klíček (semena fazolového), 33. žalud s číškou, 34. rozpuklá číška s nažkou (bukvice), 35. plody líšky s číškovitými obaly, 36. a 37. semeno tisu v bobulovité číšce, 38. malvice hrušky, 39. moruše, 40. jahoda, 41. šípek plané růže, 42. a 43. malvice jeřábu, 44. plod rozpadavý (kakostu rozeklaného), 45. dvojnážka (třebule lesní).



*Měchyřek* jest plod jednopouzdrý, který jediným podélným švem se otevírá a na okrajích semena nese (blatouch); otevírá-li se po délce na 2 švech, zove se *lusk* (hrách); sestává-li ze dvou pouzder, s přehradkou blánovitou uprostřed, zove se *šešulka* (řepka).

*Tobolka* jest plod více méně suchý, chloupkami (violka), zuby (hvozdík), víčkem (blín), neb otvory, šterbinami pukající a semena volně propouštějící (mák, makovice).

Až posud uvedené plody jmenují se *suché*, oproti následujícím *dužnatým*, jichž oplodí je šťavnaté nebo dužnaté a ku kterým hlavně náležejí *bobule* obsahující jedno nebo i více semen (mochyně, víno, borůvka).

*Peckovice* jest plod více méně dužnatý, uvnitř s peckou jedno- až vícepouzdrů (švestka, třešně, dřínka).

1.

## Anjelika.

*Angelica*. Engelwurz.

Anjelika větší, (anjelika lékařská, janolika. *Angelica archangelica*. *Archangelica officinalis*. Engelwurz. Angelike.) Lodyha



Obr. 1. Anjelika větší.

oblá, rýhovaná. Listy jednou neb 2—3krát trojeno-zpeřené; lístky veliké, vezpod nasivělé, vejčité, nestejně hrubě hrotnato-pilovité, konečný často třílaločný, postranní dvoulaločný; pošvy břichaté.

Lístky obalíčků mnohé, nitkovité. Plátky zazelenale bílé. Bylina dvouletá, 1—2½ m. Květe v červnu a červenci. Bylinné rokle horní, u obydlí horských zdivočelá.

Kořen zapáchá, chutná ostře a hořce, obsahuje mnoho silice a pryskyřice, proto byl v lékařství, zvláště zvěrolékařství vážen, k témuž cíli potřebovali též nať a semeno. Anjelika jest lék mírně rozčilující, povzbuzující a spolu posilňující, který podněcuje zažívání, účinkuje na sliznici plic a střev, při nemocech náhlých i provléklých, zejména při zánětu plic, při tyfu, chronických nemocech dychadel, hryzení neb ujímání, počasném rheumatismu a j.

V lékárnách se posud chová kořen, prášek z něho a extrakt.  
— Kořene se vaří půl hodiny 10 grm. na 200 grm. vody, od čeho se užívá za 2 hod. 2 lžice.

— Prášku se užívá 70 až 100 ctgr. 2—3krát za den.

— Výtahu neb extraktu 2 až 5 grm. denně s vodou mátovou neb jinou. — Pro lékárnu sbírá se dvouletý kořen v březnu.

Mladé rostliny na se-  
veru jedí. Z kořenu možno  
táhnouti silný lihový nápoj.

2.

## A r o n.

Arum. Aronstab.

Aron skvrnatý, (aron blá-  
matý, aron, aronová brada,  
tvář sv. Jana, nadrahule,  
nadragula, zminec. Arum  
maculatum. Gefleckter Aron-  
stab, Zehrwurz). Listy z od-  
denku hlízovitého, řapikaté,  
střelovito-vejčité, často tma-  
vě skvrnaté. Toulec dlouze  
zakončitý, žlutavozelený, čer-  
veně skvrnatý. Palice na-



Obr. 2. Aron skvrnatý.

chová s dlouhostopečným kyjem. Bobule šarlatové. Bylina mnoho-  
letá 15—45 cm. Květe v květnu. Roste ve vlhkých horních lesích,  
zvlášt bukových. Oddenek jakož i celá rostlina má chuť palčivou,  
která však vařením i sušením zmizí. Oddenek sice až posud se  
pro lékárnu v březnu a říjnu sbírá, avšak zřídka kdy upotřeben  
bývá. Dříve se doporučoval proti počasným zánětům prsním, duš-  
nosti, dýchavičnosti, též proti hlístům, hostci počasnému, soucho-  
tinám a jiným nemocem.

3.

**Bazalika.***Ocimum. Basilie.*

Bazalika obecná (bazalka. *Ocimum basilicum. Basilie*). Bylina tato jednoletá pochází z Asie a pěstuje se všude v našich zahradách i v hrncích mezi okny pro líbeznu vůni a co koření kuchyňské, v rozličných odrudách. Květe v červenci a srpnu.

Někde svářejí bazaliku s volovým jazykem (pilátem) k pití proti mdlobám, srdečním vadám a zádumčivosti. Odvar semene nebo i listů žene na moč a dopomáhá k čmýře. — Bazalika v octě močená dává se voněti při mdlobách. Voda bazaliková s octem a růžovým olejem smíšená a na čelo položena, umírňuje bolesti hlavy. Prášek ze semene se šnupe proti zácpě nosu, tak též účinkuje šťáva z listů do nosu vtáhnutá. Bazalika smíšená s ječnou moukou, růžovým olejem a octem, přikládá se na zanícené a bolavé oči. Šťáva z bazaliky do očí kapána zahání temnotu oční a slzotok. Voda obyčejná nebo i růžová na semeno vlitá nabývá sliznatosti a potřebuje se k natírání proti zapálení blan slizných v ústech, lžnu a proti podlomkům bradavek prsních. Prášek z vypáleného semene sype se na bradavice, kdekoliv na těle vzniklé; dříve však se musí bradavice nožičkem po vrchu seříznouti neb alespoň oškrábat. —

4.

**Bažanka.***Mercurialis. Bingelkraut.*

Bažanka polní (planá bazalice. *Mercurialis annua. Bingelkraut*). Kořen jednoletý, větvenovitý. Lodyha větevnatá. Listy vejčito-podlouhlé, až podlouhlo-kopinaté, vroubkovano-pilovité. Květy samčí úžlabní po 1—3 skoro přisedlé. Blizny uvnitř po obou krajích s jednou řadou chloupků. Bylina jednoletá 15—30 cm. Květe v červnu až do října. Roste na rolích, záhonech, rumišťích.

Nať je sliznatá a nahořklá, zapáchá a chutná nepříjemně; potřebovala se jindá v lékařství proti zácpě, zástavě čmýry, vodnatelnosti a příjici. Nyní přišla docela v zapomenutí i také lid si ji nevíšmá, protože je odporná k užívání. —

5.

**Bedrník.***Pimpinella. Bibernell.*

a) *Bedrník anýz*. (*Pimpinella anisum. Aniess.*) Lodyha oblá, rýhovaná, přitiskle pýřitá. Listy dolejší okrouhle ledvinkovité, hluboce stříhano-pilovité, prostřední 3četné peřenosečné, lístků klínovitých, namnoze 3klaných. Plátky bílé. Mnoholetá bylina 15—50 cm. Květe v červenci a srpnu. Z Orientu, u nás pořádku pěstovaný.

Semena v kuchyních všude známá, doporučují se též proti větrům, nadužení břicha, žaludeční křeči jakož i nemocem žaludku vůbec, proti kašli, počasnému kataru plic a dušnosti na prsou. V lékárně lze dostati semeno, prášek z něho, olej a lih anýzový. K nálevu se bere 2—5 grm. prášku na 200 grm. vody. — Prášku se užívá 1—1½ grm. s cukrem; oleje 2—3 kapky na cukr; vody



Obr. 3. Bedrník anýz.

20—40 grm. Lih se přidává k jiným nálevům a odvarům, nebo slouží též k natírání těla, zvláště prsou a břicha.

Pro lékárnou sbírá se semeno v září a říjnu.

*b) Bedrník obecný.* (Lomikamen, bedrník menší, třebník. *Pimpinella saxifraga*. *Pimpinell* neb *Biebernell*). Lodyha oblá, jemně rýhovaná, namnoze hustě pýřitá. Listy jednou zpeřené; lístky přízemních listů namnoze přisedlé, přiokrouhlé, stříhaně vroubkovano-pilovité až peřenodílné; lodyžních listů peřenoklané neb 2—3klané, ústů čárkovitých neb kopinatých; nejhořejší pošvy s čepelí zakrnělou neb bezčepelné. Plod kulato-vejčitý, terč náplodní o polovic plodu užší. Plátky bílé, zřídka narůžovělé. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Květe v červenci až do září. Roste na suchých lukách, vřesovinách lesních, mezích, kopcích.

Kořen v odvaru po 50 ctgr., neb 1—2 grm. dvakrát až třikrát za den užívá se proti chraptivosti, dušnosti, kašli, nemocem dycbadel všeho druhu; jako kloktadla při nemocech ústních a krčních. V lékárně lze dostati též tinkturu, od které se užívá 20—30 kapek na cukr. — Nyní potřebuje se více ve zvěrolékařství. Kořen dává též silici, která z bílého odrodu jest žlutá, z černého modrá.

6.

**B e z.**

Sambucus. Hollunder.

a) *Bez černý* (bez, bez domácí, bzina, bezoví, chebz. Sambucus nigra. Schwarzer Hollunder, Holder, Flieder). Dřeň větví bílá. Listy zpeřené; lístky vejčité, dlouze zakončité, nestejně pilovité. Palisty zakrnělé žlázkovité neb čárkovité. Lata chocholíčnatá, plochá, po odkvětu níci. Štopky lysé. Květy žlutavobílé. Úšty korunní v poupěti střechovité. Nitky tyčinek tenké, hladké. Plody černé. Strom neb keř do 6 m. Květe v červnu neb červenci. Roste v lesích, v křovištích, plotech, podle skal a zdí.

Užitečná je kůra, listy, květy a bobule (bezinky). Kůra a sice prostřední její vrstva zelená a listy chválily se ve vodnatelnosti, avšak pozorovati sluší, aby se jich užívalo mírně, neb jinak značný průjem a vrhnutí působí. Nejvíce se upotřebuje suchých květů. Podávají se proti nastuzení, hostci, kašli, bolení hrda, zánětu chřtánu, průdušnice a plic, záduchu, vyraženinám, osýpkám na př. spále, spalničkám, neštovicím a j. Zvláště v první době aby vyrážka se usnadnila a zaražena nebyla. Vůbec se přivádí tělo jimi do potu. — Listy, zvláště nerozvité, přikládají se na nohy vodou oteklé. — Květy suché do pytlíčku s květem heřmánkovým a kafrem se zašívají a na otoky jak horké tak i studené, na př. hostečné, pakostničné, růži, otoky žláz atd. se přikládají. Svařeniny květu se užívá k napařování, ke kloktání při zánětech hrtanu a mandlí, kašiček pak na obklady. — Květu se zavaří 10—20 grm. na 400 grm. vody.

Z květu dělá se ocet bezový, když se 100 grm. suchého květu s 1200 grm. (3 libry) vody smíchá a v lahvi uschová. Slouží zvláště k utírání, napařování a kloktání. — Květ se nemá na slunci sušit, nýbrž ve stínu. Z bobul neb bezinek se připravují povidla bezová, když se 6 liber z bezinek vytlačené šťávy s 1 librou cukru za stálého míchání zavaří. Povidla mají barvu do fialova černou, chuť navinulou, bezem zapáchající; užívá se jich 20—40 grm. v rozličných míšeninách. V lékárnách lze dostati květ, povidla (roob) a syrup bezový. Syrupu se dává tolik jako povidel, zvláště do mixtur, zpařenin a vařenin. Pro lékárnou sbírá se květ v červnu, bezinky v srpnu, září a říjnu.

b) *Bez chebd* neb *chebdí* (hebdí, chebz, chbeza, chobzda, zemský bez. Sambucus ebulus. Attich.) Lodyha ročně hynoucí jest přímá,

větvenatá. Listy zpeřené, s 5—9 podlouhlo-kopinatými, pilovitými lístky. Palisty nejvíce lupenovité, pilovité, hoření úzké, čárkovité. Lata vrcholičnatá, plochá, ze 3—4 hlavních větví. Koruny bílé, vně červenavé, prášničky nachové. Úšty korunní v poupěti chlopnité. Nitky tyčinek tlusté, na vnitřní straně vroubkované. Bylina mnoholetá; lodyha  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  m. vysoká, dole co prst tlustá, křehká, drsná. Květy v červenci a srpnu. Roste na okraji lesů, v pasekách na stráních, zvláště hornatějších.

Užíval se kořen, kůra vnitřní, listy, bobule a semena. Kořenu dávalo se 15 grm. ve vodě vařených, nebo šťávy z něho vytlačené, zvláště ve vodnatelnosti. Kořen má býti nejmocnější, účinkují však ostatní částky rostliny podobně, počišťují totiž a ženou na moč. Listy nazvíce k venčím užitkům se poskytovaly, s vínem k obkládání otoků a ohnětenin; též na kaši svařené proti otokům vodnatým, se obkládaly. — Květu moc na pot ženoucí se vychvalovala. — Z bobul, tak zvaných chebdinek, které též černé jako bezinky jsou, avšak o něco menší, vyvářejí se též povidla na způsob jako u předešlého bezu černého. Účinek mají tentýž. — Semen rozmačkaných 1. grm. s vínem, polévkou, syrubem a j. smíšených podávalo se též při vodnatelnosti. Též olej vařením s vodou vydobytý po lžici neb s polévkou vzatý mocně počišťuje a proti vodnatelnosti se užívá i také na tělo k umírnění bolesti se natíral. — Pro lékárnu sbírají se bobule v září a říjnu.

Květný vrcholík bezu černého do těsta zabalený a na másle smažený mnohým lidem jest pochoutkou, *kosmatice* zvanou. Jiní zase květy přisazují pro chuť k rozličným z vajec připraveným pokrmům. Někde připravují z květu kořený ocet, a polozralé bobule do octa a slané vody nakládají místo kapar. Jinde dávají květy i bobule do vína, aby příjemnou chuť nebo barvu dostalo. Švestková povidla příjemně chutnají a tmavší barvu nabývají, zavaří-li se s bezinkami. Někde barví šťávou z bobul kořalku, neb z květu a bobul i víno, kořalku a ocet připravují. V některých zemích barví šťávou zralých bobul vlnu a hedvábí tmavo-fialově; vlnu vismutem připravenou modravě-šedě; listím pak kůži na sedla žlutě. Též i ostatní částky toho stromu mohou se k barvení upotřebiti, zvláště zelená a žlutá kůra, ležící pod šedivou, slouží k barvení na hnědo a na modro. Dříví z kmenu starého jest tvrdé, pevné, žlutavé a dělají se z něho rozličná menší náčiní, rukověť, cívky, dýmky, pravítka a j., též slouží truhlářům k dílu výkladnému. — Uhlí z bezového dříví vychvaluje se k cídění mosazu, mědi a ocele. Z větví střeně (duše, jádra) zbavených dělají chlapi stříkačky, bouchačky a skříny na ptáky; ze střeně zhotovují se kuličky ke stroji elektrickému.

Bez snadno se rozmnožuje hřízenicemi, odnožemi i semenem, roste v každé půdě, nesnadno vyhynuje a neporušen zůstává, jelikož dobytek pro hořkost listí se jej nedotýká.

Někde se domnívají, že listí zachraňuje ovce před prašivinou, zpařenina z nich že zapuzuje mšice a housenky, dále že možno pilously ze sýpek zahnat, jestli květy a větve tam rozpoloženy byly.


Nať zemského bezu neb chebdí zapuzuje prý myši, v holubnicích všely a v obydlí štěnice. Bobule chebdí poskytují barvu fialovou; s octem vinným a kamencem nabývá přize a kůže barvy modré, plátno barvy blankytné. Bobule suché poskytují vlně vizmutem močené hnědo-žlutou barvu.]

7.

## Blatouch.

*Caltha. Dotterblume.*

Blatouch bahní (koňské kopyto, bolečko, žluták, blatouch, máslenka, žlutá tolita, měsíček. *Caltha palustris. Dotterblume.*) Listy vroubkované neb zubaté, dolejší srdčito-okrouhlé, hoření lo-



Obr. 4. Blatouch bahní.

dyžní ledvinkovité. Květ žlutkový. Mnoholetá bylina 15—30 cm. Květe v dubnu, květnu i v červnu. Roste všude na bařinách, mokřích lukách, na místech vlhkých podle louží a bahen.

Jindy byl kořen a nať v lékařství užíván, nyní jest úplně vyhostěn. Všecky částky byliny účinkují co lék počišťující a rozpouštějící, léčí žloutenici, usnadňují čmýru a porod.

Květy v mléce neb pivě svařené zahání neštovice drobné neb jalové. Celá rostlina a ocet z květu připravený mají býti protimorné.




— Zelená poupata nasbíraná, 12 hodin ve vodě slané močená a v dobrý vinný ocet naložená, mají podobu a chuť křeparů, a místo nich se k jídlu prodávají. Nat zapáchá a hořce chutná, mnozí tvrdí, že toliko ovce a kozy ji žerou, jiní opět dokládají, že i koně a hovězí dobytek ji rád, zvláště s jinou pící je-li smíšena; někteří hospodáři ji dávají kravám v domění, že nabudou žlutého másla. — Květy silně voní a poskytují včelám mnoho medu. — Štáva z květu vytlačena a s kamencem vařená dává žlutou barvu, z níž možno zhotoviti žlutý inkoust. — V severní Evropě melou sušené kořeny na chléb.

8.

## Brambořík.

*Cyclamen. Schweinsbrod.*

Brambořík obecný, (Sviňský ořech neb chlebič, tvarožina. *Cyclamen europaeum. Schweinsbrod, Erdscheibe*). Oddenek dole v kulatou hlízu napuchlý.



Obr. 5. Brambořík obecný.

Listy přízemní dlouhořapičné, okrouhlosrdčité, vlnovitě drobně vroubkované. Stopky jednokvěté, jak řapíky žlaznatě drsné, s květem převislým za plodu šroubovitě svinuté. Ústí kališní kratší než široká, v ústí bezzubá, nachově růžová, vonná koruna. Bylina mnohiletá 5—10 cm. Květe v červenci a srpnu. Roste v horních leších, křovištích, zvláště na vápenité půdě.

Kořen čerstvý jest sliznatý hořký a trpký, způsobuje průjem a vrhnutí; sušením však pozbývá prudkosti, upražen může se jísti a jest lahodný. Za starých dob byl v lékařství váženým prostředkem.

Prášek z upraženého kořene dával se užívati s medem pro stolicí, s vínem k docílení zadržené čmýry, jakož i proti otrávení, žloutenici, zácpě jater a sleziny a s nimi spojené vodnatelnosti. Stejný účinek se připisoval štávě z čerstvé rostliny.

Zevně se doporučoval brambořík proti všemožným nemocem, neduhům a úrazům; když nebylo čerstvé šťávy, posloužil odvar a prášek z kořene, neb olej z něho připravený, totiž olej dřevěný, ve kterém kořen povařen byl. Byl to kořen tak mocný, že nadpomáhal ženám k snadnému a šťastnému porodu, když ho na nohy si přivázaly. — Nyní sotva již někdo jej vyhledává.

9.

### Břečťan.

*Hedera. Efeu.*

Břečťan obecný, (břečťan, blušt, ličok. *Hedera helix. Efeu.*) Kmen kořinky přímětnými popínavý. Listy kožovité, srdčité, úhlato-3—5laločné, na větvích květoucích kosníkově vejčité neb kopinaté, zakončité. Okolíky hroznitě sestavené, stopky květní plstnaté. Plátky nazelenalé, bobule černé, květe v září a říjnu. Keř v lesích po zemi, stromech, skalách a zdích se pnoucí.

Listy jsou chuti hořké, trpké, protivné. Ondy se potřebovalo listů a bobul. Prášek ze suchých listů dával se 2—3krát z rána po 9 dní dětem na mze nemocným. — Čerstvé listy rozmačkané dávají se až posud na vředy, spáleniny, růži a bolavé oči. Též s vínem vařené přikládají se na vředy a rány; v octu pak močené na kuří oka, aby se zahnila. — Štáva čili pryskyřice brečťanová doporučovala se proti zaražené čmýře a přidávala se též k rozličným flastrům. Plodů neb peckovic užívali staří pro stolicí a vrhnutí i pro vypuzení potu.

Odvar listů prý usnadňuje porod ovcí, k čemuž se listy v pivě až na polovičku zavaří a pak dobytku vlejí.

Dříví brečťanové jest šedé, lehké, děrnaté, ačkoliv vlákna jsou dost tvrdá a pevná, zřídka však se nachází kmenu na 4—5 palců silných; náš lesní po zemi se plazící brečťan nebyl nikdy v květu viděn; dobytek se listů nedotýká, leda koně a ovce z hladu jej žerou. Bobul možno k čižbě použítí. Mladé šlahouny a listy doporučují se k vydělávání kůže. Dříví a listy udělují suknu připravenému barvu ryzovatou; fialová štáva bobul barví z šediva olivově.

V zahradnictví jest brečťan velmi oblíben, potahují se ním besídky, zdě, skály, stromy a j. a jest zvláště vděčným, že zůstává jak v letě tak i v zimě zeleným; proto bývá i ve světnicích velmi často pěstován. — Brečťan rozmnožuje se odnožemi, hřízenicemi a semenem, které však buď hned vyseto, jakmile z jara uzrálo, sice celý rok v zemi poleží, nežli vyklíčí.

10.

### Bříza.

*Betula. Birke.*

Bříza obecná, (bříza, březa, deruzda. *Betula alba. Die Birke.*) Listy dosti dlouze řapikaté, vejčité neb kosníkovité, nestejně neb 2krát pilovité, se silnými prostranními žebry a mnohem méně zřetel-

nou sítkou žilek, vezpod i pryskyřičnými žlázkami. Jehnědy válcovité. Nažky šupinami nestejně 3klanými zcela zakryté, s okřídlim 1—2krátě širším. Vůbec známý strom až přes 20 m.; někdy keř vysoký. Květe v březnu, dubnu a květnu. Roste v lesích.

Z kůry připravuje se olej čili dehet březový, který jakož i kůra sama potřebovala se druhdy v lékařství proti zimnicím a hostci. Míza jarního času z navrtaného kmenu tekoucí (šťáva neb voda březová, březovice, březovník, čemeha), doporučovala se též dříve proti kamenu ledvinnému i močnmu a proti žloutenici. — Míza březová, smíšená s vodou z bezového květu chválena byla proti vodnatelnosti.

Zevně slouží k umývání proti pihám, žlutinám a jiným skvrnám kožním, též za kloktadlo proti kurdějím neb rozjedlinám v ústech, dále k obkladům k vyčištění a zahojení ran. Míza se obyčejně na začátku května sbírá a v lahvi k další potřebě uschovává. — Někde užívají místo mízy odvaru z březových listů. Někde spalují na pánvi čerstvé březové pruty, při čemž na pánvi zůstává šťáva, kterou se natírá okraj víček zanícených očí; klucek v šťávě této smočený a na pupek přiložený vypuzuje prý škrkavky a jiné hlisty.

Dříví březové potřebují koláři na žebřiny, voje, rozvory, sanice, kleče a jinak na polní nářadí; dříví které má mozery neb lykadry, slouží truhlářům a soustružníkům k rozličným krásným pracem. Ze slabších větví zhotovují se obruče a z klestu košťata. Co palivo jest dříví březové jen o 15% špatnější než dříví bukové. Uhlí z něho hodí se dobře k roztápění kovů, k letování, kalení atd.; z něho se též připravuje černá křída. Kůra březová obsahuje mnoho dehtu, který možno z ni destilováním po suchu dobytí. V Rusku užívají kůry k vydělávání juchty, kterou i natírají dehtem z kůry vydobytým. Míza z navrtaných kmenů na jaře prýšticí dává s kořalkou, cukrem a droždím okysána dobrý nápoj. Z listů s kamencem vařených možno docílití dobrou a pěknou žlutou barvu. Z kůry zhotovují se tabatěrky. — Kopet dává nejlepší barvu černou hnih- a mědotiskařům jakož i malířům.

Bříza miluje lehkou, hrubým pískem promíšenou hlinitou půdu. Setí má před vysazováním přednost. Semeno se sbírá obyčejně v září a seje se buď v podzimku neb časně z jara za tajícího sněhu, mírném dešti a tichého povětří. Půda musí býti trávy a bejlí prostá; rozseté semeno se zemí nepokrývá, stačí zasetá místa oteplí trnů převláčeti.

11.

## Brukev.

Brassica. Kohl.

a) *Brukev obecná* (zelice. Brassica oleracea. Kohl.) Listy všecky sivé a lisé, dolejší lýrovité, hoření zpodkem súženým neb okrouhlým přisedlé. Kalich a tyčinky přímé. Semena hladká. Květy sirkově žluté. Bylina dvou- i jednoletá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Květe v květnu a červnu. — odrodky brukve obecné jsou:

- b) *Brukev*, kerlubny, řepné zelí. Bras. gongylodes. Kohlrabi.
- c) *Karfiol*, zelí květné. Bras. botrytis. Blumenkohl.
- d) *Zelí hlavaté*, hlavatice. Bras. capitata. Kraut, Kohl.
- e) *Kapusta*, Bras. sabauda. Gemüse Kohl, Akkerkohl.
- f) *Jarmuz*, kadeřávek, zelí kadeřavé. Bras. acephala. Braunkohl.

Všechny tyto vůbec známé rostliny u nás se sázejí a požívají co vařivo. Ve starém věku sloužily jako lék proti všem možným nemocem a Mathioli ve svém herbáři píše, že každý hospodář, brukve pěstující mohl říci, že má celou lékárnu ve své zahradě. V knize té je také udáno velmi mnoho rozličných, mezi tím i směšných receptů, na př.: Moč od mladého člověka, který několik dní brukve byl jedl, hojí píštěle, rakoviny, vlky (opruzeniny), lišeje, smahy (znaménka) a všechnu nečistotu na kůži; děti mají se močem takovým omývati, aby zůstaly od mnohých nemocí uchráněny. — Štáva ze surové brukve se solí smíšená a pitá obměkčuje stolicu; — štáva s vínem smíšená a vlažná do ucha dána, navrácuje sluch — štáva s medem vařená a do očních koutků vetřena, vyjasňuje zrak; — štáva do nosu vpravená, počišťuje hlavu atd. Podobným způsobem se tam odporučují košťál, listy, semeno a jiné části brukve, buď zvlášť nebo dohromady; buď surové neb vařené, pro sebe nebo s rozličnými přísadami proti všemožným nemocem. Něco z toho léčení až posud u našeho venkovského lidu se udrželo. Nejčastěji se přikládají čerstvé listy brukvové na hnisající rány a mokravé vředy (boláky, bolavé nohy), ku kterému cíli však se užívá i listů červené řípy, salátu, vína a jiných rostlin, pod kterými rány a vředy často se i zahojí, zvláště když chladící list se častěji obnovuje ueb čerstvým nahrazuje. Léčivá moc neleží však v listech; rány a vředy pod nimi se hojí spíše tím, že jim je věnována větší pozornost a čistota. Zahojily by se jinak mnohem dříve, když by se často vymývaly a vždy čistým, novým neb vypraným šatem obvazovaly. Chudý, pracující člověk, který nemá na obvazky zbytečného prádla přikládá letního času na vředy rád listy; odhodí je za nějakou chvíli, když oteplejí, hnisem pokryty jsou a když svědění neb pálení pocituje; natrhá si snadno čerstvých a sváže nimi hnisu zbavený vřed na novo, a libuje si při tom, že čerstvý list jej chladí, horkost odjímá a svědění neb pálení umírňuje. Horší to je v zimě, když listů není, tu zůstává vřed stále jedním špinavým, hnisem prosáklým zapáchajícím hadrem ovázan, pod kterým se zahojiti nemůže, naopak stále se rozežírá a rozšiřuje.

Kuchyňské odpadky všech druhů brukve dávají se s prospěchem dobytku k pici.

## 12.

**Brusnice.**

*Vaccinium. Heidelbeere.*

Brusnice, borůvka, (černá jahoda, borůvka, čičoretka, čičeretka, černice. *Vaccinium myrtillus. Heidelbeere, Blaubeere.*) Větve ostrohranné. Listy stejnobarevně zelené, eliptické, drobně vroubkovano-

pilovité. Květy jednotlivé, úžlabní. Kraj kališní nedělený. Koruna kulato-bañkovitá, bledozelená, načervenalá. Keř 15—60 cm. Květe v květnu. Roste v lesích, vřesovištích, rašelinách.

Černé jahody, totiž bobule, borůvky, jedí se surové nebo i sušené a s cukrem vařené k zastavení běhavky, průjmu a úplavici červené. Jahody se sbírají v červenci a srpnu pro lékárnu, kde se z nich proti nemocem dříve udaným připravuje též extrakt, od kterého se 1—10 grm. za den užívá. — Listy poskytují dosti příjemné thé, trochu svráskující. Z bobul se zavářejí povidla na vdolky, koláče, též se z nich dá táhnouti silná kořalka. Celý keř slouží k vydělávání kůže.

13.

### Brutnák.

*Borrago. Boretsch.*

Brutnák obecný, (burák *Borrago officinalis. Boretsch.*) Štětinato-srstnatý. Listy vejčité až podlouhlé, řápkaté, nejhořejší polobojímavé. Květy nemnohé, nící, v řídkém lichohroznu, modré, zřídka bílé. Bylina jednoletá 30—60 cm. Květe v červnu až do října. Roste v zahradách; na polích, rumíštích řídkěji zdivočelý.

List čerstvý, šťavnatý, okurkami zapáchající a chutnající, jí se jako salát, dříve též v lékařství se potřeboval i květy se dávaly do jídel, aby krev čistily, lehkou a veselou mysl způsobily. — Květy s cukrem roztlučené užívaly se při horečkách a každém vysílení, i proti zimnici studené. Proti zimnici třetidenní vařil se ve víně brutnák i s kořenem takový, jehož lodyha pouze tři větvičky měla, proti zimnici čtvrtodenní pil se takový odvar z lodyhy více větevnaté. — Popel z usušené a spálené nati s medovou vodou sloužil za kloktadlo proti záškrtu a rozličným nemocem krku, úst, jazyku a dásní. — Šláva z brutnáku vnitř i zevně chválena byla proti uštknutí od hada a jiných jedovatých živočichů. — Vodou brutnákovou vymývaly se zanícené oči.

Teplý vinný odvar nati, kořene a semene dohromady, nebo zvlášť, přikládal se na tělo k utišení bolestí v ledví a kyčli. — Kořen s ječnou moukou a dřevěným olejem vařený přikládal se na studenou sněž a růži (oheň svatý, pekelný.)

Květy brutnáku barví na modro. — Brutnák nepotřebuje žádného ošetřování, sám sebou se rozsívá.

14.

### Bukvice.

*Betonica. Betonie.*

Bukvice lékařská, (bukvice červená, betonie. *Betonica officinalis. Betonie, Zehrkrout.*) Lodyhy k přízemním listům postranní, dole listnaté, asi v polovici s 2 listy, nahoře nahé. Listy dolní srdčito-podlouhlé, hrubě vroubkované. Lichopřesleny hoření na mnoze do klasu zblížené. Koruny vně šedopýřité, nachové, zřídka bílé. Bylina

mnoholetá 30—60 cm. Květe v červnu až do září. Roste v lesích, hájích, na lesních lukách, vřesovištích.

Ještě v předešlém století byla nať bukvicová hledána a jako thé doporučována proti pakostnici, hlavy bolení, padoucnici, souchotinám a proti rozličným neduhům nervovým a sliznicovým; nyní přišla v lékařství docela k zapomenutí; zdá se, že i v domácím léčení málo se jí užívá.

15.

### Cvikla.

Beta. Runkelrube.

Cvikla, (cvika, burák, cukrovka, kvaka. Beta vulgaris. Runkelrube, Mangold.) Listy vlnovitě vykrajované, dolejší vejčité, přísrdčité, hořejší vejčito-podlouhlé, nejhořejší kopinaté. Klubka v tuhých latovitě sestavených klasech. Bylina jedno- neb dvouletá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Květe od července do září. Hojně pěstovaná.



Obr. 6. Bukvice lékařská.

Dle barvy kořene a natě rozeznává se cvikla bílá a žlutá, z nichž se dobývá cukr, pak červená (červená řepa), která vařená se nakládá do octa a jí se k masu. — Někde pijí šťávu cviklovou k vyléčení žloutenice a k většímu vypuzování moče. Vařená bílá kvaka se surovým česnekem užívá se k umoření hlistů, škrkavek. — Štáva se kape do zevnějšího zvukovodu proti hučení a znění v uších; šťávou se též potírají dásně a zuby, když bolí. Čerstvé listy, celé neb roztlučené přikládají se na vředy rozjedlé neb rozžírací. Odvarem listů omývá se hlava proti lupům a hnidům, také se napařují oznožené nohy.

Cvikla jest výborná píce pro hovězí dobytek, k čemuž také se berou pokrutiny z cviklocukráren.

16.

### Čekanka.

Cichorium. Wegwart.

a) Čekanka obecná, (čakanka. Cichorium intybus. Wegwart, Cichorie). Bylina trávov zelená, více méně srstnatá. Listy dolní kracovité neb chobotnatě protisečné, podkvětní ze širšího poloobjímavého

dolejška kopinaté. Úbory dolení po 2—3 v úžlabí listenů. Věvec kališní mnohem kratší než nažka. Bylina mnoholetá 30—90 cm. Květe v červenci a srpnu. Roste na mezích, průhonách, cestách.



Obr. 7. Čekanka obecná.

Kořen jest dužnatý, hořký, plný šťávy, která se z něho vytlačuje. Odporučuje se zvláště při naduřelosti a zácpě sleziny a jater, v žloutenici, těžkomyslnosti a j. V lékárně se nachází kořen, šťáva z něho a extrakt čekankový. K odvaru se užívá 10 až 20 grm. kořene na 200 grm. vody; extraktu 5—15 grm. na den. Šťávy z čerstvého kořene se pije z rána po 70—100 grm. Také syrop se připravuje a dává novorozencům po kávových lžičkách k počištění. — Pro lékárnou sbírá se kořen v dubnu, pak v září a říjnu, listy a nať v červnu i v červenci.

Z kořenů vyrábí se cikorie, která se vařívá s kávou.

b) Čekanka, štěrbák, (štěrbák, endivie. *Cichorium endivia*. Endiwie.) jest předešlé podobná, sází se v zahradách a jí se jako salát. Účinkuje dle *Mathiola* stejně jako čekanka obecná, avšak za naší doby vymizela nejen z lékárny ale skoro i z kuchyně.

17.

## Čemeřice.

[*Helleborus*. *Niesswurz*.

a) Čemeřice černá, (kýchavka, čemeřice, čemerka, sv. ducha koření, černé koření. *Helleborus niger*. *Schwarze Niesswurz*.) Lodyha jednoduchá, nahá, nahoře se 2—3 vejčitými listeny, 1—2květá. Listy přízemní posléz kožovité, znožené 7—9 sečné, úkrojků podlouhlých, k dolejšku klínovitých, z předu pilovitých; květ přímý, bílý neb růžově nadchnutý. Mnoholetá bylina 8—16 cm. Květe od prosince až do dubna. Roste na alpách, bývá však u nás, zvláště v horských zahradách pěstována.

Upotřebuje se kořene a nati. Čerstvý kořen zapáchá; chutná hořce, ostře a odporně. Suchý kořen je mírnější, pozbývá chuti a zápachu původního, vykopává se v podzimku před květením.

Za starých dob byl kořen co výtečný lék znám, doporučoval se v zádumčivosti, třeštivosti, proti psotníku a padúcnici, vodnatelnosti a zastaralým nemocem kožním; při mrtvici a podobných

náhlych případech, při hlístech a zadržené čmýře. Kořen dával se buď zvařený nebo i v extraktu, z něho vydobývaného. Co lék mocně vzhůru a dolů počišťující byl od drahých časů znám.

Posud se čemeřice černé upotřebuje co léku podráždujícího a mocně počišťujícího, avšak v malých dávkách a pouze při osobách chladnokrevných, proti zácpě a zástavě ústrojí břišních, tvrdošijné zimnici střídavé, vodnatelnosti, zastavené zlaté žíle a blednici. V lékárnách se prodává kořen, extrakt a tinktura. Kořene se bere k odvaru neb svařenině 5—10 grm. na 200 grm. vody, od kterého se může za 2—3 hodiny 1 lžice užít. — Prášku z kořene utlučeného užívá se 10—70 ctgr., avšak zřídka kdy, proto že žaludek mocně dráždí; lepší je odvar, nebo nálev. Obvyčejně však se předpisuje extrakt, jelikož mírněji účinkuje, 35 ctgr. až 1 grm. denně, buď rozpuštěný neb v pilulkách. Tinktura se podává 10 až 20 kapek dvakrát neb třikrát za den. Lid používá prášku co kýchadla, sype je na vředy k jich vyčištění a zhojení, přikládá je s octem smíchaný na lišeje a rozličné výrážky kožní, na divoké maso, moří ním vši a zákožky svrabové ve způsobu masti, z černého mýdla, síry, vepřového sádla a prášku z čemeřice zhotovené.

Zde sluší připomenouti, že nerozumné a nemírné užívání toho léku způsobuje násilné dávení, značné bolesti žaludku, mdloby a jiné, mnohem horší příznaky. Proto by neměl nikdo bez porady rozumného lékaře lék tento užívat. — Pro lékárnu sbírá se kořen v únoru a srpnu.

b) *Čemeřice zelená*. *Helleborus viridis*. Grüne Niesswurz. Lodyha doleji bezlistá, šupinatá, nahore 2—3 dělenými listy, 2—4-květá. Listy přízemní znožené 5—7 sečné, úkrojků podlouhle kopinatých, ostře pilovitých. Květy nící, zelené. Bylina mnoholetá 25—45 cm. Květe v březnu a dubnu. Roste v našich horních lesích a bývá též v selských zahrádkách pěstována. Bylina tato má tytéž vlastnosti



Obr. 8. Čemeřice černá.



jako čemeřice černá, upotřebuje se též v nemocech dříve ndaných, účinkuje však mnohem mocněji a rychleji. V lékárnách prodává se též kořen, extrakt a tinktura.

Kořen čemeřice černé i zelené protahují někde jako žíně skrze kůži koňům, aby je prašivosti zbavili, hovězímu dobytku, aby jej z padání vyhojili, prasatům skrze uši proti rúži neb nátce. Někde probodují dobytku ocas a vkládají do rány učiněné kořen tento, aby se rozličným nemocem zabránilo.

18.

## Černohlávek.

*Prunella, Brunelle.*

Černohlávek obecný (hlavuška, svalník menší. *Prunella vulgaris*. Brunelle, Braunelle). Roztroušeně chlupatý neb skoro lysý a zelený.



Obr. 9. Černohlávek obecný (dřípátý).

Listy nedělené, velmi zřídka dole peřenosečné. Dolní znby kališní spoře a krátce brvité. Hoření pysk koruny bez kýlu, dolní dost plochý. Delší nitky se špičatým dosti rovným zubem. Koruny světle fialové, zřídka růžové neb čistě bílé. Bylina mnoholetá 10 až 40 cm. Květe v červenci a srpnu. Roste na lukách, příkopech a leších.

Černohlávek jest chuti nahořklé a natrpkalé, druhdy se potřeboval proti ouplavici a krvotoku. Nať s vínem neb vodou vařená nebo i šťáva z čerstvé nati doporučovala se proti všem vnitřním i vnějším bolestným úrazům, zvlá-

ště s krvácením spojeným. Mladé listy sloužily též k jídlu jako salát. Odvar natě chválen byl jako kloktadlo proti záškrtu, zánětům a vředům v ústech i krku. Stejný účinek má šťáva z čerstvé nati s vínem neb růžovým medem smíšená. Odvarem květuocí natě vy-

mývaly se rány. Štáva s octem a růžovým olejem přikládala se na čelo proti bolestem hlavy.

19.


## Černucha.

*Nigella. Schwarzkümmel.*

a) *Černucha rolní* (*Nigella arvensis*. Feld-Schwarzkümmel). Kališní lístky přišpičatěné, v stejně dlouhý nehet snížené, bílé, z předu modré, se zelenou skvrnou. Prašníky osinaté. Květy bezobalné. Měchýřky do polou srostlé. Semena bradavkatě tečkována. Bylina jednoletá 10—30 cm. Květe v červenci, v srpnu a září. Roste na rolích, písčitéjších polích a stráních.

b) *Černucha šedá*. (Černý kmín. *Nigella sativa*. Garten-Nigelle, Garten-Schwarzkümmel). — Kališní lístky tupé, s krátkým nehem, modrobělavé. Prašníky bezosinné. Květy bezobalné. Měchýřky až nahoru srostlé. Semena na přič svráskalá. Bylina jednoletá 10—30 cm. Květe v červnu a červenci. Jest na některých místech pěstována.

c) *Černucha zahradní*. (Kmín černý planý. *Nigella damascena*. Damascenische Nigelle.) Kališní lístky zakončité, s krátkým nehem, světle modré. Prašníky bezosinné. Květy obalem s listů mnohoblých podepřené. Měchýřky až nahoru srostlé. Jednorocní bylina 15 až 30 cm. Květe v květnu, červnu a červenci. Bývá v zahradách pěstována, někde roste i zdivočelá.



Obr. 10. Černucha rolní.

Semena všech černuch mají chuť příjemnou a vůni citronovou, a proto ve východních zemích se dávají do chleba jako u nás pro chuť kmín nebo fenykl. Semena sluší dříve dobře omyti a pak zvolna sušiti, aby z nich škodlivá vlhkost prchla. Spářenína (asi 1½ grm.) z nich s medem na lačný žaludek užívána, chválí se při nemocech hrtanu a plic, při nadmutí a hryzení břicha; do nosu se vtahuje při obtížném smrkání. — Čerstvý roztlučený kořen zastaví průj krvácení nosu.

20.

## Čertkus.

*Succisa. Teufelsabbiss.*

Čertkus luční (čertkus obecný. *Succisa pratensis. Teufelsabbiss. St. Peterswurz*). Listy jak lodyha přitiskle srstnaté, dolní vejčito-podlouhlé, v řapík súžené, hoření podlouhlo-kopinaté. Úbory posléz kulaté. Kraj kališní 5štetinný. Koruny 4klanné, stejné, lilákově modré, zřídka bílé. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Květe v červenci až do září. Roste na vlhkých a rašelinných lukách.

Kořen je hořký a chová dosti třísloviny; jindá byl lékem váženým proti bělotoku, záškrtu, vodnatelnosti a zevně proti ranám. V tom ohledu užívá lid na některých místech posud odvaru kořene čertkusu. — Více se potřebuje ve zvěrolékařství.



Obr. 11. Čertkus luční.

21.

## Česnek.

*Allium. Lauch.*

a) *Česnek kuchyňský.* (Česnek, česnek obecný; *Allium sativum*). Cibule s hojnými pacibulkami. Okolík cibulkatý, chudokvětý. Lístky okvěti špinavě bílého kopinaté, na kýlu hladké. Mnoholetá bylina  $\frac{1}{3}$ —1 m. Květe v červenci a srpnu. Sází se všude v zahradách pro kuchyň a roste i na polích zdivočelý.

Cibule česneku chová v sobě tekavý, ostrý, silně páchnoucí sirnatý etherický olej, který zvláště dráždí zažívadla, sliznici dychadel a ledviny a byl od starodávna co výborný lék proti hlistům, zvláště škrkavkám a roupům doporučen. Upečený česnek přikládá se na vředy, aby změkly, též dává se odvařený do klistéru proti škrkavkám a roupům. Polévka česneková jídá se před léčením tasemnice. Dříve se doporučoval při kašli zádušném; dával se dítěti 6—7letému ráno a večer 3 díl jedné pacibulky neb „stroužku“, při čemž se i ze šťávy upravená mastička podél páteře natírala.

Kůže česnekem obložená zčervená a zanítí se jako při křenu. Šťáva z česneku na bavlnku vyceděná, dává se do vnějšího zvukovodu při hluchotě, zvláště revmatického původu. První den dává se bavlnka s čerstvou šťávou 5—6krát, načež kůže zčervená, se zanítí a loupe; hluboko do zvukovodu nemá se bavlnka strkatí, aby zánět

z kůže na bubínek nepřišel. Ve Švédsku natírá se mastička z česneku s prospěchem na život po několik dní, v případech, kde zimnice střídavá po chininu nechce ustoupiti. —

K česnekovitým rostlinám náležejí: *b) Pažitka* (šnitlík, ošlejš menší, luk drobný, luček. *Allium schoenoprasum*. Schnittlauch) a *c) Pór zahradní* (pór, pór zimní, ořechovec. *Allium porrum*. Lauch, Poor). —

Obě rostliny se v zahradách pro kuchyň pěstují a jsou každému známy. S kroupovým odvarem nebo i s medem podává se v domácnosti proti zašlemování v prsou. Štáva s medem se užívá a natírá proti uštknutí hadem. Spařené listy přikládají se na oduřilou a bolestnou zlatou žílu. Roztlučené listí neb štáva z nich s octem smíšená přikládá se na čelo při krvácení nosu. Štáva s octem, mlékem neb růžovým olejem kape se do zevnějšího zvukovodu proti bolestem a šumění v uších. Roztlučené listí přikládají se na zhmožděninny a opuchliny, jakož i na obličej k zapuzení pih a jiných skvrn. Štáva se dává na hnisající nečisté rány a na studenou snět (*sphacelus*).

*d) Cibule obecná* (cibule, cibule hlavatá. *Allium cepa*. Zwiebel). Cibule od nejdávnějších časů již pěstovala se pro kuchyň k jídlu a potřebovala se jindá též v lékařství zvláště proti kurdějům, hlistům a jako lék na moč ženoucí. V domácnosti užívá se cibule až posud proti rozličným nemocem.

Štáva cibulová neb voda, ve které rozkrájená cibule přes noc ležela, dává se dětem píti proti škrkavkám. Štávu s vínem pijí ženy, aby dostaly čmýru. Štáva z cibule a fenyklu radí se proti vodnatelnosti.

— Upečená cibule přikládá se na hlízy, nežity, vředy, modré neštovice. Štáva se kape do uší proti šumění, bolestem a přichluchlosti; štáva s octem smíšená a do nosu vtahnutá staví krvácení nosu, ve slunci na tělo natřená zahání pihy a rozličné skvrny na kůži; štáva s medem smíšená a do očí kapaná čistí zrak a zapuzuje temnotu, povlak oční. — Štáva se potřebuje ještě k mnohým jiným nemocem, jakož i cibule celá, kterou báby vyhloubají, dryákem, fenyklem a j. vyplňují, do země zakopávají neb v popeli pekou, na to štávu z ní k užívání procezují a jiné čáry s ní provádějí. — Jmenované česnekovité rostliny jsou vesměs v kuchyni k přípravě pokrmů užitečné. —



Obr. 12. Česnek kuchyňský.

22.

**Č i b r.***Satureja. Saturei.*

Čibr obecný (čabr, čubr, satorye, satoreje. *Saturia hortensis. Saturei, Pfefferkraut*). Lodyha větevnatá. Listy čárkovito-kopinaté, špičaté, celokrajné. Polopřesleny 3—5květé, úžlabní. Koruna liláková, v ústí nachově tečkovaná, sotva delší kopinatých zubů kališních. Bylina jednoletá 30—45 cm. Květe od června do října. Pěstuje se v zahradách.

Nať satorye neb čibru doporučovala se dříve jako thé žaludek posilňující a proti nemocem prsním. Nyní více se upotřebuje jako koření v kuchyni za přísadu k jídlům méně stravitelným, jaternicím, bobům atd. — Nať se sbírá v červenci a srpnu též pro lékárnu, kde se přidává k rozličným lékům vonným.

23.

**Ďáblík.***Calla. Schlangenkraut.*

Ďáblík bahenní, (ďáblík vodní. *Calla palustris. Wasser-Schlangenkraut*). Listy z oddenku článkovaného, plazivého, řapikaté, srdčito-vejčité. Toulec vejčitý, vně zelený, vnitř bílý. Palice vejčitá. Bobule šarlatové. Bylina mnoholetá 15—25 cm. Květe v červnu a červenci. Roste v bařinách, mokřých olšínách.

Kořen z počátku nemá chuti, potom pálí z poněnáhu víc a silněji; jindá se potřeboval zvláště proti uštknutí hadímu a ku pocení. Semeno na prášek roztlučené užívalo se s vínem k docílení čmýry. Kořen uvařený pak v popeli upečený a na prášek roztlučený radil se užívatí s medem proti dýchavičnosti a kašli. Víno s kořenem svařené žene na moč. — Štáva z bobul s heřmánkovým neb dřevěným olejem utiňuje bolesti ušní. Prášek z kořene zasypá se na rozličné, zvláště se rozžírající vředy; prášek s medem natírán hojí pištěly a zahání skvrny i smahy neb znamení od narození na těle. Štáva z kořene kape se do očí při okalu. Čerstvé listy přikládají se na rány.

Loparové a Švédové dělají z kořenů v čas nouze mouku, kterou s obilnou míchají.

24.

**Dejvorec.***Caucalis. Haftdolde.*

Dejvorec mrkvovitý, (*Caucalis daucoides. Haftdolde, wilde Petersilie*.) Lodyha hranatá, nahoře brázdovaná, rozkladitovětvnatá. Listy 2—3krát zpeřené, ústy čárkovité neb úzce kopinaté. Lístky obalíčků 3—5kopinaté. Okolík namnoze 3paprsečný, okolíčky chudokvěté. Ostny žeber vedlejších jednořadé, doleji rozšířené a žlabovité,

od hlavních žebor širší brázdou oddělené. Bílek do vnitř závitkovitě stočený. Plátky bílé neb načervenalé. Bylina dvouletá 10—30 cm. Květe od května do konce července. Roste na rolích, úhorech, cestách, kamenitých stránich.

Dejvorec druhdy v lékařství se potřeboval, jedl se surový nebo i vařený pro čistění krve, proti čtvrtodenní zimnici, prašivíně a příjici. Odvar natě s bílým vínem žene na moč, vypuzuje močový písek, kámen a čmýru, účinkuje proti zácpě jater a sleziny. Při žloutenici doporučoval se odvar tento ráno na lačný žaludek píti, na to koupel vzíti a se vypotiti. K užívání upotřebovala se nat, šťáva z ní vytlačená i semeno.

• 25.

## Denivka.

*Hemerocallis. Taglilie.*

a) *Denivka žlutá*, (lilije zlatá. *Hemerocallis flava*. Gelbe Taglilie, Rothe Goldlilie). Listy čárkovité, (10 až 15 mm. šir.), k dolejšku sůžené; podélná jich žebra jen velmi slabými a sporými příčkami spojená. Úšty žlutého, vonného okvětí ploché, špičaté, jich žebra podélná, jednoduchá, nespojená. Bylina mnoholetá 60—90 cm. Kvete v červnu. Bývá v zahradách pro ozdobu pěstována a roste na některých místech na př. na lesnaté stráni u sv. Antonína u Litomyšle zdivočelá.

b) *Denivka plavá*, (*Hemerocallis fulva*. Rothe Goldlilie). Listy široce čárkovité (2—2½ cm.), jich podélná žebra četnými a dosti silnými příčkami spojovaná. Úšty žlutoplavého nevonného okvětí 3 vnitřní tupé. po kraji vlnovité; žebra podélná zvlášt vnějších úštů příčkami hojně spojovaná. Bylina mnoholetá 1—1½ m. Květe v červenci a srpnu. V našich zahradách velmi obyčejná, někde na př. na skalách u Karlových Varů i zdivočelá.

Obě denivky, od lidu obyčejně *lilije* zvané, byly za starých časů i v lékařství potřebované a sice tím způsobem a též proti těm nemocím, které při liliji bílé uvedeny jsou. Zdá se, že i v domácím lékařství přišly úplně k zapomenutí a že jedině květ bílé lilie na některých místech co domácí, zvlášt zevnější prostředek se udržel. Tatarové dobývají z listů denivky žluté způsob konopí na tkaniny.



Obr. 13. Dejvorec mrkvovitý.

26.

**Dymnivka.***Corydalis. Lerchensporn.*

a) *Dymnivka dutá*, (podražec okrouhlý. *Corydalis cava*, *C. tuberosa*, Hohlwurz, hohler Erdrauch). Hlíza dutá, dole odumřelá, na více místech svého povrchu s kořinky. Lodyhy k pupenu hlízovému, ze šupin a lupenů sestávajícímu po-



Obr. 14. Dymnivka prstnatá.

bočné, dole bez šupinky. Listy 2krát 3sečné. Listeny hroznu celokrajné, pořídku nejdolejší 2 až 3-klanné. Kraje hořeního pysku koruny silně ohrnuté. Květy světlonachové neb bělavé. Mnoholetá bylina 10 až 30 cm. Květe v dubnu. Roste v hájích, plotech a houštích. Kořen čerstvý má chuť hořkou, pelyňkovou. U starých lékařů byl vážen jako kořen podražcový a dětem proti škrkavkám předpisován. Vně poskytoval se na prášek roztlučený k čistění vředů a provalenin, k uvarování mrti v kostech. Též přikládal se s topolovou mastí proti oteklým zlatým žílám a zastaralým oteklinám mandlí a hrdla.

Stejně účinky se připisovaly b) *Dimnivce prstnaté* (*Corydalis digitata*) a c) *Dymnivce bobovité* (*Corydalis fabacea*), které též v hájích a křoviskách rostou a předešlé podobny jsou.

27.

**Divizna.***Verbascum. Wollkraut.*

a) *Divizna velkokvětá* (divizna sapovitá. *Verbascum phlomoides*. Wollkraut, Königskerze). Lodyha a listy plstnaté. Listy prostřední a hoření více méně a často úplně sbíhající. Hrozný tlusté z více-květých svazečků složené. Koruna kolovitá, plochá, velká, citronové žlutá, zřídka bílá. Nitky 2 delších tyčinek  $1\frac{1}{2}$ —2krát delší než prášník po jedné straně hluboko sbíhající. Čnělka dlouhá s bliznou sbíhající. Bylina dvouletá  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Květe v červenci, srpnu a září. Roste na kamenitých stráních, cestách a rumištích.

b) *Divizna malokvětá* (*Verbascum thapsus*) předešlé podobná, hlavně s drobnějšími květy, roste na těchže místech. — Slizké a zahořklé listy obou rostlin potřebovaly se již za staré doby za obklady obměkčující, a květ, též sliznatý, příjemný a sličí jako thé, hlavně v nemocech plicních. Posud jsou v lékárně květy, jichž se k nálevu dává 10 grm. na 200 grm. procezeniny. — Listy lid sparuje ku kašičkám, zahřivkám, bolest utišujícím a obměkčujícím obkladům a ke klystéru. — Pro lékárnou sbírají se květy v červenci.

28.

### Dobromysl.

*Origanum. Dosten.*

a) *Dobromysl obecná.* (Dobrámysl domácí. *Origanum vulgare.* Dosten. Wohlgemuth.) Lodyha slabě hranatá, větvevnatá, nahoře listnatá. Listy vejčité, špičaté, skoro celokrajné, spoře mrtnaté. Listeny vejčité, lysé. Klasy krátké, příkulaté. Kalich stejně 5zubý. Koruny kalně světlonachové neb bílé. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Květe v červenci a srpnu. Roste na výslunných, keřnatých kopcích, krajích lesních.

Nať zápachu silného, příjemného, chuti kořenné a nahořklé, druhdy se potřebovala v lékařství proti zástavě v cévách prsních a břišních, proti kataru, dychavičnosti, zastavené čmýře a bělotoku. Užívalo se natě jako thé 5—10 grm. na 2—300 grm. vody. Rozkrájená nať posud se v lékárnách prodává, avšak pouze k odvlažování, na mokré a suché obklady a ke koupeli. — Pro lékárnou sbírá se nať v červenci.

Někde ji dávají místo chmele do piva a též ji pijí místo čaje čínského.

b) *Dobromysl voněkras.* (*Origanum majorana.* Meiarn. Majoran.) Každému pod jménem „marjánka“ známá, pěstuje se v zahradách.



Obr. 15. Divizna velkokvětá.



Kvete v červenci a srpnu, koruny má načervenalé bílé. Vůbec známé to koření kuchyňské. — Kvetoucí nať na mnohých místech v červenci sbírají, suší, na kousky rozkrájenou pak uschovají. Užívá se jako thé při nesnadném zažívání, nadýmání a při nemocech travidel vůbec. Zevně upotřebuje se ke koupelím, mokrým i suchým obkladům, kloktadlům a práškům kýchacím.



Obr. 16. Dobromysl obecná.

V zahradách pěstuje se *b) douška vlašská* neb *Tymián*. (*Thymus vulgaris*. Thymian), které se podobně používá.

V kuchyních je tymián na některých místech velmi oblíben.

29.

### Douška.

*Thymus*. Quendel.

*a) Douška mateří*, (mateří douška, žadovník. *Thymus serpyllum*. Quendel, Feldthymian). Listy malé, tuhé, přitlustlé, za sucha vezpod vynikle čárkované, čárkovité až podlouhlé neb eliptické, v krátký řapík klínovitě súžené. Koruny pěkně růžové. Bylina mnoholetá. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste na písčinách, pahrbcích výslunných, vřešovištích.

Kvetoucí nať sbírá se v červnu a červenci pro lékárnu, kde se prodává k lázním a záhřivkám. Jako thé se málo kde na venkově pije proti slabému zažívání a křečovitému záchvatům.

Včelám poskytuje dobrou pastvu.

30.

### Drchnička.

*Anagalis*. Gauchheil.


Drchnička rolní. (Kuří mor. *Anagalis arvensis*. Gauchheil). Lodyha od dolejška rozkladitě větevnatá, 4hranná. Listy vstříčné neb po 3 v přeclelu, přisedlé, vejčité neb podlouhlo-vejčité. Květy úžlabní dlouhostopečné, s plodem nazpět ohnuté. Úšty kališní kopinaté. Úšty korunní z předu zubaté a hustě žláznato-brvité, červené, pletní neb zřídka bílé, aneb tytéž skoro bezžlázne pouze zubaté a modré. Bylina jednoletá 8—16 cm. Kvete od června do září. Roste na polích, rolích, záhonech.

Drchnička druhdy se potřebovala v lékařství. Drchničku s červeným květem nazývali *kuřimor samec*, s modrým květem *kuřimor*

*samice*. Šťávou ze samce natírali řiť, aby tok zlatých žil se spustil, šťávou ze samice pak aby se zastavil; též natírali řiť šťávou ze samice, aby vyšlé neb vychlípené střevo do těla nazpět se vtáhlo, kdežto naopak šťáva ze samce střevo prý vytahovala. (Mathioli.)



Obr. 17. Douška mateří.



Obr. 18. Drchnička rolní.

Z toho lze viděti, na jakém stupni tenkrát lékařství bylo. — Víno s natí vařené pilo se proti kamenu, zácpě jater a vodnatelnosti, též při uštknutí hadem a pokousání psem, při čemž se i rány tím vínem nebo i šťávou z čerstvé natě vymývaly. — Zvařená drchnička přikládala se na hnisající a rozžírající se vředy, na horké otoky, na rány vůbec, aby se nezanítily; s jedlovou pryskyřicí prý i třístky, bodláky a jiné do těla vražené věci vytahovala. Šťáva do nosu vpravená zastavovala rýmu, s medem smíšená a do uší vetřená sloužila k seslzení a objasnění zraku.

31.

## D ř í n.

*Cornus. Hornstrauch.*

Dřín, (dřínkový strom, dřínka. *Cornus mas* neb *masculla*. *Kornellkirsche*, *Horlitzentrauch*). Listy eliptické neb vejčité, v tupoučku špičku povytáhlé. Květy žluté, v okoličkách skoro kulovatých, pode-

přených, obalem 4 šupin kožovitých asi stejně jako okolík dlouhých, před listím se vyvinující. Plod (dřínky) podlouhlý, červený, převislý, s pečkou houbovitě děrnatou. Keř nebo strom 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—6 m. Květe v březnu a dubnu. Roste v listnatých hájích na keřnatých pahorcích, jinde sázený neb zdivočelý.

Před časy měl také dřín v lékařství dobrou pověst. Přičítali dřínkám moc stahující, svráskající a proto se dávaly při běhavce, úplavici a podobných nemocech. Mízou ze zeleného listu hojil se svrab, lišej a rány. Kůra dřínová chválena byla místo chinu proti zimnici studené. V lékařství ovšem již dávno ustoupiti musel dřín lékům mnohem lepším, avšak lid se ho posud drží. Šťavnaté a dosti příjemné dřínky se požívají surové nebo i s cukrem zavařené a naložené. Listy sušené piji se také jako thé, které příjemně chutná.

V ohledu řemeslnickém jest dřín mnohem znamenitější. Dříví jeho bílé neb zažloutlo-bílé náleží mezi nejtvrdí a nejvytrvanlivější, a proto jak soustružníci, tak i truhláři ho vyhledávají. Též slouží k dělání pevných špicí do kol. palců na kola mlýnská, obručů i tyček k vínu a vesměs nástrojů trvanlivých. Nejpevnější cvočky reží se z něho.

Kůry možno užiti k vydělávání kůže a barvení. Kůra kořenová barví sukno na rezavo, větвовá na žluto a dříví na hnědo. Z dřínků kvašením možno víno a kořalku připravit.

Dřín roste v každé půdě, není-li příliš vlhká; rozmnožuje se hřízenicemi, oblouky, odnožemi, též i semenem, kterým nejlepších se docílí keřů a stromů. Nejlépe jest celou dřínku nebo-li plod na podzim do země zasaditi.

32.

## Dřišťál.

*Berberis Sauerdorn.*

Dřišťál obecný (dřišťál, vančar, vanžár. *Berberis vulgaris*. Sauerdorn, Berberitze, Weinschädling). Listy v svazečkách, opakvejitě, jemnoostnitě pilovité; pod svazečkem trn namnoze 3klanný na místo listu. Hrozny hojnokvěté, převislé, květy žluté. Bobule podlouhlé, šarlatové. Tyč. dráždivé. Keř nebo strom 1—3 m. — Kvete v květnu. Roste v křovištích, plotech, na stránkách, v mnohých sadech pěstovaný.

Kořen jest chuti trpké, svraskavé; lýko má chuť hořkou zatrpklou; mladá nať je jako šťovík kyselá; bobule (dřišťalky) jsou příjemně kyselé, trochu svraskavé.

Za dřívější doby užívalo se lýčí neb lýko tři hodiny v bílém víně močeno co lék posilňující a počistující, neb s vínem buď bílým neb červeným svařené proti žloutenici. Prášek z lýka v octě močený proti žabrámu, moučnicku v ústech u dětí. Kůra proti nezáživnosti a slabosti žaludka i střev vůbec; hořké prvky mohou se vodou, líhem a vínem vytáhnouti.

Bobule neb dřišťalky pro svou kyselinu mírně chladí, žízeň hasí a hnití odpirají; protož užitečné jsou při všech nemocech s přílišným horkem a žízni spojených, též i v chorobách počasných od pokažení krve pocházejících na př. kurdějích atd. Nejlépe šťáva z nich k pití do vody, neb k jiným lékům se přiměšuje. Šťávou vyplakují se ústa při krvácení dásní a kurdějích. K tomu cíli mohou se i listy svařiti. Z dřišťalek se dělá sirup a sice svařením 1 libry čerstvě vytlačené šťávy s 2 librami bílého cukru; sirupu se dává



Obr. 19. Dřišťál obecný.

po 20—40 grm. do mixtur, svařenin neb spařenin, nebo i do vody k pití. Také se z dřišťalek zhotovovaly povidla a pokroutky. Pro lékárnu sbírají se dřišťalky v září a říjnu.

Kuchařky zavářejí uzralé, jáderek zbavené dřišťalky na způsob třešní, anebo je suší na způsob šípků, aby je v čas potřeby vařily se sušenými švestkami neb hruškami; také z nich huspeninu, zmrzlinu a šťávu připravují. — Jádérka pozorně usušená a v pytlíčku uzavřená zavěšují se do červeného vína, když červené barvy po-  
zbylo; za několik dní prý víno opět zčervená. — Pražená rozemletá

a vařená jádérka mají chuť kávy podobnou, zvláště když se jim přidá stejný díl pražené mrkve, která zatrpklou příchutí odjímá. Lisováním dávají jádra dobrý olej. Z dřívíštělek může se kořalka a ocet dělati. Soli, která při vyrábění ze šťávy zůstane, možno upotřebiti jako šťávy citronové nebo soli štavelové k vycídění skvrn ze šatstva. Suchými pružnými hřebeny hroznů možno vycpati polštáře.

Značného užitku podává dříví a kořen, zvláště lýko dřívíštělu, jež slouží k barvení lněného a bavlněného zboží na žluto a zeleno. Též safián a dříví se barví jimi na žluto. Také bobule dávají pěknou barvu; šťáva jejich smíšená s kamencem dává červenou barvu a výborný červený inkoust. Hedvábí, vlna, len, bavlna mohou se šťávonou na růžovo barviti. Šťáva s jinými látkami smíšená poskytuje barvu červcovou a hnědou. — Někde natírají jircháři šťávou bobulovou kozí usně, aby dostaly pěkný lesk.

Dříví starších kmenů jest pěkně žluté a velmi tvrdé, dá se dobře leštiti; též kořen je dosti silný a pěkně merhovaný, pročež mohou obou upotřebiti jak truhláři tak i soustružníci; z rovných odnožů dělají se holi a trubky k dýmčím. Ploty dřívíštělové časem tak zhoustnou, že není možno jimi proniknouti. — Všechn dobytek vyjma koně žere rád listy dřívíštělu; květy mají mnoho medu a bývají od včel pilně navštěvovány.

Dřívíštěl snadno se rozmnožuje semenem, odnožemi a hříznicemi; nežádá ani obzvláště dobré půdy ani nějakého hlídání; nejlépe se daří v zemi z písku a hlíny smíšené, ačkoliv také v kameňaté dost bujný jest. Semeno seje se buď časně z jara, nebo ještě lépe v podzimku, ježto časně v jaře již klíčí a hned prvního leta v keříček pěkný vzrostá. Odnože pozorně od starých kmenů se oddělují, dobře prožejí a zasadí. Hřízence v jaře z loňských snětviček se sbírají, úkosno na 4—6 palců vzdálí do země se zastrčí a zalejí, jestliže jest sucho.

Kořeny k užítům barvířským vydobývají se následujícím způsobem: Z jara neb v podzimku vykope se na jedné straně jáma, aby se mohly odtud kořeny odejmouti, buď osekatí neb rýčem uřezati. Tím netoliko křovina se zachová, ale i omladí, a bujněji pak roste. Za dvě nebo tři leta na této straně osekané kořeny dost silně vyhnala, takže zase z druhé strany podobným způsobem odejmouti se mohou. Také způsob ten má užitek, že ploty z křovin těch udělané tuze mnoho půdy nezaujímají a vždycky v mezích svých zůstávají. Také v plotech nížce držaných má dřívíštěl své místo, protože přiřezávání dobře snáší, ovšem, že pak málo ovoce nese. Ptactvu poskytuje keř tento nejen hojné a dobré potravu, nýbrž i trnitými pruty svými vydatné ochrany.

Někteří hospodáři varují, aby se dřívíštěl nesázel blízko obilí, poněvadž prý zvláště u žita hluchost a rezovatost způsobuje. Celkem však užitečný dřívíštěl zasluhuje, aby pěstován byl pro uvarování všeho, třeba jen na místech od obilí vzdálenějších, kterých zajisté dosti se vynajde.

## Drnavec.

*Parietaria. Glaskraut.*

Drnavec lékařský, (drnavec obecný, bouchavec, bouchaveček, střílice, zlobice, den a noc, sklenní bylina. *Parietaria officinalis. Glaskraut, Tag u. Nacht, Sct. Peterskraut*). Lodyha přímá, jednoduchá neb krátkovětvná. Listy vejčito-podlouhlé, k oběma koncům súžené, celokrajné, bradavkatě tečkované. Okvětí obojakých květů zdělí tyčinek, asi zdělí listenů obalných okolo úžlabního květenství. Květy drobné, zelenavé. Bylina mnoholetá 30—90 cm. Kveté od června do srpna. Roste na zdech, křovištích, rumištích.

Nať obsahuje sanytr čili ledek a síru, žene na moč. Nať zvařená nebo i voda z ní pálená odporučovala se dříve proti dlouhotrvajícímu kašli; šťáva z čerstvé natě proti zástavě moče a písku v moči; k tomu cíli se také ze šťávy a cukru připravoval sirup. — Čerstvá rozmačkaná nať se přikládala na rúži, snět a horké vředy, šťáva s bělobou jako mast hojila rozžírající se vředy, lišeje, trudy neb uhry, šťáva s kozlím tukem mírnila bolesti dnové; šťáva s medem rozháněla kloktáním zánět mandlí v krku; šťáva s růžovým olejem do zevnějšího zvukovodu dána, utišovala bolesti v uších.

Prášek z usušených a roztlučených listů sypal se na rány, aby bez zánětu rychle se zacelily.



Obr. 20. Drnavec lékařský.

## D u b.

*Quercus. Eiche.*

*a) Dub zimní* (drnák, zimák, zimnák. *Quercus sessiflora. Traubeneiche*). Listy dlouhořapíčné, dospělé, vezpod pýřité až huňaté, v řapík klínovitě sbíhavé neb dole široce a mělce vykrojené. Plody na stopce kratičké úžlabní. Strom. Květe v květnu. Roste v lesích.

Sem patří též *b) dub šipák* (*Quercus lanuginosa*) a *c) dub letní* (křemelák, letnák. *Quercus pedunculata*), který roste v lesích, hlavně v nižších polohách.

Kůra ze všech kmenů uzavírá v sobě mnoho třísloviny a kyseliny duběnkové, a proto slouží co lék svírající; že však je těžko

stravitelná, užívá se jí obyčejně jenom zevně, v odvaru po 40—70 grm. K obkladům, vystříkování a sice proti výklopu pošvy, dělohy a konečníku, bělotoku, nádorkům zlaté žíly, městským, průtrži; nebo co kloktadla proti trvalé ochablosti čípku, zánětu mandlí a jiným nemocem ústním a hrdelním, nebo ke koupeli při všeobecné slabosti svalů a ochablosti kůže.

Podobně jako kůra účinkují, avšak mnohem silněji, též duběnky, výrostky to na listech kulovaté. — Žaludy usušené, oloupané, pak upražené a hned na prášek roztlučené, vaří a pijí se jako káva, zvláště co lék proti úbytu, křivici a krticím u dětí, dále i proti počasným běhavkám, bělotoku, bezsilným krvotokům dělohy a jiným, se všeobecnou slabostí těla spojeným nemocem.

Kůra a žaludy v lékárně jsou na skladě; kůra se sbírá v březnu a dubnu, žaludy v srpnu.

Dříví z dubů jest velmi pevné a trvanlivé, hodí se k zhotovení rozličného náradí a ku stavení; méně k pálení a děláním uhlí. Kůra z větví a mladších kmenů jest nejlepší k dubení kůží. Žaludy jsou nejhlavnější pokrm vepřového dobytka. Duběnky, kulovaté to hladké výrostky na listech jsou v bavírství a k přípravě inkoustu velmi vážené. Duby dosahují stáří až 1000 let.

35.

## F e n y k l.

*Foeniculum. Fenchel.*

Fenykl obecný (kopr vlašský, fenykl. *Foeniculum capilaceum*. *Anethum Foeniculum. Fenchel*). Lodyha jemně rýhovaná, jak listy lysá a sivě ojiněná. Listy 3- vícekrátě peřenosečné, úkrojů čárkovito-šídlovitých, prodloužených; pošvy dlouhé, nahoře mázdřité 2 ušetné, hoření s malou čepelí. Obal a obalíčky žádné. Plátky žluté. Zápach aromatický. Bylina dvouletá  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Kvete v červenci, srpnu a září. Pěstuje se, zřídka zdivočuje.



Obr. 21. Fenykl obecný.

Semeno chválí se jako anisové proti větrům, nadmutí břicha a nemocem prsním, zvláště počasnému kašli, proti kyselině žaludeční, kojným i kojencům, běhavce malých dětí a j. — V lékárnách je k dostání semeno, prášek, voda a olej fenyklový. — K nálevu se bere 15—20 grm. prášku na 200 grm. vody. Prášku smíšeného

s osladičovým neb jiným se užívá kávová lžička 2—3krát deně; vody fenyklivé 20—40 grm., oleje 1—2 kapky s cukrem.

Semeno jest v kuchyních velmi oblíbené.

36.

### Hadí jazyk.

*Ophioglossum. Naterzunge.*

Hadí jazyk obecný. (Hadí jazýček. *Ophioglossum vulgatum. Naterzunge.*) Čepel neplodná, vejčitá neb podlouhlo-vejčitá, sítnato-žilnatá, celokrajná, objímavá; řapík je s řapíkem plodní čepel do půl délky jeho srostlý. Bylina mnoholetá 5—30 cm. Květe v červnu a červenci. Roste na vlhkých slatinných lukách.

Za starých časů doporučoval se hadí jazyk v odvaru k pití, proti chrlení krve, úplavici červené a bělotoku. Zevně se přikládá na rány, aby se brzo zacelily, a s vepřovým sádlem smíšený na otekliny a proti mrtvé neb studené sněti. Červeným vínem s nati vařeným vymývaly se bolavé a zanícené oči.

37.

### Hadí mord.

*Scorzonera. Schwarzwurz.*

a) *Hadí mord španělský.* (*Scorzonera hispanica. Schwarzwurz. Schlangenmord.*) Lodyha namnoze s dlouhými lúbornými větvemi, dole hojně, nahoře oddáleněji listnatá. Listy trochu tuhé, nazpět ohnuté, podlouhle elipčité až čárkovité, dlouze zakončité, celokrajné neb zubaté, rozšířeným zpodem přisedlé. Zákrov válcovitý, dole břichatý, 10listečný; vnitřní lístky podlouhlé, špičaté, trochu kožovité, 3 nejvnější mnohem kratší, vejčité. Květy žluté. Bylina mnoholetá 30—90 cm. Květe v červnu a červenci. Roste na travnatých chlumech, stráních, na vápně a jílu.

Někde se sází v zahradách pro jedlý kořen; jindá byl za výtečný prostředek proti uštknutí hadímu, dále proti každému otrávení a morovým nákazám. K tomu cíli se užívala zvláště šťáva z této rostliny. Kořen s cukrem zavařený doporučoval se proti zácpě jater a sleziny. Šťáva kapala se do očí k zesílení zraku.

Na horních, lesních i bažinných lukách roste b) *Hadí mord nízký.* (*Scorzonera humilis.*) Kořen jeho jest zahohklý a potřeboval se za starých časův jako lék krev počistující a obměkčující.



Obr. 22. Hadí mord.



38.

**Hadinec.***Echium. Natterkopf.*

Hadinec obecný (volský jazyk, volový jazyk planý. *Echium vulgare. Natterkopf, wilde Ochsenzunge*). Štětinato-chlupatý. Listy kopinaté neb čárkovito-kopinaté. Lichohrozný četné, krátké, v jehlan-covitě úzké latě. Trubky koruny modré, zřídka růžové neb bílé, kratší kalicha. Tyčinky sehnuté, na kraj koruny přiložené. Bylina dvouletá 30—90 cm. Květe od června do září. Roste na me-zích, cestách, zdech, kopcích.



Obr. 23. Hadinec obecný.

dito-větevnatá. Listy rozkladitě 2—3krát zpeřené; lístky vejčité, hluboce peřenoklanné s úšty kopinatými. Okolíky více-paprsečné, krátce stopkaté, často zdánlivě postranní okolíčky rozložené, nepaprskující. Květy všechny obojaké, plodné, bílé. Plod vejčito-podlouhlý. Mnoholetá bylina  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Květe v červenci a srpnu. Roste ve vodách stojatých, příkopech, rybnících.

Semena chuti hořké a zápachu odporného potřebují se proti zasliznatělosti plic. Odporovala se velmi proti souchotinám, jakož i proti všem katarům dychadel s dobrým výsledkem ve spojení s ibišem neb islandským mechem.

Herbář.

Kořen sliznatý, též nať a semeno potřebovali před časy v lékařství. Kořen, listy nebo i semena ve víně vařená zvláště se doporučovala proti uštknutí hadem, i mělo se za to, že člověk, který odvaru toho se napil, před hadem neměl se ani co báti. — Hadinec utiňuje prý též bolesti v bedrách a ledvích. s vínem neb v polévce vařený doporučoval se k jídlu matkám a kojným, aby měly hojnost mléka.

Květ dává včelám dobrou pastvu. Dobytek se nati ani netkne.

39.

**Halucha.***Oenanthe. Rebendolde.*

Halucha, kmín vodní. (Vodní kmín. *Oenanthe phellandrium. Wasserfenchel*.) Mrcásky kořenové nitovité. Lodyha rozkladito-větevnatá.

Užívá se buď v prášku 70 ctgr.—1½ grm. 3—4krát za den, nebo v nálevu 10—15 grm. na 200 grm. vody. — Semeno materialisté a lékárníci kupují, sbírá se v srpnu.

40.

## Heřmánek.

*Matricaria*. ☞ Kamille.

a) *Heřmánek pravý* (heřmánek obecný, rmen, ormánek. *Matricaria chamomilla*. Kamille). Lodyha řídká listnatá. Stopky úborů prodloužené, sotva ztlustlé. Koruny v terči 5zubé, žluté, v paprsku jazykovité, bílé. Nažky na břišní straně 5žebré, bez podélných pruhů. Zápach aromatický. Jednorocní bylina 15—30 cm. Květy od května do konce srpna. Roste na rolích podle cest a na pustých místech.

Květy heřmánkové jsou výborný lék proti rozličným křečím, u ženských zvláště od ústrojů pohlavních pocházejících, proti nadýmání břicha, hysterii, rozličným křečím z ochablosti zaživadel povstalým, i proti lehčí zimnici studené. Zevně se doporučuje k vymývání očí, ke kloktání, k vystřikování, ke klystéru, na obklady buď mokré, neb suché, v prášku i k zasypání na př. při katarhalických, rheumatických zánětech očí, opuchlinách, nečistých, hnisajících vředech a j.



Obr. 24. Halucha. (Kmín vodní.)

V lékárnách se prodávají květy, prášek z nich, voda, extrakt, olej a tinktura. Květu se běže k nálevu 5—20 grm. na 200 grm. vody; extraktu 2—5 grm. za den buď v pilulkách neb smíšenině tekuté; oleje 1—3 kapky; tinktury 10—20 kapek tři až čtyřikrát denně.

Podobně účinkuje každému známý *b) Heřmánek římský*, vlastně *rmen římský* (rmen plný. *Anthemis nobilis*), který na polích suchých a na těchže místech jako předešlý roste, v červnu až do srpna květe, bujnějším vzrůstem a větším květem se vyznamenává. — Pro lékárnu sbírají se květy heřmánku v červnu a červenci.



Obr. 25. Hlaváček jarní.

staralém bělotoku, sváří se 5 grm. na 200 grm. vody. Květy s voskem třené rozhání otoky vodnatelné a opuchliny.

V řemeslech sloužil k barvení na žluto.

41.

### Hlaváček.

*Adonis. Adonis.*

Hlaváček jarní (falešné koření černé, černé koření domácí, falešný neb český ellebor. *Adonis vernalis*. Frühlings-Adonis). Lodyha listnatá, nejdoleji šupinatá. Nažky chlupaté, v strboulku kulato-vejčitém. Kališní lístky vyhlodaně zubaté; plátky 2krát jich delší, podlouhlé, rozložené, žluté, 10 až 20 do počtu. Bylina mnoholetá s oddenkem 10—30 cm. Květe v dubnu a květnu. Roste na travnatých vrškách, pastvinách, na pahrbcích a kopcích výslunných.

Kořen čerstvý má zápach silný, hnusný; chuť ostrou, hořkou, při tom jaksi zasládlou. V ztřeštěnosti prý znamenitě účinkuje. Nař se chválila v za-

42.

### H l o h.

*Mespilus. Weissdorn.*

Hloh obecný. (*Mespilus* neb *Crataegus oxyacantha*. Weissdorn, Hagedorn.) Listy klínovito-opakvejčité neb okrouhlé, 3—5laločné, lysé, neb z mládí roztroušeně pýřité. Květy četné v přímém chocholíku neb chocholičnaté latě. Plody červené, elipsoidní neb příkulaté, na vrcholku s terčem mnohem užším, než průměr plodu, s krátkými vejčitými zakončitými ušty kališními. Keř 1—4½ m. Květe v květnu a červnu. Roste v křovištích, plotech, hájích.

Plody (hlohyně, hložky, hlůžky) užívá někde lid proti úplavici červené, přlíšnému toku čmýry a kamenů; roztlučení kořen přikládá se na kůži, do které třístky, trní a j. zabodnuty byly.

Hloh je výborný keř na ploty; dříví jeho je tvrdé a od soustružníka hledané. Jemu podobný a též tak užitečný je *hloh ostrolistý* (*crataegus monogyna*) v křovících po Evropě rozšířený; květe o 14 dní později. Pro ozdobu v zahradách sází se též u nás *hloh červenový* (*Cr. coccinea*) a *hloh leskutý* (*Cr. Crus*).

43.

### Hluchavka.

*Lanium. Taubnessel.*

Hluchavka bílá (hluchá kopřiva, kopřiva mrtvá, psoser. *Lanium album. Weisse Nessel, Taubnessel*). — Listy hoření 3. hranné vejčité neb vejčito-podlouhlé, dlouzeji zašpičatěné. Polopřesleny 5- až 8květé. Kroužek chlupů šikmo na zad vystupující. Kraj ústí mimo šidlovitý zoubek namnoze ještě se 2 kratičkými zoubčky. Hoření pysk odstále dlouze huňatý. Koruna špinavě žlutavo-bílá. Bylina mnoholetá. Květe od dubna do září. Roste v pitech, na návsi, zdích, cestách. — Nať zapáchá nepříjemně, chutná zahořkle. Květy dříve v lékařství se potřebovaly. Posud se má za to, že čistí krev a jako thé se pijí, zvláště proti bělotoku. — Na severu jedí mladou nať; u nás se na jaře trhají lístky na polévku bylinnou.



Obr. 26. Hluchavka bílá.

44.

### Hořčice.

*Sinapis. Senf.*

a) *Hořčice bílá* (hořčice. *Sinapis alba. Weisser Senf.*) Listy lýrovité přenodílné, nejhořejší namnoze 3klanné. Šešule krátká, bílými šetinnami srstnatá; zoban zdělí neb delší samé šešule, mečovité smáčknutý, obak se 3. ke střední čáře bližšími žebry, po obou stranách jich čárkovaný. Květy světle žluté. Bylina jednoletá 30 až 60 cm. Pěstovaná a zdivočelá.

Na některých místech se též pěstuje pro semeno b) *Hořčice černá* (*Sinapis nigra. Schwarzer Senf*); jest silnější nežli předešlá.

Prášku ze semene hořčice bílé užívá se 1 lžička před snídaním neb obědem k lepšímu trávení. Také se může užívat v ná-

levu 10—15 grm. na 200 grm. vody, mléka, piva neb vína, proti vodnatelnosti a slizné dýchavičnosti.

Prášek ze semene hořčice černé více se potřebuje zevně, k hnětenkám neboli plackám místo křenu; k umývání 20—40 grm. na 200 gr. vody, proti kožním vyrážkám, oznoheninám a ochromeninám; též ke koupeli, při čemž se 200—300 grm. prášku do plátěného pytlíčku zaváže, vřelou vodou spaří a pak pytlíček do vany ponoří. — V lékárně lze dostati též lih a etherický olej hořčicový, od kterého se dává k mazání buď 6 kapek do 5. grm. jiného oleje, neb 2—4 kapky do 40 grm. lihu.

Semena pro lékárnou sbírají se v srpnu, září a říjnu.

Ze semena se připravuje hořčice (senf) k masu hovězímu a jiným masitým pokrmům; též se z něho vytlačuje dobrý olej k jídlu.



Obr. 27. Hořec šumavský.

Květy v hořených úžlabích po 2—5. nejhořejší 2 lichopřesleny s konečným květem v strboul splývají. Ústý kališní nazpět ohnuté. Koruna 5—7klanná, brunatě nachová, tmavěji tečkovaná, dole zeleno-žlutavá. Mnoholetá bylina 30—45 cm. Květe v červenci a srpnu. Roste na horních lukách.

b) *Hořec tolitový* (hořec modrý, hořepník modrý, tolitový. *Gentiana asclepiadea*. Schwalbenwurztiger Enzián). Oddenek s kulovým kořenem, s lodyhami konečnými. Listy vejčítokopinaté, dlouze zakončité, 5tižilné. Květy trochu jednostranné, všecky jeduotlivé (pořídku prostřední po 2), překrátce stopkaté, vstříčné, bez listenů. Kalich dlouze válcovitý; trubka 3—5krát delší čárkovitých

45.

## Hořec.

*Gentiana. Enzian.*

a) *Hořec šumavský*, (Hořec červený, český, uherský, hořepník uherský. *Gentiana pannonica*. Österreichischer Enzian.) Oddenek krátký s lodyhou konečnou, chudolistou. Listy dolní vejčité neb podlouhlo-eliptické, skrojené v řapík na pošvě sedící, hoření vejčítokopinaté. Nejdolejší (lupinovitě) listy v delší pošvě dole srostlé. —

ústí. Koruny sinomodré, v ústí tečkované, zřídka bílé. Bylina mnoholetá 30—90 cm. Květy v srpnu, září a říjnu. Roste na lesních lukách a pastvinách horních, v Čechách zvláště na kraji lesů v Krkonoších a horách Jizerských.

Známo je ještě jiných druhů hořce, na př.: c) *Hořec brvový, křížatý, obecný* atd., které na podobných místech rostou. — Kořen pro lékárnou sbírá se v září a říjnu.

Ačkoliv všechny druhy hořce co do povahy a účinků se srovnávají, proto přece alespoň nynějšího času v lékárnách vážen jest kořen hořce šumavského a hořce žlutého (*Gentiana lutea*), který v jižnější Evropě roste, avšak dle některých také na Krkonoších na Sněžce a v Šumavě na Arbru a Rachlu býti má.

Nyní se užívá hořce jako léku čistě hořkého, zažívání podporujícího, při ochablém trávení a při všech z toho povstalých neb s tím spojených nemocech. K tomu cíli je pohotově v lékárnách koře rozkrájený, prášek z něho, extrakt a tinktura.

Kořenu se běře k nálevu neb odvaru 5 až 10 grm. na 200 grm. vody.

Prášku se méně užívá, protože je velmi odporný, obyčejně v pilulkách po 4—70 ctgr., častěji se předpisuje extrakt v téže dávce buď v pilulkách neb rozpustěn ve vodě mátové, skořicové a j. Tinktura se užívá 40—60 kapek dvakrát neb třikrát denně.

Ačkoliv chuť hořce jest dosti příjemná, proto přece některé osoby ji nesnesou, zvláště pozorně se má dávat lidem suchým, popudlivým a k zánětům nakloněným.

Za starých časů užíval se hořec proti mnohým nemocem, proti slabosti ústrojí zaživacích a z ní pošlých obtíží, žíze, kyselosti, zaslizení, nadýmání, krkání, vrhnutí, běhavce atd. Proti pakostnici, hostci počasnému, zimnici studené, žloutenici, bledniče, krticím, hlistům, proti zatvrzení jater a sleziny, vzteklině, zadumčivosti a j.

Také se počítal pro dobytek mezi léky nejhlavnější a nejúčinnější, zvláště při nemocech travidel, v slabém zažívání, zření břicha, v žloutenici atd. Podává se kořen na prášek roztlučný nebo svařenina z něho: Koním a hovězímu dobytku 10—20 grm. najednou, ovcím 5—10 grm. — Ovcím také na píci se sype, nebo dle okolnosti ze soli a mouky s hořcem liz se připraví. —

Někde dávají pro hořkost kořen do kořalky a místo chmelu do piva. — Z květů modrých možno vydobyti barvu modrou.

46.

### Hruštička.


*Pirola Wintergrün.*

a) *Hruštička menší* (hruštička. *Pirola minor*. Wintergrün.) Listy vejčitookrouhlé. Úšty kališní srdčito-vejčité, dole vespolek se kryjící, ke koruně přitiskle. Čnělka rovná, na semeníku kolmá, kratší než tento, nahoře do terče nerozšířená, nýbrž ukončena bliznou 2krát

širší, rozložitě 5laločnou. Koruna kulovitě sevřená, bílá neb narůžovělá. Bylina mnoholetá 10—20 cm. Květe v červnu a červenci. Roste v lesích.

V stinných lesích roste též jí podobná *b) Hruštička prostřední* (Pir. media) a *c) hruštička okrouhlostá* (Pir. rotundifolia).

Zahořklé listy všech tří hruštiček jindá v lékařství se potřebovaly, zvláště k rychlému zahojení čerstvých ran; k tomu cíli se dával odvar nati s bílým vínem pítí, mimo to přikládaly se zevně mastičky z hruštičkové nati a kořene roztlučeneho. Jak k odvaru tak i k mastím přidávaly se ještě jiné podobné rány zacelující rostliny: chlupek, myší ouško, žindava a t. d. — Někdy se přikládala pouze nať čerstvá rozmačkaná. Pálená voda hruštičková dávala se užívati proti porušení vnitřnímu. Prášek z ušusené nati sypal se na mokvající vředy a píštěle.



Obr. 28. Hruštička menší.

nachové. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Květe v červenci a srpnu. Roste v lesích a na porostlých stráních.

V zahradách i ve světnicích pěstuje se pro ozdobu a vůni vůbec známý a oblíbený *b) Hvozdík zahradní* (Hvozdík plný, hvozdíček, hvozdíčka, karafilát, karafiát. *Dianthus caryophyllus*. Nelke).

Plátky květu před časy užívaly se v lékařství. Prášek z roztlučenejších květů s vínem, citronovou šťávou, cukrem a j. užíval se proti třesení srdce, mdlobám, závratí, křečím, mrtvici, kamenu ledvinnému, běsnosti, uštknutí hadem.

Zevně se radilo květy v oleji dřevěném na slunci máčeti a olejem pak natíratí mokvající vředy, píštěle, rány od hadů a psů zběsilých učiněné; roztlučené květy čerstvé do ran sečných a jiných vkládati; odvarem ústa vyplakovati při bolestech zubů, neb spánky

47.

## Hvozdík.

*Dianthus*. Nelke.

*a) Hvozdík lesní* (Karafiát lesní. *Dianthus silvestris*. Wilde Nelke). Oddenek volně trsnatý, rozlehlý, jednotlivé lodyhy a výhonky ženoucí. Lodyha nahoře vrcholičnatě vícekvětá. Listy čárkovito-kopinaté, trávovzelené. Kališní zuby na kraji sotva suchomázdřitěm vlnatě brvitě, přišpičatěné, s tuhou špičkou. Plátky

ním natíráti při bolení hlavy a t. d. Zkrátka byl to velmi oblíbený lék proti mnohým nemocem, přišel však úplně k zapomenutí, tak že karafiát nyní jedině pro krásu a vůni slouží.

48.

## C h m e l.

*Humulus. Hopfen.*

Chmel obecný (Chmel. *Humulus lupulus. Hopfen*). Lodyha otáčivá. Listy srdčité, dlanitě třílaločné neb dílem nedělené, hrubě pilovité, draslavé, vezpod se zlatožlutými žlázkami. Květy v latách. Mnoholetá bylina 1 $\frac{1}{4}$ —6 m. Kvete v červenci a srpnu. Roste ve vlhkém křoví, porůčí; pěstuje se.

Laty, vůbec hlavičky, jež k vaření piva slouží, doporučují se též v lékařství proti slabému zažívání, žloutenici, nečinnosti ledvin, obtížnému močení a krticím. Běře se 5 až 30 grm. hlaviček na 200—400 grm. vody nebo vína k nálevu, 2—3 šálky jako thé denně vypítí. Zevně slouží k napařování, na vlhké a suché obklady k rozeznání studených nádorů, zhmožděnin atd. — Extraktu chmelového v lékárnách připraveného se dává 5—15 grm. v pilulkách, proti nemocem shora při nálevu uvedeném.

Laty sbírají se pro lékárnu v říjnu.

Chmel dává pivu chuti kořenné, hořké a chrání jej před brzkým zkysáním i nedá se v tom ohledu ničím jiným nahraditi. Pazoušky jedí se jako salát neb s jinou zeleninou k masu.



Obr. 29. Hvozdík lesní.

49.

## Chrastavec.

*Scabiosa. Skabiose.*

Chrastavec polní (hlizník. *Scabiosa arvensis. Skabiose, Grindkraut*). Lodyha namnoze šedopýřitá a zvlášt doleji srstnatá, k ose oddenkové konečná. Listy trochu tuhé, lodyžní střední namnoze protisečné, s úšty kopinatými; fidčeji všecky celé, podlouhloklopinaté, hrubě zubaté. Kraj kališní 7—8paprskový, menší, mističkovitý. Koruny světle fialové lilákové, červenavé neb bílé, krajní paprskující, zřídka stejné s ostatními. Bylina mnoholetá 15—60 cm. Květe od června do září. Roste na polích, mezích, paloucích lesních.

Nať nahořklá jindá se potřebovala k čistění krve v chrástách čili vyraženinách, odtud nejspíše jméno chrastavec. Z chrastavce



připravovala se (destilovaná) pálená voda a syrup. Voda po 4—5 lžících se užívala proti kašli, klání neb píchání v boku a prsou, hlíze sběhlé neb sebrané (apostema), proti moru a hlistům neb červům. Místo pálené vody posloužil též odvar nati s vínem nebo

vodou. — Zevně doporučovala se buď nař rozmačkaná, buď šťáva z ní nebo nař s květem na prášek utlučená ve způsobu mastičky, proti chrastům, strupům, lišaji, svrabu a rozličným kožním vyrážkám.



Obr. 30. Chrastavec polní.

50.

### Chřest.

*Asparagus. Spargel.*

Chřest obecný (hromové koření, chřest, štípet, hromek. *Asparagus officinalis. Spargel*). Lodyha větevnatá. Listy šupinkovité, v jich paždí po svazečku štětínovitých, hladkých, lysých větviček. Květy po 1—2, převislé, zeleno-bílé. Bobule kulaté, červené. — Květe v červnu a červenci. Roste na lukách, mezích a vinicích. V zahradách se pěstuje.

Chřest (špargl) jest oblíbeným jídlem a pudí na moč. Dříve se potřebovaly v lékařství kořen, bobule i semena, jimž se připisovalo, že podněcují činnost ledvin a utišují pohyb srdce. Odporúčovaly se proto při vyrážkách kožních, vodnatelnosti, ochrnutí měchýře a při nemocech srdečních.

51.

### C h r p a.

*Centaurea. Flockenblume.*

Chrpa polní (modrák, charpa, chrpa, sinokvět, světlák, nevaza, chrpa rolní. *Centaurea cyanus. Kornblume*). Listy čárkovité neb čárkovito-kopinaté, hoření celokrajné, dolní na zpodu zubaté až peřeno-klané. Koruny krajní modré, vnitřní fialové, žíldka všecky bílé, růžové neb hnědofialové. Bylina jednoletá 30—60 cm. Kvete v červnu a červenci. Roste v obilí, na úbořech, rumišťích. Květy

druhy v lékařství se potřebovaly, nyní v lékárnách se kupují a jedině přidávají pro krásnou barvu ke kadidlu. Někde nálev z květu posud užívají proti žloutenici a nebo jím vymývají bolavé oči. —

52.

### Jablečník.

*Marrubium. Andorn.*

Jablečník obecný (Buřina bílá. *Marrubium vulgare. Andorn*). Lodyha vlnato-běloplstnatá. Listy okrouhle vejčité, nestejně často zastříhovaně vroubkované, bublinito-svráskalé, ve spodku šedoplstnaté. Přesleny husté, mnohokvěté, skoro kulaté. Zubů kališních 10, hořeji



Obr. 31. Chřest obecný.



Obr. 32. Jablečník obecný.

lyších, ostnitě zakončených, hákovitě ohnutých, 5 jich střídavě kratších. Koruny malé, bílé. Zápach jablečkový. Bylina mnoholetá 30—45 cm. Květy v červenci, srpnu a září. Roste na náběhách, krajích silnic, kamenitých suchopárech, kopcích.

Nať má chuť hořkou, kořenou a chválená byla dříve co lék posilňující a rozpouštějící. Užívala se při zácpě jater a sleziny, žloutenici, blednici, zašlemování prsou a obtížném kašli. K nálevu se vezme 10—20 grm. na 200 grm. vody nebo vína. Z natě při-

pravoval se extrakt, který po 5—10 grm. za den se užíval buď rozpuštěn nebo v pilulkách. — Nať se pro lékárnu sbírá v červnu a červenci. —

53.

### Jahodník.

*Fragaria. Erdbeere.*

Jahodník obecný (jahoda, jahodník pospolitý. *Fragaria vesca. Walderdbeere, Erdbeere*). Postranní lístky 3četných listů skoro přisedlé. Stopky květní (alespoň postranní) s chlupy přitisklými neb přímo odstálými. Květy obojaké, tyčinky nanejvýš zvýší strboulku semeníků. Kališní úšty na plodu daleko odstálé neb sehuté. Plátky bílé. Jahody červené. Bylina mnoholetá 15 cm. Kveté v květnu a červnu. Roste v lesích, mýtinách.

Jahody jsou lahodné, zdravé, občerstvující a jedí se pouhé, buď s cukrem, vínem nebo mlékem. Kořen a list sváří se jako thé proti plynutí břicha; listem se kouří proti bolení zubů od nastužení pošlém. — Pro lékárnu sbírají se zralé jahody v červnu a červenci. Připravuje se z nich voda, která se dává dětem při zadrženém a obtížném močení, pak k rozličným vodičkám, k umývání a okrášlení obličeje. Syrub malinový dává se do vody k pití pro ochlazení a uhasení žízně, jakož i k jiným nálevům a odvarům pro lepší chuť. Kořen v odvaru doporučuje se jako léc mírně svíravý, tonický, na moč pudící a zvláště proti žloutenici účinkující. — Poptávka v lékárnách je však malá, lékaři více ji nepředepisují a lid si nasbírání pro domácnost sám co potřebuje — Z jahod dělají někde syrup, víno, ocet a kořalku. —

54.

### Jalovec.

*Juniperus. Wachholder.*

Jalovec obecný (Jalovec, jalovec menší, borovička. *Juniperus communis. Wachholder*). Listy po 3 v přeslenu na zpodu zřetelně článkované, čárkovito-kopinaté, tuhé, hrotité. Šiška ze 3 srostlých šupin, černá, ojíněná, 2hým rokem zrající. Keř. Kveté v dubnu a květnu. Roste v lesích, na suchých pahorkách, ladách a vřesovištích.

Šišky (plody, bobule) a připraveniny z nich účinkují zvláště na kůži, sliznice a na močidla a užívají se hlavně proti vodnatelnosti jakož i při počasném rheumatismu a pakostnici. Podobně avšak slaběji účinkuje odvar z dříví jalovcového. V lékárnách jsou: šišky celé a roztlučené, k nálevu 10—20 grm. na 200 gr. vody; — povidla jalovcová 15—40 grm. denně; — olej jalovcový 2—4 kapky víckrát za den; — lih jalovcový 20—60 kapek několikrát denně k užívání neb zevně k mazání; — masť jalovcová k mazání. — Kořen, ratolesti i šišky potřebují se k vykuřování obydlí. — Plody sbírají se pro lékárnu v září a říjnu. —

Dříví jalovcové je do červenava nahnědlé, vazké, celistvé a vonné; silnější kusy vybírají truhláři a soustružníci na menší práce, kalíšky, dýmky a j. — Bobule slouží v kuchyních jako koření do jídel; též se z nich připravuje kořalka, sirup a silice jalovcová. — V parcích sází se jalovec pro okrasu, jelikož se z něho pěkné jehlancovité stromky vypěstovati dají. — Bobule poskytují mnohým ptákům vydatnou potravu, zvláště času zimního. —

55.

## Janovec.

*Sarothamnus. Besenstrauch.*

Janovec vítečník (janovec metlatý, jetelice. vítečník, janofit. *Sarothamnus vulgaris*, *Spartium scoparium*. Besenstrauch, Besenginster). Větve prutovité, hranaté. Listy tříčetné, nejhořejší jednoduché, přitiskle hedbávité. Květy ponejvíc jednotlivé v úžlabích hořejších menších lístků. Čnělka hlemýždovitě vyvinutá. Lusk podlouhlý, plochý, černohnědý, na švech huňatý, Koruny malé, zlatožluté. Keř  $\frac{1}{2}$ —2 m. Kveté v květnu a červnu. Roste na suchých písčitých borech, vřesovištích, mezích, u cest. — Nálev květů od 1—3 grm. dvakrát neb třikrát za den užíván účinkuje na stolicí a na moč, ve větší dávce však způsobí průjem a vrhnutí. Užíval se dříve proti vodnatelnosti, vyrázkám kožním, lišěji, hnilým vředům, zvláště však proti močení bílkoviny. —

Janovec slouží k děláni košťat neb chvošťat, co palivo, stelivo; též připravují z prutů vlákno na provazy, sítě; květy k barvení na žluto. Pěkné, tuhé dřevo z kmenu hodí se k dílu vykládanému. Popel janovcový dává mnoho drasla. Janovec poskytuje ovčím dobrou píci. Rozhy dávají někde místo chmele do piva. —

56.

## J a s a n.

*Fraxinus. Esche.*

a) *Jasan ztepilý* (jasan, jasen, jesen. *Fraxinus excelsior*. Esche, Gemeine Esche). Listy lichozpeřené, 4—6jařmé; lístky skoro přisedlé, podlouhlo-kopinaté, drobně pilovité. Laty květní postranní z paždí lonských listů, před listím kvetoucí. Květy nahé, bez kalicha i koruny. Plody čárkovito-podlouhlé, k dolejšku klínovité. Strom 9—30 m. Kveté v dubnu a květnu. Roste roztroušeně v lesích, hájích a libosadech.

Dříve než kůra chynová vynalezena byla, potřeboval se prášek z kůry jasanu ztepilého k léčení zimnic s dobrým prospěchem. Svařenina kůry jakož i šťáva z listů vymačkaná měly se dříve za nejjistější lék proti uštknutí hadů. Sůl z popele kory spálené byla velmi vážena co lék zotvírající a na pot ženoucí. Listy mají moc počistující, k čemuž 3—5 grm. ve svařenině se dávají. —

b) *Jasan manový* (zimnář, manový strom. *Fraxinus ornus*. Blühende Esche). Listy lichozpeřené, 3—4jařmé; listky podlouhlo-kopinaté, řapíčkáté. Lata květní složitá, konečná, s listy současná. Květy se 4dílným kalichem, 4 bělavými úzkými plátky. Strom 6—9 m. Kvete v květnu a červnu. U Krumlova sázený, roste pořádku na kopcích, chlumech, skalách.

Upotřebuje se kůry a listů v domácnosti jako u předešlého. — Z obou těchto stromů prýští sama od sebe nebo z ran v kůru učiněných šťáva v lékárnách pod jménem „Mana“ známá. Naše jasanů poskytuje málo many, proto že nemají tak horkého podnebí jako na př. v Sicilii, odkud nejlepší mana do obchodu přichází. Mana se dává co lék mírně počistující, zvláště dětem a drážlivým nemocným při zánětech střev, při katarrech dýchadel a při porušeném polikání. Dětem se dává 10—30 grm., dospělým 40—70 grm. Mana se vařiti nesmí, proto že moci pozbývá; rozpouští se pouze v horké vodě, kávě, thé. Aby bolení břicha nezpůsobila, dlužno přidati trochu syruhu malinového, kůry pomorančové a j. Osobám, které špatně zažívají, nesmí se dávat, jelikož snadno nadýmání, hryzení i křeče způsobí. V lékárnách se prodává dětem pro stolici též syruhu a výtah: „Mannit“ zvaný, který bez bolesti působí. Od syruhu se dává 1—2 lžičky, od Mannitu 2—10 grm. —

Kůrou jasanů ztepilého může se barviti. Kůra se skalici zelenou za čas ve vodě položená, černou poskytuje břechku. Kůra pro sebe uděluje vodě barvu blankytně a zelenavě měnivou; vřelou vodou břechka tato se zakalí a zhnědne. Nejlépe se hodí vlažná voda, kterouž břechka jest modravá, a příze nabude pěkné modrosti, pakli dříve žlutě se nabarvila, ku kterému cíli se vaří plavuň sploštělá (*Lycopodium complanatum*) vodou, ve které příze 14 dní se močí, až bledě sežloutne. Mezi tím časem vaří se ve vodě též kůra jasanová; když pak břechka dva dni stála, vaří se v ní sežloutlá příze, načež nejpěknější barvu modrou obdrží. Též sukno lze takto na modro barviti. Kůra také k vydělávání koží užitečna jest. — Dříví čerstvě rozštípané udílí vlně vizmutem močené pravou a stálou barvu vikuňovou.

Dříví jasanové jest dosti tvrdé, tuhé, stálé, ohebné, velmi pružné, málo šťávy v sobě ponechající a v suchém místě dlouho trávající. Pro tyto vlastnosti zvláště ho potřebují koláři, an snadno se dá ohnouti. Též soustružníci krouží z něho rozličné náčiní. Též obruče z něho se dělají. — Na místech kamenitých, skalnatých, dostává kmen uzly a hrbole, uvnitř rozmanitě žíhané a barvené, z nich pak truhláři zhotovují rozličné ozdobné náradí. — Čerstvě poražený jasan lépe hoří nežli jiné dříví, vydává mnoho tepla a poskytuje dobré uhlí.

Ačkoliv jasan ztepilý znamenité výšky nabývá, nic méně k stavění, k trámům, břevnům a sloupům málo kdy se bere; poněvadž pozbyví veškeré šťávy zčervíví.

Mana se hlavně potřebuje, aby vlněným látkám lesk a tuhost poskytla. —

57.

**Jasmín.**

Jasminum. Jasmin.

Jasmín obecný (Šešmík, čemín. *Jasminum officinale*. — Jasmin. Vielrúben). Keř 2—2½ m. vysoký, původně z Asie jižní, nyní v celé Evropě rozšířený, v našich zahradách každému známý a pro líbeznou vůni bílých květů zvláště oblíbený. Kvete od června až do podzimu.

Již před 300 lety vydobýval se z květů olej, který sloužil za prostředek proti všem nemocem, zvláště z nastuzení povstalým, v kterých případech se na tělo natíral. Avšak při nemocech dělohy, při hrýzení v břiše a bolestech ve střevách, z chladnokrevnosti a zašlemování povstalých, mimo to olej se i pil neb v klystéru podával. (Dle herbáře Matthioli). Štávou z čerstvých nebo i odvarem ze suchých květů omýval se obličej, aby pihy a jiné skvrny z něho zmizely. — Za naši doby vyrábí se z květů jasmínových posud olej, avšak slouží pouze jako voňavka, neb za přísadu k pomádám, voďčkám, rosolkám a j. pro vůni. —

Z větví neb výstřelků dělají se dlouhé trubky k dýmčím.

58.

**Jaterník.**

Hepatica. Leberblümchen.

Jaterník trojlaločný (Jatrník, podléška, podlíška, podleška. *Hepatica triloba*. Leberblümchen, Leberkraut). Oddenek s šupinami, lupeny srdčitými, 3laločnými a s přízemními úžlabními stopkatými květy. Plátky modré, řídce růžové neb bílé. Mnoholetá bylina 7—15 cm. Kvete v březnu a dubnu. Roste v lesích, hájích, křovínách, plotech stinných vlhounkých.

Čerstvá bylina nemá žádný zápach a chuť trochu svraskující. Listy v stínu sušené, vodou vřelou zpařené a co thé medem oslazené píté, žaludek mírně posilují a zvolna svraskují. Pročež doporučovány jsou ve všech nemocech, kde se jedná posilnutí zesláblé útroby, zvláště játra, ledviny a měchýř, a ukrotiti močení a dávení krvavé. Chválen byl též v bělotoku zastaralém ze slabosti pocházejícím.

Odvar též se potřeboval co kloktadlo a na obklady při průtrži. K zpařenině dává se jedna hrst suchých listů na 140 grm. vody. Hrst čerstvé natě může se svařiti též v 270 grm. polévky. — Nat pro lékárnu se sbírá v dubnu. —

V zahradách pěstuje se jaterník plnokvětý.

59.

**Ječmen.**

Hordeum. Gerste.

Ječmen obecný (ječmen, jačmen, ječmen čtyřřadý, čtverořadý, štverák, jarec. *Hordeum vulgare*. Gerste). Květy vsecky přisedlé,

obojaké, dlouze osinaté, v klase 4—6řadém. Bylina jednoletá. — Kvete v červnu. Seje se.

Odvar z roztlučených zrn ječmenových podává se co chladicí a posilňující nápoj při nemocech zánětných a horečkách a sice 70 grm. na 800 gr. vody. — Odvar sladu podává se při zástvě neb záhati ústrojů břišních, krticích, kurdějích, počasných vyrážkách kožních, hektických (úbytných) zimnicích a zevně ke koupeli, ku které se přidává odvaru 3·3—5·6 kg. —

Ječmene je více druhů na př. *ječmen veliký dvouřadý, rýžový, dvouřadý nahý, čtyřřádkový, čtyřřádkový nahý, šestiřádkový* neb *zimní, himalajský, jeruzalemský* a j. U nás se pěstuje nejvíce ječmen velký dvouřádkový. — Ječná mouka se užívá buď pouhá, nebo smíšená k pečivu; ze zrní ječmena dělají se kroupy, krupky, perličky, krupice, slad k vaření piva a tluč pro dobytek. Sláma je zdravou pící pro dobytek a v krajinách, kde málo luk jest, nahraňuje seno. —

60.

## J e d l e.

*Abies. Tanne.*

a) *Modřín* (modřev, sosna, děrec. *Abies larix. Lärche, Lärchenbaum*). Listy hebké, po 15—20 ve svazcích, na zimu opadávající. Šišky vejčité, šupiny tupé. Strom. Kvete v květnu. Roste v lesích, u nás všude obecný.

Z pryskyřice se dobývá i v lékařství potřebuje terpentín a olej, proti ochablým slizotokům plemenidel a močidel, vodnatelnosti, rheumatismu, pakostnici, žloutenici, žlučovým kamenům a tasemnici.

Lid kupuje obě připraveniny velmi často v lékárnách, avšak více k zevnějšímu upotřebení, což také dobře jest neb užívání vnitřní vyžaduje velké pozornosti a prozřetelnosti, protože oba léky velmi prudce a dráždivě na vnitřní útroby účinkují. — Terpentínový flastr jest u lidu velice oblíben; proti všemožným povrchním i vnitřním bolestem je vychválen a přilepí se na kůži tam, kde bolest na těle se pociťuje; někdy bývají celá záda nebo i prsa obložena flastrem, který i po dlouhém čase dosti pracně po kusech bývá od kůže odloupán. —

Někde přikládají roztlučené listy neb jehličí na rány zanícené a na prášek roztlučenou kůrou modřínovou zasypávají opruzenou kůži, vlka, vředy a t. d.

Olej terpentínový slouží zevně k natírání a k obvazu při smrdutých vředech; někde ho přihluchlí kapou neb bavlnkou do ucha dávají, aby sluch opět nabyli. — Též přidává ke klystérům, na př. k zastavení krvotoku, zlatých žil a průjmu neb dlouhotrvající běhavce, při souchotinách. Olejem se natírají oznošené, opuchlé a vodnaté nohy.

Sem náležejí ještě následující stromy, které nepotřebují zvláštního popisu, jelikož každému dostatečně známy jsou a sice:

b) *Smrk* (smrček, smrč, smrčka, smrek, smerek. *Abies picea*. Die Fichte).

c) *Jedle* (*Abies alba*, Die Tanne).

d) *Borovice* (borovice lesní, sosna, bor, chvoj, chvůj. *Pinus silvestris*. Die Kiefer).

*Pryskyřice* všech tří jmenovaných lesních stromů je důležitá. Z jedle dobývá se čistější *terpentin* a bílá pryskyřice slouží též co *kadidlo*. Nejvýdatnější je v tom ohledu borovice, od které pochází obyčejně *terpentin* (šuškar; terebinthina), jež slouží v lékařství k zhotovení flastru neb náplasti. Od ní pochází rozličnou přípravou též *kalafuna*, *smola bednářská a ševcovská*, *kolomaz* a jiné přípraviny, kterých lid používá zevně i co léku v rozličných případech, zvláště proti lišěji, oparu a jiným kožním vyrážkám, jakož i k rychlému zahojení ran.

Pel z borovicových pupenů (brosk, poupě) potřebuje se k zasypání opruzenin místo prášku plavuňového; někdy je ho tak mnoho, že původ dal k pověře o sirném dešti.

Co se týče upotřebení domácího, pryskyřice, listů a kůry tří jmenovaných stromů, podobné jest onomu, při modřínu udanému. V lékařství užívá se vnitř obyčejně *terpentinu modřínového*, kdežto *terpentin* od ostatních stromů více se upotřebuje k připravování náplastí, přílepků, flastrů a mastí.

V novějším čase oblíbeny jsou koupele jehličnaté, ku kterým se jehličí jmenovaných sosen spařuje a přičiňuje, dílem k uzdravení nemocných, zvláště souchotinami a nervovými chorobami stížených, nebo i k sesílení těch, jež těžké nemoce byli přestáli.

Jmenované druhy jedle poskytují, mimo to co již povědino, v ohledu hospodářském a řemeslnickém ještě dalšího užitku. Dříví modřínové jest velmi trvanlivé, potřebuje se k stavění příbytků, korábů, k děláni rozličného nářadí domácího a co paliva, jehož uhlí tak dobré jest jako z dříví borového. Kůra se potřebuje k vydělávání kůže. —

Dříví smrku jest co palivo špatnější borového a hoře silně praská, za to však hodí se na klády, prkna, latě a dužiny pro rozličné řemeslníky. Též kůra (tríslo) slouží k vydělávání kůže. Šišky jsou dobrým palivem. —

Dříví jedle jest bílé, lehké a pružné, potřebuje se hlavně při stavbách domů a s prospěchem i při stavbách vodních, neb vzdoruje dlouhý čas hnilobě, je-li stále pod vodou. Kde se silných kmenů dubových nedostává, dělají se z něho i mlýnské hřídele. Mnoho dříví jedlového spotřebuje se též na prkna a fošny, jelikož pak i snadno štípatí se dá, též na šindele, dužiny, luby a j. Co palivo rovná se skoro k dříví bukovému, jestli je totiž vyzrálé; uhlí z něho jest lepší nežli smrkové a sosnové. —

Dříví borové jest neméně užitečné. Borovice roste do 126—160 roku, načež se hodí ke stavění příbytků a korábů, řezání prken rozdílného užitku, k topení, k pálení uhlí; mladší kmeny dávají



tyčky a žerdi, též dračky a louč. — Co se týče pryskyřice, jest borovice, jak z předu uvedeno, nejvydatnější a pro rozličná řemesla nejpotřebnější. —

Chvoje všech těchto stromů používá se ku stlaní a pokrývání milířů; též k okrašlování sálů a t. d. — Pupeny a semenem živí se mnoho živočichů zvláště ptáků. —

61.

## Jehlice.

*Ononis. Hauhechel.*

Jehlice trnitá (jehlice obecná, babí hněv. *Ononis spinosa*. Hauhechel, Weiberkrieg). Lodyha na stopách listových huňatá, jinak jen žláznato-chlupatá neb přilysá, přímá neb vystoupavá, největvevnatější, s četnými trnitými větvkami. Kalich žláznato-chlupatý, s řídkými chlupy dlouhými, dolní zub jeho namnoze ohlí člunku nedosahující. Křídla o  $\frac{1}{2}$  kratší pavězy. Lusk šikmo vejčitý, zdělí neb delší nemnoho zvětšeného kalicha. Listy 3četné, hoření jednoduché. Květy namnoze jednotlivé úžlabní, v řídké listnaté brozny sestavené. Koruny růžové. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kvete od začátku června do konce září. Roste na paloucích, průhonech a cestách.

Kořen sliznatý a hořký pudí mocně na moč, pročež se užívá při zástavě moče, kataru a kamenu měchýře, pak při zácpě žláz okružních a z ni povstalém úbytu neb mzy u dětí. Dříve se podával prášek z kořene po 2—5 grm. dvakrát až třikrát za den, nyní se užívá odvar z 20—40 grm. na 400 grm. vody, jako thé za 3 hodiny půl šálku. — Dříve se také připravoval sirup tím způsobem, že se stejné částky kořene jehlicového a feniklového s vodou a cukrem svářely. — Kořen pro lékárnu sbírá se v březnu a dubnu. —

Kořen se jindá koňům dával proti kamenu v měchýři. — Dobytek mladou nať rád žere. —

62.

## J e ř á b.

*Sorbus. Eberesche.*

Jeřáb obecný (jeřabina. *Sorbus aucuparia*, Eberesche, Vogelbeerbaum). Pupeny chlupaté. Kališní cípy krátce 3hranné. Čnělky 3 neb 4, krátké. Plody kulaté, červené, zřídka žluté. Plátky bílé. Strom 3—6 m. Květe v květnu a červnu. Roste na horních lesích, stráních.

Bobule neb jeřabiny jsou na podzim zralé, velmi trpké; šťávu z nich užívá lid, jakož i odvaru ze sušených jeřabin proti běhavce, úplavici, slizotoku a kurdějím. Též z nich se připravuje kořalka a ocet. —

Jeřáb ovocem svým poskytuje ptactvu výtečný pokrm; listy slouží k vydělávání kůže a tvrdé dříví k věcem soustružnickým a řezbářským. —

63.

## Jestřábník.

Hieracium. Habichtskraut.

a) *Jestřábník okoličnatý* (Hieracium umbellatum. Doldiges Habichtskraut). Lodyha nahoře se stopkami úborů skoro okolíkovitě sblíženými. Listy podlouhlé, kopinaté neb čárkovité, celokrajné až zubaté, zpodem sníženým neb kratičkým řapíkem přisedlé. Lístky zákrovní zelené, za sucha černavé, skoro lysé, vnější užší, špičatější, koncem nazpět ohnuté. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kveté v červenci a srpnu. Roste na suchých lukách, kopcích, v lesích, křovištích.

Kvetoucí nať se pije v mnohých krajinách jako thé proti souchotinám a jiným nemocem prsním neb plicním. — Jinde byl jestřábník tento, jakož i jiné druhy, na př. jestřábník zední a chlupáček v lékařství upotřebován. Štáva z natě se pila proti tlacení a svírání žaludku, i palčivému močení; k utišení bolesti přikládala se též roztlučená nať na žaludek a břich. Štáva se měla též za nejlepší lék proti nemocem očním.

b) *Chlupáček* (jestřábník chlupáček, chlupáček větší. Hieracium pilosella. Grosses Habichtskraut, Mausor, Mäuseohr). Stvol bezlistý, jen častěji nad prostředkem s 1—2 malými listenci, skoro vždy lůborný. Listy vezpod chloupky hvězdovými šedo- neb běloplstnaté. Listy opak vejčité až kopinaté, na líci travozelené se štětinami silnými, přitisklými. Zákrov vejčité válcovitý, velký. Květy bledo-sírkově žluté. Bylina mnoholetá 2—30 cm. Kveté v květnu až do podzimu. Roste na pastvinách, cestách, mezích, stránch, vřesovištích.

Nať i kořen druhy se potřebovaly proti zimnici. Odvar nati s vodou neb vínem proti žloutenici, zácpě jater a vodnatelnosti. Někde připravují z chlupáčka sirup proti kašli a souchotinám. Štáva se radila na rány, bolavé prsy, v ústech držána neb do ucha dána proti bolestem zubů; s medem smíšená proti okalu neb zakaženému zraku. —



Obr. 33. Jestřábník zední.

Jest známo ještě několik druhů jestřábníka na př. *c) jestřábník zední* (Hier. murorum), *d) myši ouško* (Hier. auricula) a j., kterých lid stejným způsobem upotřebuje, jako dvou předešlých. —

64.

## J i l m.

U l m u s. U l m e.

Jilm polní (Jilem, jilm, jilma. *Ulmus campestris*. Ulme, Rüstern). Větve z mládí roztroušeně pýřité, pak lysé. Listy dospělé tuhé, příkožovité, vejčité, dole nestejně, krátce přišpičatěné, dvakrát vroubkovano-pilovité, na líci dosti hladké, vezpod lysé neb skoro lysé. Tyč. namnoze 3—4. Rourka čnělková kratší než pouzdro semenní v přední třetině plodu položené. Strom. Kveté v březnu a dubnu. Roste v listnatých lesích na rovinách a nižších horách, v houštinách.

Kůra vnitřní užívala se jako lék sliznatý, hořký a svíravý proti počasným nemocem kožním, zejména proti jahlinám, lišejm a zastaralým vředům na nohou i také proti slizotokům. Obyčejně se potřebuje zevně jako voda k mytí, na obklady a k vystřikování. Sváří se 40—70 grm. kůry s 800 grm. vody až na polovičku. — Uvnitř se málo kdy užívá, i musela by se delší dobu brát, když by měla nějaký účinek míti. — Kůra sbírá se pro lékárnu v březnu.

Jilm dává výborné dříví na rozličná díla, k pálení je lepší nežli dubové. Kůra mladá slouží k vydělávání kůže a k barvení vlny na žluto; lýko k vázání a pletení. — Listy čerstvé a suché výborná jsou píce pro dobytek hovězí a ovce. —

65.

## Jitrocél.

Plantago. Wegetritt.

*a) Jitrocél kopinatý* (jitrocél špičatý nebo menší, ranocél, skorocél špičatý. *Plantago lanceolata*. Wegerich, Wegetritt). Stvol hranatý, silně rýhovaný. Přední 2 zuby kališní srostlé v ušet 2klaný. Listy kopinaté, celokrajné neb oddáleně zoubkované, 3—7 žilné. Pouzdra tobolek 1semenná. Semena na vnitřní straně žlabovitá. Kraj koruny nahuďlý, nitky bělavé, prašníky žluté. Bylina mnoholetá 8—46 cm. Kveté v dubnu až do září. Roste na lukách, průhonech, cestách a polích.

Za starých času sbírala se kvetoucí nať i s kořenem a šťáva z nich doporučovala se proti souchotinám, chrlení krve, krvotokům, zlaté žíle, zimnici střídavé, úplavici, kapavce a bělotoku. Zevně proti vředům, píštělím, zhmožděninám, opařeninám, spáleninám, ranám a zánětům očním. U lidu je dosud jitrocél velmi oblíben a upotřebován.

Na těchže místech jako jitrocél kopinatý roste též *b) jitrocél prostřední* a *c) větší* (*Plantago media* a *major*), které vůbec každému známé a jako lék stejného účinku jsou. — Sliznatá semena jsou dobrým ptačím zobem. —

66.

### · Jméli.

*Viscum. Mistel.*

Jméli obecné (jméli bílé, jmél, mejlí, méli, mejlí, omejlí, jemela. *Viscum album. Weisse Mistel*). Větevky žlutavozelené s 1 párem vstříčných listů na konci. Listy vejčité nebo klínovitě podlouhlé, kožovité a vytrvalé. Květy 2domé, po 3—5 v klubkách, žlutavé; bobule bílé. Keř  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v březnu a dubnu. V lesích zvláště jehličnatých roste na stromech cizopásně, také i na jabloních, hruškách, lípach a j.

Dříví kůry zbavené má vlastnosti tytéž jako ochmet evropský. Rakouská lékárna předpisuje dříví ochmetu, jiné spisy zase mluví o jméli obecném. Zdá se, že účinky budou stejné; za starých časů také se užívalo jméli obecného při všech nemocech v stejné míře jako ochmetu na dubech rostoucího. Sbírá se v únoru.

Z bobul a kůry toho keře připravuje se lep k chytání ptáků, též i much ve světnici. Celý keř jmélový roztluče se jednoduše ve stoupě na kaši, která studenou vodou se tak dlouho promývá, až všechny tříšťky, vlákna a slupky se odstraní a čistý lep zbyde. V malém může se kůra s větví seškrábat, v moždíři roztlouci a pak vodou promývat. —

Podobně připraví se lep z ochmetu evropského. — Lep se připravuje v březnu. —



Obr. 34. Jitrocél obecný.

67.

### Kakost.

*Geranium. Storchschnabel.*

*a) Kakost smrdutý.* (Čapí nůsek. *Geranium Robertianum. Storchschnabel. Ruprechtskraut*). Listy 3—5 četné; lístky řapikaté, pe-

řenoklané a zubaté. Semeny sířnato-svraskalé. Kalich za květu přímý. Plátky dlouhonehetné, nedělené, 2krát delší kalicha. Semena hladká. Bylina často krvavě naběhlá, smrdutá. Koruna růžová neb bílá. Bylina jedno- neb dvouletá 30—60 cm. Roste na vlhkých, stinných místech, na skalách a zdicích.



Obr. 35. Kakost luční.

Odvar nati i kořene užíval se druhdy proti běhavkám, úplavicím a krvácení. Roztlučené listy přikládaly se na růži neb oheň svatý, na vředy rozličného druhu.

Na lukách, v křovištích, u potoků roste každému známý *b) Kakost luční*. (Čapí nůsek. *Geranium pratense*) s květem fialově modrým, bledolilákovým neb bílým. Jest to největší druh z našich kakostů a také nejpěknější. Nař trpká potřebovala se dříve na rány a vředy.

Těž krásný je *c) Kakost krvavý* (*Geranium sanguineum*) s velkým krvavě nachovým květem; který na suchopářích, výslunných stráních a lesních lukách roste. Nař jeho silně zapáchá; druhdy se doporučovala proti krvotokům a na rány. — Kakost smrdutý zahání prý štěnice; nař kakostu krvavého slouží k vydělávání kůže. Kakost luční a krvavý sází se v zahradách pro ozdobu.

68.

## Kamejka.

*Lithospermum. Steinsame.*

*Kamejka lékařská.* (Vrabí símě, kamýka. *Lithospermum officinale. Steinsamen, Meerlinsen*). Lodyha nahoře velmi větevnatá, hustě listnatá. Listy kopinaté. Řásky v ústí korunním vyběhají nahoře v malé hrboulky. Postranní žebra listů vezpod vyniklá, na líci vtisklá. Tvrdky hladké, lesklé a bílé. Koruny malé, nazelenalé, běložlutavé. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste na výslunných, keřnatých stráních a v hájích.

Semena jindá v lékařství upotřebovali proti kamenu močnmu, nemocem měchýře vůbec a pakostnici. —


**Kamzičnik.**

Doronicum. Gamswurzel.

*Kamzičnik rakouský* (Doronicum austriacum. Gamswurzel). Od-  
děnek bez výběžků a listů přízemních. Lodyha nahoře spoře pýřitá  
a žláznato chlupatá. Listy vykrojovaně zoubkaté, dolní mělce  
srdčité s řapíkem 2účetným, hořejší objímavé, nejhořejší malé, liste-



Obr. 36. Kamejka lékařská.



Obr. 37. Kamzičnik rakouský.

novité, kopinaté. Lístky zákrovni čárkovito-kopinaté, sotva delší  
terče. Květy zažloutlé. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ —1 m. Kvete v červnu  
a červenci. Roste na lesnatých horních stráních.

Kamzičnik voní a chutná kořením. Odvar kořene pije se proti  
větrům a nadýmání břicha, mdlobám, třesení srdce, hlistům neb  
červům ve střevách, proti zácpě neb tuhé stolici a obtížnému mo-  
čení, i proti uštknutí hadem, při čemž se i prášek z kořene na  
ránu zasejpá.

## Kaprad.

*Aspidium. Farrenkraut.*

*Kaprad samec* (*Aspidium filix mas.* Wurmfarne). Listy temně zelené, úkrojů podlouhlých, tupých, zpredu vroubkovaných neb zubatých, celých až protisečných, všechny prodlouženě kopinaté. Řapíky a vřeteno listní většími šupinami a nitkovitými brvitými plévami hustě posázené. Ostěra dosti tlustá, celokrajná. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kveté v červenci, srpnu a září. Roste ve vlhkých stinných lesích.



Obr. 38. Kaprad samec.

Kořen již za starých časů byl co výborný lék proti tasemnici znám a také až po dnes se ho s nejlépeším prospěchem užívá. V lékárnách se prodává kořen, prášek z něho a extrakt.

Má-li kořen účinkovati, nesmí býti starý, totiž dlouho uschovaný, má se déle vařiti; 30 grm. kořene sváří se pomalu s 270 grm. vody až na 100 grm. užije se za den. — Lépe účinkuje prášek, vezme se na př. z rána na lačný žaludek 15 grm. prášku po kávových lžičkách. — Nejlip účinkuje extrakt na příklad v pilulkách,  $1\frac{1}{2}$  grm. extraktu a  $1\frac{1}{2}$  grm. prášku na 20 pilulek, od kterých se užije ráno a večer vždy 10 najednou. — Jestliže nemocný při užívání cítí ošklivost od žaludku, dá se mu pít černá káva neb dobré bílé víno. Před užíváním dá se ne-

mocnému pro stolicu buď ricinový olej v česnekové polévce; nebo jiné projímadlo; to se též podá po užívání, když za 2 hodiny stolice nepřišla. — Jestliže nemocný lék vyvrhl, musí se opakovati. — Na venkově často užívají čerstvé z kořene oloupané kury, avšak neradí se nikomu, aby o své ujmě tasemnici vypuzoval, neb přicházejí při tom někdy krom násilného vrhnutí i mdloby, křečovitě záchvaty a jiné povážlivé příznaky, proto také každý svědomitý lékař u nemocného tak dlouho se zdrží, dokud byl léku nevzal a patřičně nezažil. — Pro lékárnou sbírá se kořen v září a říjnu. — Nať se potřebuje ke stlání.

**Kaštan.**

Aesculus. Kastanienbaum.

Kaštan koňský (Kaštan divoký neb hořký, maďal. Jirovec. *Aesculus hippocastanum*. Rosskastanie, wilder Kastanienbaum). Listy namnoze 7četné, prstnaté, lístků klínovito-opakvejčitých, vroubkovano-pilovitých. Lata kytkovitá. Plátky rozložené, namnoze 4, bílé se žlutými a červenými tečkami. Tyčinek nejvíce 7, sehnutých. Tobolka ostenatá. Strom 18—25 m. Kvete v květnu a červnu. Pochází z Asie a jest u nás v sadech, kolem cest a jinde sázen. Kůra hořké a svráškové chuti odporučovala se dříve proti zimnici studené neb střídavé s dobrým výsledkem, také v slabosti svalů místné i všeobecné; v novějším čase proti počasným slizotokům a krvotokům trpným, zvláště z dělohy a žil řitných.

Kůra se sbírá na jaře z větví prostřední tloušťky, dříví všechno z ní se oloupe a pak v kusech ve sklenici uzavřené se uschová. Kůry k odvaru se dává 40 grm. na 400 grm. vody, aby až na polovic se zavařila, odvar nějakým sirupem neb cukrem oslazen užívá se po lžicích, na př. za 2 hodiny 2 lžice. Prášku z kůry utlučeného běže se po 70 ctgr. — 1 grm. — Extrakt neb výtah shotoví se svářením kůry ve studničné vodě až na tuhost povidel. Výtahu 2—5 grm. rozředěného se 100—200 grm. vody a oslazeného může se užívati za 2—3 hodiny 2 lžice, na př. při počasném slizotoku a trpném krvotoku. Výtah může se podávati po 30—60 ctgr. za 2—3 hodiny i v pilulkách.

Kůru a prášek z ní možno po dnes v lékárnách dostati. — Pro lékárnou sbírá se kůra v březnu a kaštany v srpnu.

Ohledně dobytka dávají se plody neb kaštany koňům proti hřiběci a dušnosti. Ovcím se dávají čerstvé nebo i suché rozkrájené kaštany k pici, aby před souchotinami, potracení, rýmou, prašivinou a jinými nemocmi uchráněné zůstaly neb z nich se vylécily. — Čerstvé listy kaštanové jsou prý výborný prostředek k uvarování rozličných nemocí, které senem za vlhka sklizeným nebo zkaženým povstávají. —

Dříví kaštanu koňského jest měkké a křehké, bývá zvláště na práce řezbářské a soustružnické hledané; co palivo jest o 20% špatnější nežli bukové a platí asi jako dříví březové, dává však mnohem lepší uhlí.

Plody neb kaštany poskytují vysoké a černé zvěři dobrý pokrm i pro dobytek domácí jsou pici výbornou a velmi zdravou. Hovězí dobytek, kozy, ovce a koně lakotně jich žerou, zvláště jsou-li na pici zatrpou uvyklí. Dobytek pici z tučných luk požívající jim znenáhla uvykne, když se kaštany roztlukou a se řezankou navlhčenou smíchají. Krávy surovým a vařeným kaštanům uvyklé dávají mnoho



chutného, mastného a žlutavého mléka, jakoby čerstvou travu žraly. Krávy, ovce, skopci mohou se rychle vykrmiti kaštaný s ječným šrotem smíchanými; těž koně kaštanům snadno uvyknou a jsou pro ně, jak bylo dříve řečeno, spolu i dobrým lékem.

Z kaštanů (plodů) vyrábí se dobrý škrob a též kořalka. Mouky z nich možno pak jako otrub mandlových užívati k mytí rukou, ku praní plátna, tkanin vlněných a hedvábí. — Z tobolek rozličnými přísadami na př. kamencem, skalici, octanem olověným a t. d. možno rozličnou barvu na sukno a hedvábí zhotoviti, zvláště šedožlutou a žlutohnědou.

Z kaštanů lze vydobýti dobré salajky čili drasla.

Odvar zelených tobolek neb slupek zabíjí prý štěnice a jiný hmyz. Listy se stromu spadlé a na hromadu shrabané dávají dobrý hnůj. Včely z květů mnoho medu sbírají. —

Kaštan koňský u nás dobře se daří, rychle roste, za 30 let znamenitou výšku nabývá a teprve za sto let hyne. Půdu miluje zahradní, lučnou, nikoliv však mokrou, spíše hlinitou s pískem smíšenou. Do lesů se nehodí, poněvač svými kořeny a široko se rozkládajícími větvemi jiné stromy a křoviny udušuje. Lépe hodí se k posázení pastvišť a lad. — Rozmnožování není obtížné a děje se nejlépe semenem, které buď časně z jara, lépe však na podzim do země se zakládá. Má-li se semeno k jarnímu sázení dochovati, musí býti počlivě uschováno; déle než do příštího jara nedá se klíčivost semena udržeti. —

72.

## K e r b l í k.

*Cerfolium. Kerbel.*

Kerblík setý (*Kerblík* obecný, třebule zahradní. *Cerfolium sativum. Kerbel*). Lodyha jemně ryhovaná, větevnatá. Listy 2—3krát zpeřené; lístky peřenoklané s ušty podlouhlo-vejčitými, hrotitými. Lístky obalíčka 2—3, čárkovito-kopinaté. Plody lysé, lesklé, neb štětinato-mrtnaté. Plátky bílé. Bylina jednoletá 30—60 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste v křovištích, plotech, na kamenitých stránkách, toliko zdomácnělá. Pěstuje se na některých místech pro kuchyň jako petržel.

Nař uvařená žene na moč. Štáva kerblíková se doporučovala proti žloutenici, ledvinnému kamenu; smíšená s medem proti kašli, s odvarem krup a s cukrem proti píchání neb klání v bocích, s polévkou z hovězího masa neb ze slepice proti hryzení břicha. — Zevně se kerblík na prášek utlučený a s medem smíšený přikládá na vředy rakovité; na sádle neb másle usmažený pokládá se na břich proti hryzení; ve vodě uvařený a s octem smáčený sloužil k umývání hlavy, k umoření hnidů, vši a roztočů. —

## Kyprej.

*Lythrum. Weiderich.*

Kyprej obecný (Vrbice, vrbina, krvavnice, kyprej. *Lythrum salicaria. Weiderich*). Pýřitý neb krátce srstnatý. Lodyha namnoze jednoduchá, ostře a úzce křídlatě 4hranná. Listy skoro vstřícové neb po 3, přisedlé, ze srdčitého zpodu podlouhlo-kopinaté neb kopinaté. Klas hustokvětý. Stopky květní vícekrát kratší kalicha. Vnitřní 3hrané zuby kališní o polovic kratší vnějších šídlovitých. Plátky nachové. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete od července do září. Roste na přikopech, březích, bařinách, vlhkých lukách. Nať svírající a slizovitá za dřívějších časů se potřebovala v lékařství proti počasným běhavkám, úplavicím, chrlení krve a bělotoku, buď v prášku 2—5 grm. dvakrát neb třikrát denně nebo v odvaru 20—40 grm. na 200—300 grm. vody. Nyní přišla zcela v zapomenutí.



Obr. 39. Kyprej obecný.

74.

## Kyvor.

*Ceterach. Milzkraut.*

Kyvor lékařský (Kyvor obecný, ceterák. *Ceterach* neb *Asplenium officinarum. Milzkraut, Ceterach*). Listy vezpod hustě plévnato-šupinaté, peřenoklané; úkrojky sblížené, vejčité neb vejčito-podlouhlé, tupé, celokrajné. Bylina mnoholetá 8—16 cm. Kvete od června do října. Roste na skalách, skalních skulinách.

Kyvor má chuť slizkou, zatrpklou a doporučoval se proti zacpání sleziny, vodnatelnosti; proto že na moč žene. Dle Mathiola měl se pít odvar listů s octem po 40 dní, vždy ráno proti zatvrdlé a nabubřelé slezině, mimo to měly se roztlučené listy s vínem přikládati na levou stranu těla, kde slezina leží. Listy s vínem vařené užívaly se proti žloutenici, kamenu, zadumčivosti, čtvrtodenní zimnici, kapavce a příjici. —

75.

**K m í n.**

Carum. Kümmel.

Kmín luční. (Kmín. Carum carvi. Kümmel). Listy 2krát peřenosečné; lístky peřenodílné s úšty čárkovitými, špičatými; nejdolejší úkrojky druhého stupně na hlavním řepíku přes kříž postavené, pošvy po kraji široce bělomázdřité. Okolík 3—5 paprsečný. Obal i obalíčky žádné neb z 1—3 štětínovitých lístků. Plátky bílé neb narůžovělé. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v květnu a červnu. Roste na lukách, mezích, v plotech a příkopech.

Semeno kmínové se upotřebuje v kuchyni i v lékárně, kde se z něho i prášek, olej, voda a lih připravuje. V lékařství se užívá co lék žaludek posilňující a větry vypuzující. Prášku se užívá 50 ctgr. — 1 grm. 2—3krát za den; nálevu 2—5 grm. na 2 šálky vody. Olej a lih slouží k natírání, zvláště života při větrnosti, nadýmání a hryzení břicha u dětí, kterým se dává voda kmínová užívatí. —

U nás obyčejně lidé na lukách rostoucí kmín požívají, doma pak usuší a vymlátí; jinde však ve velkém kmín na pole sejí, i v Moravě se pěstování kmínu již dosti rozšířilo a tamní kmínaři také v Čechách obchod provozují. Semeno kmínové dává se do pečiva, zelí, kořalky a t. d., též tlačí se z něho olej. Nať dává dobrou pšci, zvláště ovcím.

76.

**K o k o ř í k.**

Polygonatum. Salomonssiegel.

a) *Kokořík obecný* (kokořík menší, kokorňák. Polygonatum officinale. Kleine Weisswurz, Zauken, Salomonssiegel). Lodyha, stopky květící a listy lysé. Lodyha hranatá, nahoře skoro dvojřízně smačknutá. Listy skoro přisedlé. Stopky 1—2květé. Okv. šířeji trubkovité. Květy bílé, uštův zelených. Bylina mnoholetá 30—46 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste v lesích na kamenitých, porostlých stráních.

b) *Kokořík mnohokvětý* (kokořík větší, líčidlo, kokorňák. Polygonatum multiflorum. Grosse Weisswurz). Lodyha oblá. Listy krátkorápičné. Stopky namnoze 3—5květé. Okv. úzce trubkovité. Nitky tyčinek pýřité. Mnoholetá bylina 30—60 cm. Kvete v květnu a červnu a roste na těchže místech jako předešlá.

Kořen obojího jindá v lékařství se potřeboval; na severu dělají z prášku jeho a vody růžové líčidlo; z mouky hlízové a obilní pekou chléb; pazoužky mladé jedí jako salát. — Bobule působí vrhnutí a průjem. Kořen se jedl k zastavení bělotoku. Zelené listí s vínem vařené, neb usušené a na prášek utlučené užívaly se k počištění. Štávou z kořene neb vodou z něho natíraly se pihy a rozličné skvrny na kůži. Roztlučený čerstvý kořen příkládal se na modré neštovice i na tvrdé a studené nádory.

## Kokoška.

*Capsella. Hirtentaschel.*

Pastuší tobolka (Kokoška pospolitá, kokoška. *Capsella bursa pastoris. Hirtentaschel*). Listy spodní v rozetce, peřenodílné, často kracovité neb nedělené, celokrajné neb zubaté; lodyžní kopinaté, střelovitým zpodem objímavé. Šešulky tříhranné opak srdčité. Plátky malé, bílé, čásem v tyčinky přeměněné. Bylina mnoholetá 2—60 cm. Kvete od března až do září. Roste na rolích a polích, na vzdělávané i pusté půdě. Červené víno s natí vařené neb pouze práškem kokoškovým smíšené radí a pije se proti chrlení krve, průjmu, úplavici červené, krvotoku, zlaté žile, přílišnému toku čmýry. Stejně účinkuje šťáva čerstvé rostliny; též se radí proti kapavce. — Jak uvnitř tak i zevně se upotřebovala pastuší tobolka všude, kde se jednalo krev zastaviti, tak se na př. na rány dávala buď roztlučená čerstvá nat, buď šťáva z ní, odvar nebo i prášek ze suché natě; při krvácení nosu postačilo prý docela, když člověk rostlinu jen v ruce držel. — V domácnosti posud se vaří asi 10 gm. suché natí na 2—3 šálky, jako thé, pro celý den k užívání. —



Obr. 40. Pastuší tobolka.

## Kokotice.

*Cuscuta. Flachsseide.*

a) *Kokotice větší* (Kokotice obecná, kaňanka, kokotí hace, koprivník, lišej, ploskovec, kaní prádlo. *Cuscuta vulgaris* neb *europaea. Gemeine Flachsseide*). Lodyha větevnatá, mírně tlustá. Trubka korunní nejprve válcovitá, delší než kalich, zdělí okraje. Úšty koruny odstálé, koncem zase vzhůru obnuté. Šupinky trubce korunní přitisklé, někdy přemalinké. Tyčinky nečňející. Čnělka kratší než semeník.

Květy bělavé neb červenavé. Bylina jednoletá. Kvete v červenci a srpnu. Roste na nízkých křech a rozličných bylinách, kolem kterých se pne a točí i šťávami jejich se obživuje.



Obr. 41. Kokotice menší.



Obr. 42. Komonice lékařská.

b) *Kokotice menší* (prostonárodně jako předešlá. *Cuscuta epithymum*. Kleine Flachsseide). Lodyha větevnatá, tenounká, nítovitá. Trubka korunní nejprve válcovitá, delší než kalich, zdělí okraje. Ústí koruny posléz nazpět ohnuté. Tyčinky z koruny čnějící. Čnělka delší semeníka. Květy bílé neb narůžovělé. Jednorocní bylina. Kvete v červenci a srpnu. Roste na lesních lukách, vřesovištích, na nižších bylinách, v jetelištích na jeteli. —

Před časy byly rostliny tyto v lékařství na slovo vzaté co lék rozřeďující, rozdělující a svráskující. Zvláště vážená byla kokotice na tymiánu rostoucí. Odporoučely se proti zadumčivosti, hypochondrii a nemocech z nich pocházejících; proti zácpě útrov břišních, zimnici studené a žloutnici od zácpy pochodící. —

79.

## Komonice.

*Melilotus*. Steinklee.

Komonice lékařská (Komonice česká. *Melilotus officinalis*. Steinklee). Lusk tupý, hrotitý, na hřbetě zoblenný, tupě kýlnatý. Člunek

kratší pavézy. Koruny světle zlatožluté; křídla zdělí pavézy, delší než člunek. Lusk příčno svraskalý, málo síťnatý. Bylina dvouletá  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{3}$  m. Kvete od počátku června až do konce září. Roste na rumných místech, polních mezích a cestách.

Nať kvetoucí obsahuje mnoho slizu, je chuti zahořklé a potřebuje se od dávna v lékařství, avšak více zevně, proti nádorům zánětným, napuchlým a zatvrdlým žlázám ve způsobu suchých náčinků, neb kašičkových obkladů a pařených záhřivek. — Melilotový fistr v lékárnách prodáváný poslouží podobným způsobem. — Zřídka kdy se užívá vnitř nálevu, a když, tedy se vezme 5—10 grm. natě na 200 grm. vody. — Pro lékárnou sbírá se květoucí nať v červenci a srpnu. —

80.

### Koniklec.

*Pulsatilla. Kuhschelle.*

Koniklec luční (Koniklec, koniklec visutý, lékařský: zvonek kuchyňský. *Pulsatilla pratensis, pulsatilla nigricans. Wiesenkuhschelle, Wiesenküchenschelle*). Listy přizemní s květem současně vyvinuté. Květ níci neb převislý, sevřeně zvonkovitý, z lístků koncem ven ohnutých. Ústí lístků čárkovité, zřídka čárkovito-podlouhlé, celé neb často 2—3klané. Úkrojky obalu namnoze do polou neb z předu 2—3klané. Květ tmavofialový neb rudý, nejřídčeji slámožlutý. Bylina mnoholetá 15—23 ctm. Kvete v dubnu a květnu. Roste na trávnatých stráních, borech, na místech kamenitých, výslunných, suchopárných.

Upotřeben bývá kořen, nať a květ. Čerstvá nať krájená velmi ostře čpí a rozkousaná v ústech dlouho pálí; kořen je mírnější. Sušením pozbývá rostlina těchto vlastností. zachovajíc toliko chuť z počátku zahořklou, pak trochu slanou. Svou těkavou a ostrou látkou působí dráždivě na útroby břišní, na blány slizné, syrovatečné a vláknuté, zvláště pak na nervy oční.

Shotoveniny. Štáva koniklecová líhová, totiž vytačená štáva s líhem v stejných částkách smíchaná. — Voda koniklecová překapaná neb destilovaná (pálená,



Obr. 43. Koniklec luční.

přetahovaná, tažená); osm částek vody studničné pudí se přes částku rozřezané nati v koupeli pískové. — Výtah neb extrakt koniklecový, vyvařením nati a pak zavařením shotovený.

Za starých času byl koniklec velmi oblíben, doporučoval se zvláště při obrně, nepohyblivosti údů, vyrážkách počasných, vředech rakovitých a příjicných, při zaražené čmýře a zlaté žile, hlavně pak při nemocech očních, jako jsou: zákal šedivý, oblak černý, bělmo, okal oční a j. — V ně se přikládá na vředy, nahnilé kosti, lišeje.

Na to přišel koniklec v zapomenutí až r. 1771 opět v lékařství byl častěji potřebován, nyní však lékařové málo kdy jej předpisují. Nati suché 5—15 grm. se 400 grm. vřelé vody za čtvrt hodiny v nádobě dobře zavřené se zpařuje a pak procedí. Od této zpařeniny podává se třikrát denně po 70—100 grm., nebo ve vředech a chorobách kožních k mytí se poroučí. — Vody destilované dává se denně dvakrát po 10—20 grm.; šťávy líhové však zřídka kdy více nežli jednu kapku. Při kašli dusivém mohou děti užiti extraktu 2—4 ctgr. 2krát neb 3krát za den; vzrostlí lidé mohou při suchém, dráždivém a s vrhnutím spojeném kašli užiti 7—14 ctgr. Extrakt může se užívati buď rozpuštěný, buď v prášku neb pilulkách. Radno jest započiti s malou dávkou a znenáhla k větší postupovati. Dobré znamení účinku při užívání prý jest, když oči počnou boleti a slzeti, když při tom i pot a hojnější močení nastane. Potom však se nesmí lék tento nemocnému dále podávati, jako i tenkrát, když by na zpitomělost neb obtíže v žaludku nařikal. Vůbec je při užívání koniklece, jelikož jedovatý jest, největší pozornosti třeba. — Pro lékárnu sbírá se v dubnu. —

Varovati dlužno, aby se nesbíral místo tohoto *koniklec obecný* neb *pravý* (Zvonek kuchyňský. *Pulsatilla vulgaris*, *Anemone pulsatilla*. Gemeine Küchenschelle), který též na takových místech roste, avšak snadno k rozeznání jest zvláště dle toho, že listy přizemní v čas květu málo vyvinuty jsou, květ otevřeně zvonkovitý, z lístků rovných, skoro přímý, veliký a bleděfialový jest. Kvete v březnu a dubnu. Jest mnohem prudší nežli předešlý a mohl by zlé příznaky způsobiti. —

Zvěrolékaři jím hojí staré vředy u koní.

Listím a kvítím koniklece lučního může se na zeleno barviti, a ze šťávy květu lze inkoust zelený připraviti. Květy samotné dávají barvu bledě zelenou. Vlna vismutem močená nabude barvu zahnědle žlutavou. Vaří-li se květ s maličkem srpku a kamence, docílí se barva krásně zelená k malování vodnímu. Velikonoční vejce touto rostlinou na zeleno barviti, nemůže se schvalovati, protože šťáva jest jedovatá.

Ovce a kozy prý rostlinu tuto beze škody požívají; hovězímu dobytku zdá se škoditi. Ovčáci dávají dobytku kořen proti uštknutí jedovatých zvířat. —

## Konítrud.

*Gratiola. Gnadenkraut.*

Konítrud lékařský (*Gratiola officinalis. Gnadenkraut, Gottesgnadenkraut*). Oddenek větvitý, plazivý, šupinatý. Lodyhy vstoupavé, nahoře 4hranné. Listy vstříčné, nasivělé, eliptické, neb kopinaté, poloobjímavé, oddáleně drobně pilovité. Stopky květní jednotlivě úžlabní, kratší listů. Koruna běložlutavá, načervenalá. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kveté v červnu, červenci a srpnu. Roste na vlhkých lukách, na šterku pořičném. — Kořen a nať hořce chutnající účinkují mocně na nervy a cévy života, popuzují a rozmnožují odměšování zvláště sliznice střev, močidel a vnější kůže. Ve větší dávce způsobují průjem a vrhnutí, v menším rozpouštějí a rozhánějí.

S prospěchem užívá se proti zácpě útroh břišných a z ní povstalé vodnatelnosti, pomatení mysli, zastaralým zimnicím střídavým, tvrdošijným, trpným slizotokům z dychadel, močidel a plemenidel; zakořeněným nemocem kožním a sice buď v prášku 14—60 ctgr. dvakrát neb třikrát za den: buď v odvaru neb nálevu 10—15 grm. na 200 grm. vody, nebo extraktu 30—70 ctgr. za den. — V lékárnách se chová kořen, nať i extrakt.

Zevně se upotřebuje odvaru natě na obklady proti zastaralým vředům neb bolákům, zvláště na nohou, dnavým hrbolům a hnilině v kostech. Ke klistéru se svaří 2 grm. natě na 270 grm. vody, při tvrdošijné zácpě a při choromyslných. Pro lékárnu sbírá se nať v červnu i srpnu, kořen pak v říjnu.



Obr. 44.  
Konítrud lékařský.

## Konopě.

*Cannabis. Hanf.*

Konopě setá (*Cannabis sativa. Hanf*). Lodyha přímá. Listy prstnaté, 5—7 čtné; lístky kopinaté, pilovité. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kveté v červenci a srpnu. Místy pěstovaná.

Nať zapáchá a omamuje; ze semene — *semence* — dobývá se olej. Někde pijí teplé mléko se semencem vařené proti suchému kašli; někde semenec vařejí s bílým vínem. pak z něho připravují mléko, které užívají obráté poti šhubání neb trhání v životě. Štávu tepiou z natě kapou do zevnějšího zvukovodu, proti bolestem



a červům v uších: odvar kořene přikládají na stuhnuté, zdřevnatělé neboli zkřehnuté údy, jakož i dna v nohách; čerstvý kořen roztlučeny na opáleniny a opařeniny. Olejem natírají nádory rakovité a teplý olej vkládají s bavlnou do zvukovodu zevnějšího proti mokvání a toku z uší.

Hlavní užitek poskytuje konopě svými vlákny; z kterých se shotovuje příze, plátno, provazy a t. d. — Semenec slouží mnohým ptákům za potravu; olej z něho vydobytý jest za čerstva zelenavě žltý, záhy však zbarví se hnědožlutě, v severních krajinách slouží k osvětlování, do pokrmů, k přípravě mazavého mýdla i k malování.


Konopě daří se jen v dobré a úrodné půdě; bylina samčí, tak zvaná *konopě poskonná* nenese semenec, nýbrž jen bylina samičí, pod jménem *konopě hlavatá* známa.

83.

### Konopice.

*Galeopsis. Hanfnessel.*

Konopice huňatá (Konopice hlínožlutá. *Galeopsis villosa* neb *ochroleuca*. Hanfnessel, gelblich-weisser Hohlzahn). Lodyha pod



uzlinami nestloutlá, nazpět přitiskle pýřitá, často i žláznato-chlupatá, bez štětín. Listy po obou stranách hustě hedvábité, pilovité, dolní vejčité, hořejší a větvení vejčito-kopinuté. Zuby kališní s krátkou ostnitou špičkou. Koruna běložlutá se sírkově žlutým dvůrkem na dolním pysku, 2krát větší než u obou následujících. Bylina jednoletá 15—30 cm. Kvete v červenci a srpnu. Roste na rolích a polích více písčítých. Nať kvetoucí byla dříve známá pod jménem thé liberského, které proti souchotinám velmi se vychovalo. Až posud se pije thé z 20—30 grm. na den po šálcích při rozličných nemocech plicních a kašli.

54.

### Kontryhel.

*Alchemilla. Frauenmantel.*

Kontryhel obecný (husí nožka, husínůžka, kondolík, hvězdoš. *Alchemilla vulgaris*. Frauenmantel, gemeiner Sinau, Thauröse.) Lodyhy postranní, odstále huňaté neb lysé. Listy přízemní dlouze řapikáté, okrouhloledvinkovité, dlanitě 5—9 laločné, lalokův pilo-

vitých. Vrcholiky latnaté, konečné. Trubka kališní plodní trubkovito-zvonkovitá s úšty odstálými. Kalíšek z lístků patrných, tyčinky 4., květy zelenavé. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kvete v květnu, červnu a červenci. Roste na lukách, práhnech, vlhkých návších, pahorkách.

Za dřívějších časů sbíraly se v červnu a červenci listy, hořké a svraskující chutě a užívaly se jako thé proti krvo- a slizotokům, běhavce, úplavici a proti otrávení námelem; zevně se odvar přikládá na rány a vředy. Nať je dobrou pící pro dobytek.

85.

## Konvalinka.

*Convallaria Maiglöckchen.*

Konvalinka vonná (Konvalinka obecná, biser, perloukvet, perliček. *Convallaria majalis*. Maiglöckchen, Maililie, Springauf). Listy 2—3 přízemní, eliptické, dlouze řapíkaté. Stvol pobočný s hroznem převislým, bílých, vonných květů. Bobule červené. Bylina mnoholetá 15 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste v lesích a hájích. —

Za starých časů kořen, květy a bobule se v lékařství potřebovaly jako lék nervy posilňující a mírně počišťující. — Květy sušením docela vůně pozbývají a roztloučené dávají se do prášků kýchavých. Květy pro lékárnou sbírají se v květnu.


86.

## Kopytník.

*Asarum. Haselwurz.*

Kopytník obecný (Lesní špika, omylník. *Asarum europaeum*. Europäische Haselwurz).

Oddenek plazivý, větevnatý, listy a květy jednotlivě konečné ženoucí. Listy okrouhle ledvinkovité, tmavozelené, posléz kožovité. Okvětí vnitř špinavě krvavé. Mnoholetá bylina. Kvete



Obr. 46. Konvalinka vonná.

v dubnu a květnu. Roste v lesích a hájích, zvláště na půdě vápenaté. Kořen zápachu jest mocného kořeného, tékavého, chuti silné, prudké, hořké a hnusné. Sušený a dobře chovaný oboje dlouho zachovává. Účinkuje dráždivě na nervy a cévy, způsobuje vrhnutí



Obr. 47. Kopytník obecný.

a průjem, žene na moč. Nežli byl znám dávivý kořen (Ipecacuanha) užíval se prášek kořene kopytníka pro vrhnutí, na př. při záškrtu a podobných nemocech. Vafením pozbývá kořen této vlastnosti a účinkuje více na stolicí a na vypuzení moče. Proto se odvaru dává při vodnatelnosti. Mimo to dává se prášek při zácpě nosu a násilném bolení hlavy šňupati. Za starší doby chválen byl též při žloutenici, zimnici zvláště čtvrtodenní, při zaražené čmýře, při nemocích jater a sleziny vůbec. — Též listům se připisoval stejný účinek. Prášek kýchací, od kterého se bral denně 2—3krát šňupec, shotovo-

val se dle anglické lékárny ze stejných dílů prášku z listů kopytníkových, marjankových, ožankových a levandulových. Zvěrolékařové dávají koním 40—70 grm. proti červu. — Pro vrhnutí se dává 2 grm. prášku a tolik též cukru, na tři díly, každé  $\frac{1}{4}$  hodiny 1 díl, až vrhnutí nastane. — K odvaru se bere 5—7 grm. na 200 grm. vody a užívá se od něho za 3 hodiny 2 lžice.

87.

## K o p r.

An ethum. Dill.

Kopr zabradnický (Koprek. *Anethum graveolens*. Dill). Lodyha jemně rýhovaná, jak listy lysá a sivě ojiněná. Listy 2 — vícekrát peřenosečné, úkrojků čárkovito-šídlovitých; hoření pošvy krátké, trochu ouškaté, s čepelí řádně vyvinutou. Obal a obalíčky žádné. Plátky žluté. Zápach zvláštní, zakyslý. Bylina jednoletá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kvete v červenci a srpnu. Pěstuje se a zdivočuje.

Semena a květy svářejí se vodou neb vínem, které se pije proti větrům a hrýzení břicha, běhavce a nucení na stolicí, krkání neb říhání od žaludku. Také prý žene na moč a prospívá, když při kojení ubývá mléka. Nať s dřevěným olejem zvařená přikládá se teplá na opuchliny a naběhliny neb nádory.

V starých herbářích se odporučuje kopr zevně na štětky neb flky a vředy příjčné, což však nepomůže, a každý příjci v jakém koli způsobu stížený učiní nejlépe, když se ihned, jakmile něco spozoruje, lékaři svěří. —

V kuchyních se potřebuje kopr zvláště k omáčkám a k nakládání okurek. Semeno se seje z jara do záhonu neb mezi zeleninou a nepotřebuje zvláštního opatrování.

88.

### Kopretina.

*Chrysanthemum. Wucherblum'e.*

Kopretina, řimbaba (řimbaba obecná, řimbaba, matečník, marunka. *Chrysanthemum parthenium. Matricaria parthenium. Mutterkraut*). Koruny krajní jazykovité bílé, zřídka výminečně žadné, v terči s trubkou 2-řízně smáčknutou. Květenství dlouhovětavné. Vřeteno listů nezubaté. Listy měkké, řapíkaté, v obrysu vejčité; úkrojky podlouhlé neb vejčité, tupé, protisečné s úšty vroubkovano-zubatými. Nožky s 10—12 bílými žebry. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kveté v červnu a červenci. Roste na rumišťích, zdřích, křovích blíž obydlí.

Květoucí nať zapáchá aromaticky, avšak silně a nelibě, chutná hořce a v lékařství domácím se upotřebuje podobně jako heřmánek proti rozličným křečím, větrům a nadýmání břicha i k usnadnění čmýry. Obyčejně se spaří jako thé 10—20 grm. na 200—300 grm. vody, od čehož se pije šálek, neb za 3 hodiny vždy půl šálku.

89.

### Kopřiva.

*Urtica. Nessel.*

Kopřiva veliká (Kopřiva dvoudomá, obecná, pálivá, většší, záhavka, prhlavka, prhlínka. *Urtica dioica. Brenn-Nessel*). Oddenek plazivý. Lodyha jednoduchá, přímá. Listy srdčito-podlouhlé, dlouze přišpičatěné, hrubě pilovité. Květy 2-domé, v latách úžlabních posléz převislých, delších než řapík. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ —1 m. Kveté v červnu až do září. Roste v plotech, křovišťích, lesích a na pustých místech.

Za dřívějších časů sbírala se čerstvá kopřiva a šťáva z ní vymačkaná užívala se proti močení krve, toku zlaté žíly a zvláště proti chrlení krve. Užívalo se za den 70—140 grm. šťávy. Zevně radila se proti vyžraným zubům. — Též semena olejnatá na prášek

roztlučená podávala se proti běhavce a úplavici červené po 2—10 grm. dvakrát až čtyřikrát denně, neb v nálevu po 20 grm. na 400 grm. vody. — Čerstvou natí mrskaly se ochromené údy, totéž se činilo při bolestech rheumatických, kyčelních a j. —

Mladé pazoušky tu a onde se jedí jako špinát anebo zelí, a jsou prý velmi chutné; u nás je dávají housatům rozsekané. Z lodyh dobývá se jako z konopě vlákno, z něhož dělají přízi a plátno kopřivové (kopřivku).

90.

## Koprník.

*Meum. Bärwurz.*

Koprník úzkolistý (*Meum mutellina*. Bärwurz, Bärduille). Lodyha dole oblá, jemně rýhovaná, nahoře hranato-rýhovaná. Listy přízemní 2—3krát peřenosečné; úkrojky peřenoklané s ústy úzce čárkovito-



kopinatými; listky 1-řádu řapikaté, až teprva výše nad dolejškem rozdělené. Listky obalíčků často trochu jednostranné, kopinaté, bělomázdřitě obroubené. Paprsky okolíka plodonosného dosti stejné. Plátky bílé, narůžovělé. Bylina mnoholetá 15—78 cm. Kvete v červnu a červenci. Roste na horních lukách zvláště kladského sněžníka, orličných hor a Šumavy.

Koprník jest dobrá píce dobytku a uděluje mléku i máslu příjemnou kořenou chuť i vůni. Kořen koprníkový jest na horách posud domácím prostředkem, jako býval za starých dob. Na prášek utlučený, nebo vínem neb vodou uvařený a vnitř užitý účinkuje na ledviny a měchýř, žene na moč, rozhání prý všechny obtíže žaludku, nadýmání, utiňuje hryzení v břiše, bolesti v údech

Obr. 48. Koprník úzkolistý.

a hojí všechny nemoce dělohy. Při zašlemování prsou radilo se na prášek roztlučený kořen smíchat s medem, po malých částkách v ústech držeti a znenáhla polykati. Zvláštní moc se kořenu připisovala též proti jedům a otrávení, i byl k tomu cíli míchán s dryákem a jinými podobnými léky. — Zevně se doporučoval odvar

kořene k záhřivkám a koupelím při zastavené čmýře; vínem a dřevěným olejem spařený prášek kořene se přikládá na přirození a podbříšek při obtížném močení. — Zkrátka byl to skoro všeobecný lék domácí, který posud je oblíben v krajinách, kde koprník úzkolistý roste. —

91.

## Koryander.

*Coriandrum. Koriander.*

Koryander setý (Koryander obecný, koliandr, kyšnec. *Coriandrum sativum. Koriander*). Lodyha oblá, jemně rýhovaná. Listy dolní jednou zpeřené neb peřenoklané, s lístky neb úkrojky okrouhle klínovitými, peřenoklanými, s úšty vejčítými; hoření 2—3krát zpeřené s úšty čárkovitými. Okolík 3—5 paprsečný. Obal žádný neb 1listečný; obalíčky jednostranné, ze 3 šídlovito - štětinovitých lístků. Plátky bílé neb načervenalé, krajní paprskující. Zápach odporný. Bylina jednoletá 30—60 cm. Kvete v červnu a červenci. Pěstuje se a zdivočuje.

Nať čerstvou a štěnicemi zapáchající oblibují sobě Tataři dělajíce z ní polévky, též tak zapáchá čerstvé semeno, zralé však jest chuti a vůně příjemné, kořene potřebuje se místy jako koření v kuchyních a bylo jednou i v lékařství užíváno.

Víno se zralým roztlučeným semenem

vařeno, pije se proti zástavě čmýry a moče, obtížném dýchání a obtížím v životě, proti uštknutí hadem a pokousání zběsilým psem.

— Olej ze semene doporučoval se vnitř i zevně proti zatvrdlé a naběhlé slezině; prášek z upraženého semene proti žloutenici. — Prášek ze semene s lilijovým olejem, utiňuje prý na čelo natírán bolení hlavy; s octem smíšen rozhájí nádory, naběhliny a lišeje;



Obr. 49. Koryander setý.

s octem a vodou vařený a v ústech držaný utiňuje bolení zubů; ve víně močený zahání kůří oka; s octem vařený a na pupek natřený vypuzuje ze střev červy neb hlisty; prášek ze semene do hedvábného šátku svázaný k čichání, hojí rýmu a t. d. Jsou to vůbec prostředky, které ze starých časů sem tam v domácnosti posud se udržely. —

92.

## Kosatec.

*Iris*. *Schwertlilie*.

a) *Kosatec žlutý* (Kosatec vodní, kosáč. *Iris pseudacorus*. Gelbe Schwertlilie). Lodyha přibíhá, listnatá, 1—5 květá. Listy čárkovitokopinaté, mečovité. Listeny bylinné, nejdolejší lupenovité. Květy



Obr. 50. a) Kosatec žlutý.

Obr. 51. b) Kosatec florentinský.

žluté. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Květe v červnu a červenci. Roste v stojatých vodách, u rybníků a řek, na mokřích lukách. Kořen nevonný, prudký, silně svráskující jindá se podával proti vodnatelnosti, úplavici, oslnulosti. —

V našich zahradách pěstují se rozličné druhy kosatce pro krásné květy, kterými se honosí. Mezi nimi jest i b) *kosatec floren-*

*tinsky* (Iris florentina) s květem bílým, modravě nabělým; jest domovem v jižní Evropě, zvláště ve Vlaších, divoký i sázený. Od něho pochází tak zvaný pravý *fialkový kořen*, který jindy v lékařství hojně se potřeboval, nyní však na některých místech jedině dětem se dává pro upokojení místo cumlíku, když jim první zoubky vylézají.

93.

## Kostival.

Symphytum. Beimwell.

Kostival lékařský (Svalník větší, Kostival. *Symphytum officinale*. Beinwurz, Beimwell, Schwarzwurzel). Oddenek krátký s kořenem vřetenovitým. Lodyha nahoře větevnatá. Listy dokonale (zřídka nedokanale) sbíhající, prostřední a hořejší podlouhlo-kopinaté až úzce kopinaté, zpodem súženým přisedlé. Hrboulky zdělí tyčinek. Tvrdky lesklé, jemuě svráskalé. Koruny špinavě fialové, růžové neb žlutavě bílé. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$  — 1 m. Kveté od května do konce září. Roste na lukách vlhkých, příkopch, podle vod.

Kořen velmi slizký a natrpkalý potřeboval se druhdy v lékařství bud v prášku neb odvaru 20—40 grm. na 400 grm. vody proti trpnému chrlení krve, průjmu, úplavici a nemocem ledvin, pak zevně proti ocháblým, nečistým vředům. — Pro lékárnu se sbírá kořen v březnu a dubnu. —



Obr. 52. Kostival lékařský.

94.

## Kotvice.

Trapa. Wassernuss.

Kotvice vzplývavá (Kotvice, vodní ořech. *Trapa natans*, Wassernuss). Listy v rozetce na konci dlouhočlenného, potopeného oddenku, vzplývající, kosníkovité, zpředu nestejně chobotnato-zubaté, vezpod



na žilách huňaté; řapíky nad prostředkem břichatě nadmuté, posléz duté. Květy úžlabní, krátkostopečné. Plátky bílé. Plody namnoze čtyrrohé. Bylina mnoholetá. Kveté v červnu a červenci. Roste v mělkých vodách, tůních a rybnících.

Jádra veliká, obzvláště suchá, obsahují mnoho škrobu a oleje, chuti jsou zasládlé, kaštanům podobné a jedí se buď syrová, vařená nebo pečená. S bílým vínem vařená doporučovala se proti kamenu a uštknutí od hada. Listy kotvice přikládají na otoky a napuchliny k umírnění bolesti, s medovou vodou vařená doporučují se ke kloktání proti rozličným vředům dásní, v ústech a krku.

Jádra zamletá slouží k pečení chleba. V některých krajinách, kde kotvice hojně roste, krmí se plody vepřový dobytek.

95.

### Kozí brada.

*Tragopogon. Bocksbart.*

a) *Kozí brada luční.* (Kozí bradka. *Tragopogon pratensis. Bocksbart.*) Listy z břichatého, poloobjímavého zpodu dlouze zakončité, čárkovité, často vlnité. Koruny světleji žluté, zdělí zákrovu neb o něco až i o polovic kratší. Rourka prašníků dole zažloutlá, nahoře celá tmavohnědá. Nažky zrnité neb skoro hladké. Bylina dvouletá 30—60 cm. Kveté v červnu a červenci. Roste na lukách, trávnicích.

Jí podobné jsou b) *kozí brada východní* (*Tragopogon orientalis*) na těchže místech rostoucí, c) *kozí brada větší* (*Tragopogon major*) na suchých travnatých kopcích, stráních a cestách, pak d) *kozí brada fialová* (*Tragopogon porrifolius*), která se na některých místech pro kořen jedlý v zahradách sází. —

Kořen a mladistvé rostliny všech druhů tu a onde jsou pokrmem oblíbeným; poslední připravují se jako chřest (špargl). Kořen je sladký a jí se syrový jako salát. Kořen buď syrový, buď vařený nebo jen odvar z něho radí se proti kapavému močení, kamenu močnickému, kašli, dušnosti a souchotinám. Štáva z kořene proti píchání neb klání v bocích. Kořen s hovězí polévkou dává se kojným, aby měly hojnost mléka. Kozí brada vnitř užívána zahání žáhu a prospívá též při nemocech jater. — Odvar květoucí natě nebo i štáva z ní přikládá se na rány, aby rychle se zahojily. —




Obr. 53. Kozí brada luční.

**Kozlík.***Valeriana Baldrian.*

Kozlík lékařský (Kozlík menší neb obecný, odolén, baldrian, paldrán. *Valeriana officinalis*. Baldrian). Oddenek přímo-větevnatý, obyčejně bez výběžků. Listy 6—11jařmé; lístky kopinaté až eliptické, hrubě neb stříhaně zubaté. Koruny bílé, načervenalé, vonné. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste na vlhkých lukách, křovištích, u potoků a příkopů. Kořen silně a nepříjemně jako kočičinou zápachající, chuti hořké a kořenné účinkuje zvláště na soustavu nervovou a užívá se ho jako léku posilujícího a utišujícího proti bezsilným nervosním nemocem a proti všem křečím od vysílení neb zeslábnutí soustavy nervové pocházejícím; mimo to i proti hlístům a rozličným od nich povstalým příznakům.

K odvaru se bere 10—20 grm. kořene na 200—300 grm. procezeniny; prášku z kořene 30 ctgr. — 1 grm. dva—třikrát denně; též tolik extraktu z rozpuštěného neb v pilulkách; tinktury 10—30 kapek, vícekrát denně, oleje etherického 1—3 kapek na cukr. — Přípraveniny tyto jsou v lékárně na prodej. — Kořen sbírá se pro lékárnou v březnu, pak v září a říjnu. —



Obr. 54. Kozlík lékařský.

**K ř e n.***Armoracia Meerrettig.*

Křen polní (Křen obecný, křen. *Armoracia rusticana*. *Cochlearia armoracia*. Kreen). Lodyha nahoře latnatá. Listy přízemní dlouze řapíkaté, srdčito- neb vejčito-podlouhlé, vroubkovano-pilovité, dolní lodyžní hřebenitě přenositelné neb protisečné. Bylina mnoholetá

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kvete v květnu, červnu a červenci. Pěstovaný a nezřídka na břehách zdivočelý.

Kořen za čerstva je vůbec známý, jelikož se rozličným způsobem k masu požívá, pod jménem „křen mandlový“. Křen těkavým, ostrým, etherickým svým olejem mocně vnitř účinkuje zvláště na zažívadla; na kůži činí zánět a puchýře. — Aby se zimnice nevrátila, radí se 3—4 polévkové lžice nastrouhaného křenu do láhve dobrého červeného vína dáti a od něho 3—4krát denně malý kalíšek po několik neděl píti. Nález pivem, vínem nebo i vodou připravený doporučuje se při vodnatelnosti. — Křenu 40 grm. na 400 grm. vařící vody, s přísadou nějakého syrubu neb cukru chválí se píti při nemoci ledvin tak zvané Brightické a z ní pošle vodnatelnosti. Odvar takový chválí se též při dnách, kurdějích a v případech, kde čmýra následkem rozčilení se zarazila. Křenové těsto neb placky dávají se na tělo při rozličných bolestech a nemocech, což všeobecně známo jest.



Obr. 55. Krtičník hlíznatý.

98.

### Krtičník.

*Scrophularia Braunwurz.*

a) *Krtičník hlíznatý* (Krtičné, neštovičné čili hlizní koření, trudovník, pěchovec, sviňský kořen. *Scrophularia nodosa*. Braunwurz, Sauwurz). Oddenek hlizovitě napuchlý. Lodyha čtyřhranná, velmi úzounce křídlatá. Listy skoro dvakrát pilovité, s řapíkem slabě křídlatým. Ústý kalicha s úzkou blánovitou obrubou. Koruny kalně zelené, červenohnědě nabělé, zřídka žlutavozelené. Bylina mnoholetá, lysá, toliko květenství obyčejně žláznatopýřité  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kvete v červnu a červenci. Roste v hájích, křovištích na okraji řek a potoků.

Jemu podobá se b) *krtičník čtyřkřídlý* (Krtičník vodní, sviňský kořen samice. *Scrophularia alata* neb *aquatica*.

Braunwurz Weibchen) s lodyhou široce čtyřkřídrou, který na krajích potoků, příkopů a řek roste.

Nať obou zapáchá, ostře a hořce chutná; druhdy byla v pověsti, že léčí zvláště krtice a vole. K tomu cíli nosil se kořen přivázaný kolem krku, nebo se krk natíral roztloučeným kořenem, který s máslem smíšen 15 dní ve sklepě ležel a pak při mírném ohni svařen a proceděn byl. Štáva z listů sviňského kořene, a sice ze

samice, s medem smíšená a vařená, doporučovala se proti zlým, páchnoucím vředům. — Pálenou vodou krličníkovou léčily se štětky neb fiky. Proti chrastům, úročkům, strupům, ohnipeře a rozličným kožním vyrážkám sloužila k natírání masť dle následujícího předpisu zhotovená: V květnu vezmi nať krličníkovou i s kořenem, dobře je očisti, omej, pak utluč; šťávu z nich v dobře uzavřené úzké sklenici neb láhvi uschovej; potom teprve vezmi stejné díly šťávy, vosku a dřevěného oleje a udělej z toho nad mírným ohněm mastičku, — která zahojí i velké vyrážky, které skoro malomocenství se podobají.

Každý rozumný člověk se tomu zasměje, avšak posud jest jich dosti, kteří právě takovým věcem věří.

99.

### Kručinka.

Genista. Ginster.

Kručinka barvířská (Žlutidlo. kručinka, stínavec, květina, janovec, kozí barva, kozí brada. Genista tinctoria. Ginster, Färberginster, Glösen). Bylina beztrná; vystoupavá neb přímá, zřídka položená. Listy eliptické až kopinaté, s palisty kopinato-šidlovitými, jak lodyhy roztroušeně chlupaté neb skoro lysé. Hrozny lupenaté. Květy v úžlabí menších lupenů, všecky neb hořejší v hrozen sebrané. Kalich toliko do  $\frac{1}{2}$  neb něco přes to 3klaný. Úšty hořeného pysku kališního 3l-rano-šidlovité; pysk dolní skoro až ke zpodu 3dílný. Lusk jako koruna lysý. Koruny zlato-žluté, zřídka bledožluté. Keř 30—60 cm. Kveté v červenci a srpnu. Roste v lesích, na lesních lukách a v křovištích na pastvinách.

Kvetoucí nať jako thé spařená počišťuje a moč vypuzuje, pročež bývala proti vodnatelnosti užívána. Také byla za starých dob za mocný lék proti vzteklině držána, v čemž se však neosvědčila a nyní z lékařství úplně vymizela.

Mladší větvičky květoucí i s květy potřebují se k barvení na žluto a zeleno; s kamencem a pak s křídou, docílí se žlutidlo mízové. Z prutů dějají se také chošťata. — Krávy a kozy žerou mladé větvičky, mléko ale z nich prý jest hořké. —

100.

### Krušina.

Frangula. Faulbaum.

Krušina obecná (Krušina. Frangula alnus, Rhamnus frangula. Faulbaum). Větve beztrné. Pupy bez šupin. Listy zřetelněji střídavé, lepké, eliptické neb opak vejčité, nejcelejší, toliko slabě vykrajované, po každé straně s osmi a více rovnoběžnými žebry postranními. Kališní úšty přímé. Plátky bílé. Plod červený, pak černý. Keř  $1\frac{1}{2}$ —3 m. Kveté v květnu a červnu. Roste ve vlhkých

lesích a křovištích. Kůra čerstvá způsobuje vrhnutí a průjem, pročež se upotřebuje usušené a uschované teprvé po druhém roce, když byla prudkostí své pozbyla; pak účinkuje tak dobře jako rhebarbora a sice v odvaru po 1 až 10 grm. několikrát za den užívána zvláště při zlaté žile, nemocech jater a sleziny, stálé zácpě, vodnatelnosti a j. — Plody také počítají a bývají od lidu k tomu cíli též jídaný. — Pro lékárnu sbírá se kůra s lýkem v březnu. Lýkem natírají na venkově též kůži při svrabu. Z plodů připravuje se zeleň řešetlaková; ze dříví se dělají čepy do sudů pivních a nejlepší uhlí na prach střelný. —



Obr. 56. Krušina obecná.

101.

### Krvavec.

Poterium. Becherblume.

Krvavec obecný (Krvavé koření menší, vlašský bedrník. *Poterium sanguisorba*. Becherblume, Herrgottsbärtle). Listy lichozpeřené, 8—10jařmé; lístky okrouhlé neb vejčité, hluboce pilovité. Květy mnohomanželné,

nahore ve strboulu. Kališní trubka síťovitě svraskalá, se čtyřmi přítlouštlými, úzce křídlovitými hranami. Květy zazelenalé neb načervenalé. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kveté v červnu a červenci. Roste na suchých, travnatých pahorcích a mezích. Odvar natí neb listů, buď s vínem buď s vodou, užíval se dříve proti úplavici červené, přílišné čmyře a proti všem možným krvotokům. Zevně se zelené roztlučené listy přikládaly na rány, píštěle a vředy všeho druhu, nebo se na ně sypal prášek z listů usušených a roztlučených.

Listy potřebují na některých místech pro chuť ostrokořennou co koření, proto i rostlinu v zahradách chovají pod jménem: *bedrník zahradní*. — Nať dává dobytku dobrou píci.

102.

### K u k l í k.

Geum. Benediktenkraut.

a) *Kuklík obecný* (Kuklík lékařský, benedykt. *Geum urbanum*. Nelkenwurz, Benediktenkraut, Benediktwurz). Lodyha odstále

chlupatá, nahoře bez žláznatých chlupů. Listy dolní přetrhávane lýrovitě zpeřené, hoření 3-dílné až 3-klané. Květy přímé. Plátky žluté, malé, beznehetné, opakvejčité, i s kalichem na plocho rozložené. Dolní článek čnělky na holénce lysý, 4krát delší článku hořeního. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kveté v červnu, červenci a srpnu. Roste v plotech, křovištích a hájích.

Kořen obsahující tříslovinu, pryskyřici a sílici, potřeboval se místo kůry chinové; užíval se proti zimnici studené, pro posílnění po přestálých těžkých nemocech, proti bezsilným krvotokům, bělotoku a blednici. K odvaru se bere 5—10 grm. na 200 grm. vody; prášku ze suchého kořene 1—2 grm. třikrát i čtyřikrát za den. —

Na lukách vlhkých, podle potoků a příkopů roste *b) Kuklík potoční* (Benedykt vodní. *Geum rivale*. Wasserbenedikt). Jest podobný předešlému, má však květy skoro třikrát větší, žluté do červenava, tmavěji žilnaté. — Odporučován byl proti téměř nemocem jako kuklík obecný. Kořen s vodou neb vínem vařený přikládá se na staré rány, píštěle, vředy, jahody čili znamení od narození. Místo obkladu vymývaly se též rány a vředy, nebo zasypávaly se práškem z kořene. —

103.

### Kustovnice.

*Lycium. Bocksborn.*

Kustovnice obecná (Kustovnice slabá. *Lycium barbarum*. Gemeines Bocksborn). Keř větví prutovitých převislých. Listy podlouhlokopinaté neb kopinaté. Kalich 2-pyský, pysků celých neb 2-zubých. Koruny špinavě fialově nachové. Bobule podlouhlé, šarlatové. Keř. Kveté v červnu, červenci a srpnu. U nás v zahradách pěstována i zdivočelá.

Listy rozmačkané přikládají na vředy a lišeje. Listy jako thé spařené, mladé pazoušky s octem a olejem jako chřest a listy jako salát se jedí, lehce počišťují a na moč pudí.

Kustovnice výborně se hodí k opletání stinných besídek a k děláni plotů neproniknutelných, neboť dlouhé, ohebné větve rozličným směrem se proplétají. Kustovnice u nás velmi dobře se daří, bujně roste a zimu snáší. — Rozmnožuje se semenem, rozvody a hřízenicemi; ze semene vzrostlá bývá silnější a stálejší.

104.

### Lavandule.

*Lavandula. Lavendel.*

Lavandule obecná (*Devandula*, levandule. *Lavandula vera* neb *Spica officinalis*. Lavendel). Lodyha křovitá, větevnatá 30—60 cm. vysoká. Květy přesleněné na klasech přetržených, konečných, fialově-modré. — Lavandule je u nás v zahradách obyčejná, květoucí

proutky kladou se do šatů pro vůni a zapuzení molů. Kvete v červenci a srpnu. — Celá rostlina obzvláště kalichy voní líbezně a silně, upotřebuje se suchá do pytlíčku zašitá na obklady, též zpařená na obklady obměkčující a ke koupeli, při obrně neb ochromení, zhmožděninách, studených nádorech a t. d. — Dříve se užívala voda z květu připravená proti slabé paměti, závratí, nadýmání a křečím. V lékárnách posud se chová květ, lih a olej lavandulový, květy pouze do pytlíčků na obklady a ostatní k natírání, tak na př. natírají se olejem víčka oční a spánky při slabosti zraku. — Květy sbírají se pro lékárnu v červenci a srpnu. —



105.

### Lebeda.

*Atriplex. Melde.*

a) *Lebeda lesklá* (*Lebeda divoká. Atriplex niteus. Wilde Melde*). Listy srdčité trojhranné, chobotnatě zubaté, toliko nejhořejší v latě někdy kopinaté, na líci zelené, lesklé, vezpod šedo- neb bělolupinaté. Krovky plodní vejčito-kosníkové, celokrajné; stopečka plodní vícekrát kratší než nažka. Bylina jednoletá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kvete v červenci a srpnu. Roste na rumných místech, příkopech a cestách.

Čerstvou nať roztlučenou nebo i spařenou obr. 57. Lavandule obecná. příkládá lid na opuchlé žlázy a nádory za ušima, nebo s medem smíšenou na nohy proti dnám. Roztlučené čerstvé listy nebo šťávu z nich chválí pak proti zánětům na údech, růži a j.

b) *Lebeda zahradní* (*Atriplex hortensis. Gartenmelde*). Listy obak dosti stejnobarevné, nelesklé, hořejší v latě podlouhlé, celokrajné. Krovky okrouhlé, stopečka plodní asi zdělí nažky. Bylina jednoletá  $1-1\frac{1}{3}$  m. Kvete v červenci a srpnu. Pěstovaná a pořídka zdivočelá.

Mladistvé listy již staří sobě libovali co zeleninu, ano i po dnes k jídlu v zahradách někde se pěstuje. Uvařená mírně účinkuje na stolicí. Semeno utlučené, s medem a vodou svařené piji někde proti zácpě jater a žloutenici. Čerstvá nať a listí upotřebují se proti téžže neduhům, jako od lebedy lesklé.

106.

### Leknín.

*Nymphaea. Seerosé.*

Leknín bělostný (leknín, lekno bílé, lekuta, lekní, taška bílá, štulík bílý, skulík bílý, vodní růže bílá, vodní lilium bílé, lekutí.

*Nymphaea candida*. Weisse Seerose). Čtyrhranný zpoděk kalicha silně vyuklý. Nitky nejvnitřnější nahoře značně širší než prašník. Semeník vejčitý, pod blíznu ztenčený a bez tyčinek. Paprsků blíznových nejvíce 6—10, vejčito-podlouhlých, zaokrouhlených se dvěma postranními rýhami, žlutých neb červených. Mnoholetá bylina. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste ve vodách zvláště stojatých, ve větších kalužinách, rybnících, jezerách a zátokách řek. —

Za dřívějších časů co lék oblíben květ a kořen. Květy vodou zavařené pily se místo hte v zarpustilém kašli. Puzená voda z květů pokládala se za výborný lék chladicí zvláště při zánětech plic, jater, sleziny, ledvin, dělohy a j. a podávala se nemocnému dle jeho přání. Zevně sloužila voda leknínová k umývání obličeje napuchlého neb růží a jinými vyrážkami záníceného. — Při těchže nemocech užíval se též syrup z květu zhotovený. — Olej leknínový užíval se zvláště

v zánětu ledvin, nemocech měchýře a palčivosti moče. K přípravě vody bralo se 5 částek čerstvého leknínového květu a 20 částek vody, což se přehánělo až na 10 částek tekutiny. K syropu se vzalo 2 částky lupenů květových, které ve 4 částkách vřelé vody v zavřené nádobě 12 hodin se ponechaly, načež se tekutina procedila a s cukrem až na hustotu syropu zavářela. — Olej se připravoval následovně: 40 grm. květu nechalo se 10 dní ve 400 grm. oleje z nezralých oliv na slunci močiti; pak se vytlačený a procezený olej vlil opět na čerstvý květ, což se třikrát opakovalo.

Kořen leknínový, tříslovinu chovající, zvláště prospívá v běhvkách, úplavicích, krvotocích, bělotoku a podobných nemocech. Též proti zimnici studené, kurdějím a všem nemocem žláz mízních se odporučoval.

Kořen se podával buď vodou vařený 10 grm. na 200 grm. vody, buď se nechal močiti v červeném vínu, které se pilo. Také se užívala šťáva z čerstvého kořene vytlačená nebo i prášek se suchého kořene utlučený.



Obr. 58. Leknín bělostný.



Štáva z kořene přikládala se na spánky, aby spaní působila. Odvarem kořene myla se kůže k zapuzení pih, blizen a všelijakých skvrn. Vodou, v které kořen močen byl, myla se hlava, aby dlouhé a pěkné vlasy narostly. Štáva z čerstvého kořene přikládala se na krvácející rány a otoky z ochabělosti vzniklé. Prášek ze suchého kořene byl sypán na rány k zastavení krve, na vředy, mokvající chrasty a j., aby je vysušil a zhojil. —

Kořen leknína slouží k barvení sukna, plátna, látek vlněných a j. na černo, k připravování černého inkonstu a barvy tiskařské. Kořen se skalicí zelenou poskytuje tak pěknou černou barvu na sukno, jak jen nejlepšími duběnkami a dřívím blankytným může se státi, ba někteří dávají barvě leknínové přednost. Na vlně a bavlně pomocí octanu železového a zinkového poskytuje překrásné proměny barvy kávové a tmavohnědé. Bavlna a hedvábí s močidlem kamen-covým nabývají barvu pěkně žlutavě hnědou. Též dává kořen čistou barvu šedou. Dále slouží i k vydělávání kůží způsobem obyčejným, protože obsahuje mnoho kyseliny duběnkové a třísloviny. — Má-li kořen ve všem posloužit, musí býti čistý a pozorně usušený, nikoliv však plesnivý, měkký a zkažený, jak velmi často v obchodu přichází.

Leknín se rozmnožuje a sází tím způsobem, jak u stulíka žlutého udáno jest. —

107.

## L e n.

Linum. Lein.

Len setý (Len. Linum usitatissimum. Lein, Flachs). Listy čárkovito-kopinaté, na kraji hladké. Kališní lístky na kraji suchomázdřité a nebrvité. Plátky modré. Stopky plodonosné ztuhá přímé  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Seje se zhusta.

Semena jsou slizovitá a olejovitá, pročež se užívají při nemocech zánětných, zvláště močidel. K odvaru se bere 5—10 grm. roztloučeného semene na 400 grm. vody, s přísadou osladiče, což se pije jako thé na př. při kataru měchýře. Při zánětech v krku užívá se odvaru co kloktadla, jinde ke klistéru. — Roztloučené semeno slouží ku kašičkám na obklady.

Z čerstvého semene připravený olej dává se ke klistéru i také uvnitř užívati, chutná však nepříjemně a více projímá. — Semeno pro lékárnu sbírá se v srpnu. —

U nás se pěstuje obyčejně *len mlaticový* (mlatec), jehož hlávky na slunci nepukají, a pak se mlátí, aby semeno z nich vypadalo, pak *len hledivý* (hledík, průžec), který se na slunci praží, aby hlávky jeho rozpukaly. —

Z lněného vlákna se zhotovuje příze, plátno, nitě, krajky a kment; z koudele provazy a t. d. Ze semene se tlačí olej k osvětlení, k maštění a pečení pokrmů, k připravování mýdla, pokostů a olejových barev. Lněné pokrutiny dávají dobrou pící a t. d. Mohlo

by se velmi mnoho ještě psáti, avšak není tomu zde místa, užitek lnu každému je dosti známý, jest to rostlina, která zasluhuje latinského jména: *Linum usitatissimum*, to jest: len nejužitečnější nebo dle Dr. Presla: přeužitečný. —

108.

## Libeček.

*Levisticum. Liebstöckel.*

Libeček lékařský (Libeček, apich veliký, vstetek. *Levisticum officinale*, *Ligusticum levisticum. Liebstöckel*). Lodyha oblá, rýhovaná. Listy dolní 2krát zpeřené; lístky kosníkově vejčité neb klí-



Obr. 59. Libeček obecný.

novito-podlouhlé, často 2—3laločné, stříhano-zubaté. Lístky obalu a obalíčků mnohé, kopinaté, bělomázdřitě obroubené. Plátky bledozluté. Bylina mnoholetá 1 $\frac{1}{4}$ —2 m. Kvete v červenci a srpnu. Pěstuje se v horách vedle obydlí.

Kořen byl za starých časů doporučován co lék pot a čmýru vyvádějící a na moč ženoucí, zvláště při vodnatelnosti. Účinkuje tak

jako Anjelika i může ve všech tam udaných nemocech a v téže dávce se užívati. Ve zvěrolékařství posud je kořen oblíben. — Pro lékárnou sbírá se kořen v březnu a dubnu.

109.

## Lýkovec.

*Daphne. Seidelbast. Kellerhals.*

Lýkovec obecný (Lejkovec lékařský, vlčí lýko větší, vlčí pepř, divoký pepř. *Daphne mezereum*). Listy jednorocní, opadavé, měkké, opak podlouhlo-kopinaté. Květy před listím vycházejí, jsou barvy



květu broskvového, nejvíce po 3 v paždí loňských listů, hučnými šupinami pupenovými obdané.

Trubka okvětní zděli kraje. Peckovice štávnatá, červená. Keř  $\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{4}$  m. Kveté v březnu a dubnu. Plody, peckovice jako bohatý hrách veliké, červené neb žluté, masité, lesklé, zrají v červnu. Roste roztroušeně v stinných a vlhkých horních lesích.

Kůra kmenová nemá zvláštního zápachu, kousána nemá dřív chuti, pak ale zůstává prudkost, palčivost dlouho trvajících a bezcitnost jazyku. Květy lýkovce zdaleka lí-

Obr. 60. Lýkovec obecný.

bezně voní, z blízka však opitomují. Peckovice zvláště jádra dřívě olejovostí svou jsou mírné, pak ale pálí, dráždí a ústa opuchují.

Kůra čerstvá nebo suchá vodou navlhá a na kůži přiložená, červení, zpruzuje, leptá dřívě povrchně, pak ale do hloubky se vžírání, zpryskuje a zvředuje. Kůra požitá způsobuje pálení žaludku, hnusnost, vrhnutí, řezání v životě, úplavici, pálení a krvavý moč, slizotok z močové trubice, bolesti hlavy, závratě, slabost, ouzkość, třesení údů, bolesti v kostech, nepokojné spaní, pálení a svrbení

po celém těle, poty, vyrážky kožní a t. d. Proto velmi opatrně má se s lýkovcovou kůrou zacházeti. Podobné i mnohem horší příznaky vyvádějí peckovice, velmi pěkné a lákavé to plody, které z neznalosti zvláště od dětí bývají požity. V takovém případě nejdříve hleděti dlužno, aby polknutý jed davidlem vyvrhnut byl, načež se co protilék dávají nápoje sliznaté. Obyčejně se užívá kůry zevně co prudidla, avšak i tu je bezpečnější hořčice nebo křen, který podobně účinkuje. Hnětenka, prudidlo neb těsto (placka pruduivá) přikládá se na rozličná místa kůže v zapáleninách neb zánětech počasných, očí, nosu, hrtanu, plic a j., dále při zakořenělých slizovicích, vyrážkách počasných, tvrdošijných a zlých vředech, při hostci, pakostnici a ochromení jednotlivých údů. — Od některých lékařů bývá předepsán odvar kůry při neustupných kožních nemocech, při rheumatismu, pakostnici a zastaralé příjici. Za starých časů doporučován byl odvar též proti vodnatelnosti, rozžíravým a krtičným vředům.

Mimo kůry a z ní utlučeného prášku, zhotovuje se i extrakt k přípravě papíru proti dně a masti, sestávající s 1 dílu extraktu a 9 dílů oleje olivového s bílým neb žlutým voskem. Mimo to lze v lékárnách dostati i flastr z lýkovce připravený. K užívání vnitřnímu vezme se 5—10 grm. kůry a 400 grm. vody, zvaří se až na 200—350 grm. s přísadou sladkého dřeva, nebo i slizovitými a aromatickými rostlinami; odvar pak možno píti jako thé 2—3 šálky denně. Od prášku smí se užiti 2—4 centgr. dvakrát neb třikrát za den. Pro lékárnou sbírá se kůra v březnu.

Kozy, ovce, prasata, kůry a někteří ptáci, zvláště drozdi žerou listy lýkovce, avšak plody, peckovice, jsou skoro všem ssavcům jedem.

Z plodu možno červenou barvu k malování dobytí. Větve vařeny dávají šťávu zelenavě-žlutou, která vlně vismutem močené barvu rezavo-hnědou uděluje. — Z kůry kořenové možno šedý papír shotoviti. — Někteří nerozumní a nesvědomití lidé dávají peckovice do piva a kořalky, aby silnější neb opijivější byly, čímž však rozličné i povážlivé nemoce vzniknouti mohou. Lýkovec v každé půdě rozmnožuje se snadno semenem neb odnožemi, ozdobuje zahradu, proto že v březnu málo rostlin květe, později však dlužno hleděti, aby děti jedovatých plodů se nenajedly.

110.

## L i l e k.

*Solanum. Nachtschatten.*

a) *Lilek sladkohořký* (Potměchuť, sladká hořká, psinky vodní, modré, červené; sladká vrbka, červené psí víno, myší dřevo. *Solanum dulcamara*. Bittersüss). Polokeř s kmenem dřevnatým, větvemi bylinnými, položený neb popínavý. Listy vejčito-podlouhlé, nedělené neb hořené 2 odstálými oušky střelovitě. Vrcholíky zdánlivě postranní a latovité. Koruny fialové, na zpodu ústů se 2 zelenými tečkami,

zřídka bílé. Bobule elipsoidické, šarlatové, zvící hrachu. Polokeř  $\frac{1}{3}$ —3 m. Kvete od května do srpna. Roste v plotech, křoví, podle příkopů, potoků a řek.

† Větvičky jsou nejdříve chuti hořké, protivné, pak zaslzlé, potřebují se zvláště aby způsobily pot při nemocech kůže, hostci a přijíci, také se užívají proti krticím a kašli rozličného druhu. Obyčejně se dává 10—20 grm. k odvaru, který po lžičkách ve 24

hodinách se využívá. Ostatně je lépe, když lid léto byliny se vystříhá, proto že velmi prudce účinkuje, snadno vrhnutí, průjem, závratě a jiné povážlivé příznaky způsobuje. Podobně účinkují též bobule, a děti sluší upozorniti, aby je netrhaly a nejedly. — V lékárně se prodávají větvičky usušené a extrakt, avšak málo kdy bývají od lékařů předpisovány, proto že je jiných příjemnějších a neškodných léků, které podobně a mnohem lépe účinkují. — Větvičky pro lékárnou sbírají se v březnu, srpnu a září. Poněvadž lilek sladkohořký velmi hluboko kořeny do země žene, s prospěchem potřebovati se může k upevnění břehů a hrází. Žlutavé a tuhé větve hodí se k pletení košíků a k tenkým obručím. Zápach větví jest velmi protivný myším a krysám, protož k zahánění jich se potřebují; lesníci prý jimi lákají lišky. Kozy a ovce žerou list, ostatní dobytek



Obr. 61. Lilek sladkohořký.

však rostliny této se nedotýká. — Potměchuť snadno se rozmnožuje odnožemi a hřízenicemi.

b) *Lilek obecný* (lilek menší, černý, psinky černé, psí víno, psí hrozno. *Solanum nigrum*. Nachtschatten). Kořen letý. Listy nedělené, vejčité neb přitrojhranné až kosníkovité, chobotnuto zubaté, až vykrajované. Vrcholky zdánlivě postranní, okolíkovité. Koruny bílé, zřídka lilákové. Bobule černé, zelené neb žluté. Bylina jednoletá 30—60 cm. Kvete od května až do podzima. Roste na pustých místech, cestách, rolích a zahradách.

Nať obzvláště mnutá, vydává zápach mámivý; vnitř se málo kdy užívala, leda pálená voda z ní, když byla 2—3 leta stará proti

pálivosti moče a jiným palčivým bolestem vnitřním. Za to se přikládaly zevně rozkrájené čerstvé listy na čelo, uši, prsa, žaludek a vůbec na všechny části těla, ve kterých se nějaká bolest pocítila.

Někteří badatelé počítají rostlinu tuto mezi jedlé, neškodné, jiní však považují ji za jedovatou. V Dalmacii prý bobule na másle smažené jedí, aby líbezně spáti mohli, u nás pozorováno, že děti se roznemohly, když syrových bobul požily. —

c) *Lilek brambor* (brambor, zemče, zemské jablko, bobál, erpetle a j. *Solanum tuberosum*. Kartoffel, Erdapfel). Oddenek hlízonosný. Listy přetřhané lichozpeřené. Vrcholík konečný. Koruny bledofialové neb bílé. Bobule kulaté. Bylina mnoholetá. Kvete v červenci a srpnu. Vůbec známý a sázený. Brambory surové, strouhané přikládají se na zpáleniny a opařeniny; uvařené strouhané s vodou neb mlékem na kaši smíšené a ohřáté na otoky, také na jiná místa, zvláště při zánětech plic, jater a j. — Velkou cenu mají však v hospodářství. —

První brambory přivezeny byly do Evropy asi v r. 1585—88 a sice z Ameriky, kde již od dávných časů za potravu lidem sloužily. Trvalo to přes dvě století, nežli si u nás získaly všeobecné důvěry. Ještě r. 1822 psal náš proslavený botanik Dr. Jan Svatoopluk Presl následovně: „Matka má, žena 68letá loni v Pánu zesnulá kolikrát vypravovala, že za její mladosti zemčata byla vzácnost velká, a že jistý muž z Jachymsthalu rodičům svým malé pytlíky darem obzvláštním a vzacným přinášel. Soudili bychom tedy, že zemčata asi před 50 lety k nám nepochybně ze Saska, zvláště do krajů západo-půlnocních přišla. Do krajů východo-severních nepochybně ze Slezska přenešena byla. Nyní všude po Čechách jsou rozšířena a zimního času téměř jedinou jsou potravou, zvláště horních obyvatelů a můžeme říci, že by se mohlo většího hladu obávat, kdyby se zemčata neurodila, než kdyby obilí se nepodařilo.“

Nyní je brambor všude rozšířen, neboť rozmnožuje se velmi snadno, jest úrodný i snáší všeliké rozdíly jak podnebí tak i půdy. Sázením dlouholetým uchýlily se brambory neb zvrhly se od původního tvaru, tak že nyní je přes 60 odrodků, co do tvaru, velikosti, barvy i dobroty; jsou tu kulaté, podlouhlé, bílé, červené, fialové, modré a t. d. Barevných brambor upotřebuje se více v panských domech pro okrasu salátů a jiných z brambor připravených jídel. Již r. 1822 udával Dr. Presl, kterak z brambor lze připravovati klobásy, ježka neb pudding, výběhlík čili náky, týkanec neboli dort, chleb, sýr a t. d. V knize pí. Dumkovou vydané jest přes 200 jídel z brambor připravených popsáno. Patrně, že brambor nejen potravou nejchudšího lidu jest, ale že i v zámožnějších rodinách s nějakou, třeba i sebe menší přísadou neb rozmanitou přípravou za pokrm slouží.

Brambory sestávají z vody, ze škrobu a jenom z něco málo bílkoviny, proto samy sebou jsou málo potravné, a mají-li výživu poskytnouti, tedy se jich musí mnoho snísti, což však žaludek obtěžuje. Brambory však spojené s mlékem, vejci, masitou polévkou,

masem a j. činí velmi vydatné potravné jídlo. — Mladé, klišovaté, jakož i příliš staré brambory jsou těžko záživné; zmrzlé brambory jsou i škodlivé. Polévku a kaši z bramborů lze snadněji strávit, nežli celé brambory vařené neb pečené. Z brambor dělá se zvláště mouka, škrob a kořalka, pak i krupice, ságo, rejže, pivo, víno, ocet, droždí a cukr; dále může se jimi plátno bíliti, práti a s voskem svíce i shotoviti.

Brambory vařené a pak rozmačkané poskytují dobytku a drůbeži výbornou píci. —

Lilek brambor patří nyní ohledně svých plodů k našim nejúčtečnějším rostlinám, avšak i nať, květy a bobule jeho jsou k potřebě, ačkoliv zůstávají nepovšimnuté. Mladé rostlinky totiž ze země pučící i s mladými listy rozsekané a vařené, mohou se jak Dr. Presl píše, buď pro sebe nebo s jinou zeleninou jísti. Při tom pozorovati dlužno, aby při vaření voda několikrát se slila a čerstvá nalila, čímž netoliko chuti protivné pozbývají, ale tím dříve se uvaří.

Listy jako tabákové truzené místo nich slouží, jak se dle Presla již dávno ve Švédsku dělo. Listům a lodyhám dával Handel v Maincu přednost u dělání safánu. Čerstvá nať i květy dávají citronově žlutou šťávu, která vlně cínem močené touž barvu prozračnou a trvanlivou poskytuje.

Mnohosemenné, nezralé, zelené bobule (uzralé jsou černé) mohou se jako olivky nakládati a požívati; jsou prý chutnější nežli kyselé okurky. Známo je, že bobule chovají v sobě prvek mámivý, neb jak lid říká jedovatý, proto asi v málo které kuchyni je nakládají, ačkoliv prý octem a vařením mámivý prvek se zruší nebo alespoň umírní.

Husy hynou, když bobul byly požily.

Dobytěk o nať bramborovou mnoho nedbá, pakli ale zpařená se mu předloží, dost rád ji žere. — Lodyhy usušené mohly by se místo paliva upotřebovati. O bramboru, o jeho pěstování a užitku dala by se sepsati celá knížka, avšak pro tento spisek stačí, co bylo ve vsí krátkosti podotknuto, zvláště že rozličných pojednání bylo již uveřejněno a také každému mnoholetou zkušeností, jak sázení, tak i uschování a upotřebení brambor dodatečně známo jest.

d) *Rajské jablko* (jablko milosti, zlaté, pasvice obecná. *Solanum lycopersicum*. *Paradiesapfel*, *Liebesapfel*). Lodyha bylinná, žláznatě chlupatá. Listy vezpod sivé, přetrhávaně zpeřené, lístků zpeřené stříhaných. Koruna žlutá, ve více než 5 ústů rozeklaná, zdělí kalicha. Bobule mnohopouzdrá, brázdovaná, červená, někdy žluto-červená, žlutá i bílá, lesklá. Bylina jednoletá. Kvete od července do října. Pěstuje se v zahradách.

Nať celá vydává zápach těžký, nepříjemný, mámivý a chutná zahofkle. Též tak zapáchají a chutnají nezralé, zelené bobule; uzralé však jsou příjemně navinulé a dosti líbezně voní.

Listy rozmačkané přikládaly se dříve na místa zapálená neb zanícená k utišení bolesti; šťáva z lodyh vytačená na zapálené oči. Matthioli praví: „že jablka rajská v oleji vařená nebo na slunci v něm

dobře močená dobrá jsou, aby jimi horkou prašivinu mazal. Také radí šťávu z nich proti nemoci červené a jiným horkým tokům; vždy však má toliko zevnitř býti užívána, při čemž prý pozornosti potřebí; nebo velikou by škodu velmi brzo učiniti mohla.“

Tenkrát ovšem byla rostlina tato za jedovatou vyhlášena, což se později vyvrátilo.

Rajská jablka jsou v našich kuchyních vůbec známa, připravují se z nich zvláště omáčky k masu hovězímu nebo na kuřata. Bobule se nakládají do octa, aby se udržely a omáčka z nich i v zimě mohla se dělati. — V Indii východní jedí surové bobule místo ovoce jiného po obědě k občerstvení; ve Vlaších přidávají k nim olej, pepř a sůl, též je vaří s těmi přísadami. V Amboině požívají i surovou nať s rybami. — K sázení se časně z jara semena do hrnců květinových založí; z nich napotom sazenice přesadí se do půdy dosti mastné, teplé, vlhké a vyslunné. Poněvadž lodyhy na zem se kladou, podeprou se tyčkami.

111.

## Lilije.

*Lilium.* Lilie.

a) *Lilije žlatohlavá* (Zlatohlávek, závojek. *Lilium martagon* Türkenbund, Goldwurz). Cibule žlatožlutá. Listy eliptičně kopinaté, krátkorapíčné, prostřední po 3—8 ve 2—3 přesledech sblížené. Květy v konečném řídkém hroznu, převislé, růžové, nachově skvrnitě; lístky okvětní ohrnuté. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kveté v červnu a červenci. Roste ve světlých hájích chlumních. — Cibule jest sliznatá a v Sibiři se jí, u nás jindá v lékařství se potřebovala. Víno s cibulí vařené doporučovalo se proti nepravdělné čmýře a obtížnému močení. Cibule rozetřena s vepřovým sádlem neb jiným tukem, nebo i smíšená s práškem lněného semene neb rejže, přikládala se buď ve způsobu masti nebo kašičky k utišení bolesti při zlaté žíle,



Obr. 62. Lilije žlatohlavá.



k odměkčení naběhlých a zatvrdlých prs po porodu, jakož i k rozeznání tvrdých nádorů a boulí.

b) *Lilije bílá* (Lalia, lalija, lalije, laluje, křín, krym. *Lilium candidum*. Weisse Lilie). Tato mnoholetá,  $\frac{2}{3}$ —1 m. vysoká bylina, jest všude v našich zahradách pěstovaná a každému známá. Velké, bílé, na hroznu konečném přímé neb nicí květy vydávají silnou vůni, která v ložnici může i bolení hlavy způsobiti. Původně pochází z Malé Asie, kde její cibule vařené neb pečené se jedí.

Bílé lístky krásného květu v oleji dřevěném na slunci močené dávají *olej lilijový*, oblišený co domácí prostředek obměkčující, rozhánějící a bolesti umírňující. Zvláště se doporučuje k natírání proti křečím, ochromení, dnám, nádorům; k utišení posledních bolestí při porodu. Olej lilijový se dává ke klystérům proti zácpě a hryzení v břiše.

Lístky květu, které při močení v dřevěném oleji na dně v lahvi leží, přikládají se na vředy a hlízy (apostema, apostila), též na rány a popáleniny.

Někde z cibule připravují též mastě a kašičky, na způsob a proti podobným neduhům, jak bylo při liliji zlatohlavé udáno. — Cibule ve víně svařená a tři dni bez ustání přikládána zažene prý kuří oka. — Cibule rozmačkaná a s medem smíšená přikládá se na poraněné šlachy a vymknuté klouby. —

Za starých dob užívaly se i květy a cibule v odvaru proti zánětu jater a vodnatelnosti. — Za dobrý lék proti žloutenici se měl odvar květu s bílým vínem; k tomu cíli se ve 3 litrech vína svářelo půl hrstě bílých, od žlutého prášku bedlivě očištěných květních lístků, až na 2 litry procezeniny, od které nemocný po 6 dní vždy ráno jeden díl ohřátý pil. — I semeno lilije bílé s vínem píté radilo se proti uštknutí hadem. — Nyní se liliji sotva kde uvnitř užívá, zevně však posud na dosti místech se upotřebuje. —

112.

## L í p a.

*Tilia. Linde.*

Lípa mnoholistá (lípa, lípa skalní, lípa zimní. *Tilia ulmifolia*, *Tilia europaea*. Winterlinde). Letorosty a řapíky lysé. Listy lisé, toliko v úžlabičkách žeber vezpod rezavě vousaté, vezpod nasivělé, se zuby krátce a tlustě zašpičatěnými. Vrcholky 5—10květé, (zřídka jen 3květé), přímé. Laloky bliznové rozložené. Našky tenkostěnné, slabě žebnaté. Tyčinek 20—40, bez korunky. Čnělka po odkvetení sotva prodloužená. Strom. Kvete v červenci. Roste v lesích, v stro-mořadích, ve vesnicích a j.

Květy čerstvé, silné a líbezně voní, sušením však vůně pozbyvají, chuti jsou zasládlé, slizké. Staří lékaři připisovali jim moc bolesti a křeče utišující i dávali the píti při padúcnici, křečích srdečních; také chválili odvar kůry, že bolesti při zánětech umírňuje

a dnám pomáhá. Listy vařené jindá proti žábrám, moučnicku dětem se dávaly, též na kaši svařené na zapáleniny přikládaly.

Posud jsou v lékárnách sušené květy k dostání, co lék mírně posilňující a pot vzbuzující, při lehkých rheumatických nemocech a katarrech plic. Sušených květů dává se 5—10 grm. na 200 grm. vody, k nálevu s nějakým syrubem, od kterého se užívá za 2 hodiny 2 lžice. Obyčejně však se pije po šálcích jako thé, často i s mlékem smíšené. — Pro lékárnou sbírají se květy v červnu a červenci.

Jest známo více druhů lip u nás zvláště: *lípa šírolistá* (*Tilia platyphylla*), pak *lípa stříbrná* (*Tilia argentea*) a *lípa americká* (*Tilia americana*).

Dříví lip jest bílé, lehké, tuhé, dost pevné, měkké, outlovlákné, ani červům ani bortění příliš podrobené. Dříví lípy malolisté pomaleji rostoucí jest pevnější. Soustružníci, truhláři a řezbáři zhotovují z něho rozličné věci. Na černo pácované nabývá pohledu dříví ebenového, Z lípového dřeva dělají se prkna ku kreslení. Též zhotovují se z dříví toho mísy, talíře, číše, necky a jiné nádoby. Uhlí z dřeva lípového slouží ku kreslení, k přípravě prachu střelného a prášku na zuby. Z lýka lípového shotovují se lana, rohožky, košíky, klobouky, bačkory a j., ku kterému konci lýko se dřívě ve vodě močí, jako len neb příze, čímž hebkosti a větší tuhosti nabývá. — Z kůry dělají se rozličné nádoby. Ze semen možno dobytí olej, mandlovému podobný.

Listy dobytek rád žere; též i suché pro ovce, kozy a krávy pící jsou dobrou v zimě. Včely z květů mnoho medu sbírají.

Lípy rostou nejlépe v půdě kypré, suché a také nejdéle vytrvají; v těžké a vlhké brzo zkotlaví a hynou. Semenem nabývá se stromů nejpěknějších a nejtrvanlivějších. Semeno v podzimku vyšeté nazvíce z jara klíčí. Buď se klade do stroužek, nebo vyseje se do půdy zdělané, vyrovnané, kterou pak utlouci sluší. Z jara vyšeté semeno nejméně rok v zemi leží. Lípy mohou se také odnožemi a hřízenicemi rozmnožovati, kterými však stromů méně pěkných se nabývá. — Lípy rychle rostou, za 40—50 let dosahují znamenité výšky a síly, stáří pak i přes 800 roků. — Lípa malolistá roste zponenáhleji, jest však oblíbenější, proto že list déle zachovává. —

113.

## L n i c e.

*Linaria. Leinkraut.*

Lnice obecná (Květěl, rozrazil, len matky boží. *Linaria vulgaris. Antirrhinum linaria. Leinkraut*). Lodyha s listy lysá, neojíněná, toliko v květenství žláznato-pýřitá. Listy čárkovito-kopinaté až čárkovité, po kraji ohrnuté, sblížené. Hrozen hustý, střechovitý. Semena okrouhlá, plochá, velmi útle zrnkovaná, blánovitě obroubená. Koruny namnoze veliké, bledě sírkově žluté s jícnem pomorančovým, huňatým.

Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete od června až do zaří. Roste na písčinách, úhorech, mezích a cestách.


Kvetoucí nať se doporučovala a někdy až posud doporučuje jako lék na stolicí a moč účinkující, proti vodnatelnosti, žloutenici a počasným nemocem kožním. K odvaru se bere 20—40 grm. na 200 grm. procezeniny. Pro lékárnu sbírá se kvetoucí nať v červenci. Zhotovuje se z ní také masť, kterou se zvláště natírají nádorky zlaté žíly. —

114.

## Locika.

*Lactuca Lattich.*

Locika zahradní (salát hlávkový, *Lactuca sativa*. Lattich, Häupel-salat). Lodyha nahoře latnatě větvitá, větví přímých, nahoře menšími listy hustě porostlých, na konci do stejné výšky chocholičnatých.



Obr. 63. Locika zahradní.

Listy dosti rovnovážné, vejčité, nedělené, hluboce srdčito-střelovité; malé lístky na latě ostnitě zubaté. Nažky opakvejčito-podlouhlé. Květy bledě žluté. Bylina jednoletá  $\frac{2}{3}$ —1 m. Kvete v červenci a srpnu. Vůbec co zelenina pěstovaná a pod jménem hlávkový salát známá. Mléčná a zhuštělá šťáva z lociky vytlačena dávala se po 7—40 ctgrm. za den, buď v prášku, roztoku neb v pilulkách proti křečím, pro spaní, k utišení bolestí, zvláště proti suchému, namáhavému kašli při souchotinách. —

115.

## Lomikámen.

*Saxifraga*. Steinbrech.

a) *Lomikámen zrnatý* (Lomikámen bílý, roupové koření. *Saxifraga granulata*. Steinbrech). Oddenek nese nahloučepé cibul-

kovité pupeny. Lodyha chudolistá, nahoře žláznato-huňatá, vrcholíčnatá. Listy přízemní dlouze řapíkaté, okrouhlo-ledvinkovité, hrubě vroubkované, lodyžní klínovité, dlanité stříhano-vroubkované. Kalich do  $\frac{2}{3}$  5klaný, ústí přímých, podlouhlých. Plátky bílé, skoro třikrát delší ústí kališních. Bylina mnoholetá 15—46 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste na suchých lukách zvláště lesních, na mezích a kopcích.

Nať s kořenem, s bílým vínem vařená, doporučovala se druhdy k pití nadevše proti kamenu měchýřnímu, k počištění ledvin a měchýře, proto že na moč žene. Stejný účinek připisoval se semenu, na prášek utlučenému a s vínem smíchanému. —

b) *Lomikámen trojlaločný* (*Saxifraga tridactylites*) na mechatých skalách, mezích a písčinách rostoucí, potřeboval se jako předešlý, mimo to byl chválen proti zacpání žlaz a chorobám jaterním, žloutenici a počínající vodnatelnosti. Nyní přišly úplně k zapomenutí.

116.

## Lopuch.

*Lappa. Klette.*

Lopuch pavučinatý (lopuch plstnatý. *Lappa tomentosa. Arctium lappa. Arctium bardana. Klette*). Úbory prostředně veliké; lístky zakrovu namnoze hustě pavučinaté, vnitřní nachově zbarvené, skoro



Obr. 64. Lomikámen zrnatý.



Obr. 65. Lopuch pavučinatý.

čárkovité, uťaté, tupé neb vykrojené s hrotem skoro rovným. Listy a úbory tmavěji zelené. Bylina dvouletá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kvete v červenci a srpnu. Roste na pustých místech, cestách, mýtinách, poříčí. Lopuch je všude známý a úbory jeho házejí žertem do vlasů, z nichž pro háčky těžko se dají vyplést. — Kořen byl dříve i v lékařství

užíván co lék krev počistující, také v počasném rheumatismu, pakostnici a dlouho trvajících kožních vyrážkách. Užívalo se odvaru jako thé k pití a sice 10—20 grm. kořene na 400 grm. vody. — Někde svářeli i listy. — Pro lékárnu sbírá se kořen dvouletý v březnu a dubnu. —

117.


## M á ě k a.

*Eryngium. Mannstreu.*

Máčka polní (máčka, toito, mužská víra, *campestre. Mannstreu*). Lodyha nejvýše 63 cm., i

větrník. *Eryngium* se strbouly jablečné zelená. Listy bodlavě tuhé, 3četně dvakrát přenoklané, dolejší řapikaté, horní oušty ostnitě zubatými objímavé. Listy zákrovní delší okrouhlého strboulu. Plátky bílé, šedě nabělé. Bylina mnoholetá 15—63 cm. Kvete v červenci a srpnu. Roste na suchých mezích, cestách, paloukách.

Kořen zapáchá mrkví, chutná zasladle a kořením; druhdy se jídal a v lékařství potřeboval; šťáva z nati byla chválena proti vyraženinám. Víno nebo medová voda s kořenem vařená pila se proti hryzení břicha, větrům, zácpě sleziny a jater, žloutenici a vodnatelnosti, zástavě čmýry a moče, i proti kamenu ledvinnému. Kořen se



Obr. 66. Máčka polní.

žaludy vařený doporučoval se proti padúnci a křečím vůbec. Čerstvý kořen roztlučený přikládá se na bakule, otekliny a naběhliny, na zadřené do svalů tříšťky, bodláky a j.

**Malinník.**

Rubus. Himbeere.

a) *Malinník obecný* (Malina, maliny. Rubus idaeus. Himbeere). Pruty přímé, koncem převislé, ojiněné, s ostenci jehlicovitými. Lístky vejčité, pilovité, vezpod hustě a krátce šedoplstnaté, zřídka přilysé. Listy na prutech zpeřeně 5četné neb také 3četné. Plátky čárkovitoklinovité, přímé, jen zdělí tyčinek. Plod od lůžka celkem se oddělující, červený, kratičce plstnatý. Keř  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Kveté v květnu, červnu a červenci. Roste v lesích a mýtinách.

Z plodů *malin* připravuje se v lékárnách voda a syrup, které pro chuť a oslazení přidávají se k jiným lékům. Syrup s vodou smíšený poskytuje příjemný a chladící nápoj, zvláště při nemocech zánětných. — Zahořklé listy malinníků druhdy se potřebovaly proti běhavkám a krvotokům. — Maliny se sbírají pro lékárnou v červenci a srpnu. — Sem náleží:

b) *Ostružinník* (ostružiny. Rubus plicatus neb fruticosus. Brombeere). Keř každému známý. Roste v lesích, křovištích, plotech, na pahorkách i na rolích. Kveté v červnu a červenci. Plody *ostružiny* jsou dříve červené, pak černé, lesklé a sladko-nakyslé. — Nezralé a sušené ostružiny posud se jedí proti úplavici červené a proti přílišné čmýře. Když není ostružin, mohou se k pití uvařit suché listy a konečky větvíček i květy. Kořen s vínem vařený neb na prášek utlučený doporučoval se proti kamenu ledvinnému a písku močnickému. Víno s listmi a větvíčkami vařené slouží za kloktadlo proti všem vředům a nemocem v ústech a krku, jakož i k umývání těla při chrastech a jiných podobných vyrážkách kožních; též se může kůže natíratí šťávou z čerstvých listů a větvíček vytlačenou.

Jak z ostružin tak i z malin možno dělati víno, ocet a kořalku. V kuchyních zavářejí se plody na povidla k moučným jídlům; ovšem mají maliny pro výbornou chuť a vůni přednost.

**Mařina.**

Rubia. Röhhe.

Mařina barvířská (Mařena barvířská, mařena zahradní, mařena, mořena, mořenka, broc, brotec. Rubia tinctorum. Färberröhhe). Oddenek plazivý, červený. Lodyha na 4 hranách a listy na kraji a hřbetní žíle silně ostnito-draslavé. Listy po 4—6, eliptické neb kopinaté. Vrcholíčky konečné a úžlabní. Koruny namnoze 5klané, na zelenalé-žluté. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kveté v červenci a srpnu. Pěstovaná i zdivočelá na lukách, pastvinách podle lesů. —

Kořen hořký a svírající doporučuje se v lékařství zvláště proti křivici a zástavě čmýry. Dává se prášku z kořene 1—2 grm.

3—4krát za den, nebo 10—30 grm. kořene v odvaru na 200 grm. vody, zvláště dětem, které prášek nerady užívají. Kořen mařinový v lékárně se chová od lékařů však nyní málo kdy bývá předepsán. Kořen pro lékárnou sbírá se v září a říjnu.



Obr. 67. Mařina barvířská.



Obr. 68. Mařinka vonná.

Kořen usušený a zemletý potřebuje se k barvení na červeno a k děláni laku mořenového. V jižní Evropě sází a pěstuje se mařina barvířská velmi mnoho. — Kořen od nemocných déle užíván zbarví pot, moč, sliny, mléko i kosti na červeno. —

120.

### Mařinka.

*Asperula. Waldmeister.*

Mařinka vonná (planá mařena, božcové koření. *Asperula odorata. Waldmeister*). Lodyha čtyřhranná. Listy po 8, podlouhle kopinaté, dolní po 6, kopistovité. Květy stopkaté ve volných vidličnatých vrcholcích, bez obalu, s listeny nebrvitými. Koruny bílé neb trochu načervenalé, trubkovito-zvonkovité; trubka zdělí kraje. Mnoholetá bylina 15—63 cm. Kveté v květnu a červnu. Roste v stinných, prstnatých lesích hornatějších.

Kvetoucí nař sbírá se ku konci května a na začátku června, v malých nař silných svazečkách na vzduchu se suší, pak roz-

krájí a uschová v uzavřených plechových krabicích. Voní silně a velmi příjemně. Jindy se potřebovala v lékařství jako thé, zvláště proti silnému třesení a bušení srdce, žloutenici, vodnatelnosti a zácpě. — Na některých místech připravují májové víno tím způsobem, že hrst čerstvé rozkvetající mařinky nechají půl hodiny v 1½ litru bílého vína močiti, načež víno scedí, cukrem osladí a pijí.

121.

## M á t a.

*Mentha. Minze.*

a) *Máta peprná* (*Mentha piperita*. Pfefferminze). Lodyha a listy jen roztroušeně chlupaté neb dosti lysé. Listy podlouhlé neb vejčito-kopinaté, skoro 2krát ostře pilovité s řápkem mírně dlouhým. Klasy tlusté, dosti řídké, doleji namnoze přetrhované; vrcholíčky dlouzeji stopkaté, 2 nejdolejší v úžlabí lupenů. Kalich lysý. Bylina mnoholetá 46—63 cm. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Pěstuje se a časem zdivočuje.

Nať voní silně, jest chuti dříve kořenné, zahřívající, pak chladící, příčina čehož jest silice, etherický olej. Užívá se při bezsilných horečkách, slabosti zažívadel a s ní spojených těžkostech, ošklivosti od žaludku, vrhnutí, nadýmání, křečí břišních a hysterických, bolestech při čmýře a t. d.

V lékárně lze dostati listy, vodu, olej, lih a pokroutky mátové. Listů se bere k nálevu 7—15 grm. na 200 grm. vody; oleje se užívá 1—2 kapky na cukr; lihu mátového 10—15 kapek 3—4krát za den.

Též tak se užívá a účinkuje b) *Máta kadeřavá* (*Mentha crispa*. Krausseminze), která má listy stříhaně pilovité, kadeřavé a v zahradách se pěstuje. — Nať máty peprné i kadeřavé sbírá se pro lékárnu v červnu a červenci. —

Pro některou lékárnou sbírá se v červenci též máta: c) *Polej* zvaná (*Mentha pulegium*. Flohkraut), která má lodyhu větevnatou, rozkladitou. Listy vejčité neb opakvejčité, spoře drobně pilovité. Přesleny četné, kulaté, úžlabní, oddálené; koruny lilákové. Mnoholetá bylina 12—31 cm. Kvete v červenci a srpnu. Roste na vlhkých písčných březích. Odporučovala se jako máta peprná při těchže nemocech, zvláště však proti kašli dusivému, dýchavičnosti a křečím hysterickým.



Obr. 69. Máta peprná.



122.

**Meduňka.***Melissa Melisse.*

Meduňka lékařská (Včelník, rojovník, dubravník, matečník, melissa, marule, marulka, medunice. *Melissa officinalis*. Melisse). Listy vroubkovano-pilovité, vejčité neb srdčito-vejčité, hoření klínovitě súžené. Vrcholčky úžlabní, jednostranné s listenci vejčitými. Koruny bílé neb narůžovělé. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kvete v červenci a srpnu. Pěstuje se a zdivočuje.



Obr. 70. Meduňka lékařská.

Nať napomáha vypařování kůže, utiňuje bolesti v životě, větry, hypochondrické a hysterické křeče, bolesti reumatické a podněcuje zažívání. Nať nebo pouze jen listů bere se k nálevu 5 až 20 grm. na 200 grm. vody. V lékárně lze dostati též vodu melissovou a lih melissový, od kterého se může 20—30 kapek vícekrát denně užiti. — Sbírá se pro lékárnou v červnu.

123.

**Medvědice.***Arctostaphylos. Bärentraube.*

Medvědice lékařská (Tolokněnka, kostrounek, nedvědice. *Arctostaphylos officinalis*. *Arbutus uva ursi*. Sandbeere, Bärentraube). Kmen položený. Listy opak-vejčité, celokrajné, tupé, kožovité, síťnatohlavné. Hrozen krátký, chudokvětý, ko-

nečný. Koruny bílé, na konci růžové. Plody červené. Keř  $\frac{1}{3}$ —1 m. dlouhý. Kvete v květnu a červnu. Roste v lesnatých vřesnatých chlumech a písčitých borech.

Listy trpké a nahořklé chvální se proti nemocem močidel, zvláště kde ústroje tyto seslábly jsou, proti kapání moče, zástavě moče, kataru měchýře, močení krve, proti vředům ledvin a měchýře, bělotoku, písku a šlemu v moči. Prášku ze suchých listů užívá se po 1—2 grm. dvakrát i třikrát za den, neb v odvaru 10—20 grm. na 200—270 grm. vody, neb procezeniny. — Listy pro lékárnou sbírají se v dubnu.

Plody moučnaté potřebují se na severu s jinou moukou smíšené na chléb. Listy slouží k vydělávání kůže a k barvení sukna na černo a šero, přidávají se i do tabáku kuřlavého.

**Merlík.***Chenopodium. Gänsefuss.*

Merlík vonný (Kudravec. *Chenopodium ambrosioides*. Mexikánsches Traubenkraut). Roztroušeně pýřitý a žláznatý. Listy vezpod se zlatožlutými žlázkami, podlouhlé, oddálené zubatouňké, hořejší celokrajné. Klubka květní v klasech úžlabních, nejvíc jen hořeji drobnolistnatých. Bylina jednoletá. Kvete v červnu až do září. Roste pořádku jednotlivě zdivočelý.

Celá nať, zvláště mnutá, má zápach silný, kořenný, poněkud kafrovitý, který ani sušením nevyčichne. Kvetoucí nať se posud prodává v lékárnách a doporučuje se při slabosti nervové, ochromení a křečích, dychavičnosti neb dušení a křečích na prsou, i při posunčíně buď v nálevu po 10—20 grm. na 200—270 grm. vody, buď v prášku 1 $\frac{1}{2}$ —7 grm. dvakrát neb 3krát denně, buď pro sebe nebo ve spojení s jinými příhodnými léky. — Pro lékárnou sbírá se nať v červenci. —

**Meruzalka.***Ribes. Johannisbeere.*

a) *Meruzalka červená* (meruzalka, víno sv. Jana, rybíz, rybíz červený, rybízky, rybízle, svatojanské jahůdky. *Ribes rubrum*). Šupiny pupenů jemně pýřité, Řapíky žláznato-brvité. Listy 3—5 laločné, vezpod nejprv hustě šedopýřité; laloky široké, krátké, přitupé. Hrozny brzo převislé, přilysé, stopky 2—4krát delší vejčitého listenu. Číška kališní ploše mískovitá; úšty okrouhlo-kopistovité, nazpět neohrnuté, lysé. Plátky žlutavé, malinké. Bobule červené. Keř 1—1 $\frac{1}{2}$  m. Kvete v dubnu a květnu. Roste v hájích a křovinách vlhkých, jinde snad jen zdivočelá; v zahradách se na všech místech pro lahodné plody sází.

Bobule mají vůni a chuť příjemnou, dosti silně kyselou, rozpálené tělo mírně ochlazují, rozprouděnou krev usazují, žízeň hasí a hnilobu překazují. Proto se užívají v zimnicích palčivých, zvláště s horkostí a žízni spojených, proti bolení hlavy, závratí, mdlobám, krvotokům, tiučení srdce; dále proti žloutenici, kurdějím, zácpě, kamenu močovému a j.

V lékárnách prodává se z nich shotovený syrup, zvláště pro přísadu k nápojům a lékům protizánětným. Syrup se připraví, když 400 grm. šťávy a 800 grm. bílého cukru jednou se nechají přepejchnouti. Bobule sbírají se pro lékárnou v červenci.

Meruzalky se jedí surové i zavařované, nesmí se jich příliš mnoho jísti, aby kyselost a slabost žaludku nezpůsobily. Meruzalky bílé jsou méně kyselé nežli červené, u nás však nejsou oblíbeny. Na zimu se dají udržeti meruzalky i v hroznech, hlavně však zavařenina z nich slouží za nádivku do koláčů, tortů a t. d., proto nejen

v kuchyních lepších, zvláště ale u cukrářů mnoho meruzalek se zpotřebuje. — V některých zemích, kde nemají révy, připravují z meruzalek víno, kořalku a ocet.

V ohledu řemeslnickém toliko se ví, že větve možno poskytnouti suknu barvu hnědou, bobulemi špinavě žlutou (nankynovou).

Ovce, kozy a prasata rády nať žerou, koně však ji zavrhuji. Včely v květech nacházejí mnoho medu. Meruzalka rozmnožuje se velmi snadně, potřeba toliko mladé větvičky 1—2 střevice dlouhé z jara nebo na podzim pod jedním okem uříznouti a dvě třetiny v půdu zastíněnou zasaditi, kde brzo okořenatí. Též se rozmnožuje rozdělením kořenu a kyváky, když totiž větev se sehne, zemi přikryje, v podzimku odřízne a na své místo přesadí. Ačkoliv meruzalka v každé půdě roste, nicméně v dobré lépe se daří, pěknější, větší i chutnější plody nese; čím řídkěji od sebe stojí, tím hojnějších a větších plodů dává.

b) *Meruzalka horská* (meruzalka hluchá, planá, rybíz hluchý, planý. *Ribes alpinum*. Alpenjohannisbeere) jest předešlé podobná a činí přímý  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. vysoký keř s kůrou na kmenu a větvích popelavou. Květ nazelenale nažloutlý objevuje se v dubnu a květnu, bobule červené zrají v červenci. Roste na podhořích našich lesích a na lesnatých stráních.

Meruzalka horská nese poměrně málo ovoce, moučnatého, zakysilého a méně chutného, proto také jen k dělání živých plotů se sází. Ve Švédsku dělají z jejího tvrdého dříví zuby na hrábě. — Domácí dobytek všechn žere rád listy. Rozmnožuje se podobným způsobem jako meruzalka červená.

c) *Meruzalka černá* (rybíz černý, smradlavý, smradinky. *Ribes nigrum*. Schwarze Johannisbeere) jest předešlým podobná,  $\frac{2}{3}$ —2 m. vysoká, kvete zelenavě žlutě v dubnu a květnu, má však bobule malé, černé neb černě fialové. Roste u nás pořádku na místech lesnatých a vlhkých.

Nať i plody zralé zapáchají močem kočičím nebo štěnicemi, nic méně je však v některých zemích rádi jedí, zvláště když na keři zůstaly až zhniličely, čímž příjemnější jsou a méně zapáchají. U nás málo kdo si jich všímá, v Sibíři však prý jsou plody mnohem větší a velmi hledány. Rusové připravují z bobul buď pro sebe nebo s medem kvašených s kořalkou nebo bez ní nápoj vínu podobný; též šťávu vytlačenou do kořalky míchají. Jako z meruzalek červených možno i ze smradinek šťávu, sirup a víno připravit. Ve Švédsku barví listím kořalku žitnou na žluto; Angličané potřebují mladých pupenů, aby pivu příjemnou chuť poskytli; též i vinaři jimi dávají vínu chuť muskatelovou. Dlouhým vařením smradinek docílí se šťáva, která vlnu do černohněda barví. — V líhu vařené dávají šťávu pěkně fialovou, která kyselinami se nepromění, alkaliemi však mizí.

Užitek v lékařství není patrný. Mladé listy vřelou vodou zpařené a pak sušené místo thé čínské se doporučovaly, mají chuť trpkou, svráskující a proto držány byly za posilující jakož

i vnitřní kůra toho keře. — Listy a mladé větvičky čerstvé neb suché, vysoce se chválily proti suchému píchání; k tomu cíli v bílém víně roztlučené se přikládaly na místa suchým pícháním navštívená, nebo se pily jako thé; též se jim připisovala moc na moč pudící a vařené proti oteklému hrdlu se poroučely. Svařené dříví užívalo se proti vodnatelnosti a vnitřní kůra sloužila proti rozličným nemocem dobytka, neb se věřilo, že všecken jed na sebe přitahuje a rychle dobytek nemoci zbavuje.

d) *Meruzalka srstka* (srstka, chlupatka, polka, meruzalka, an-grešt, agrest, jahoda zelená. *Ribes grossularia*. Stachelbeere, stachlige Johannisbeere) jest keř hustovětvný,  $\frac{2}{3}$ —1 m. vysoký, trny posá-zený s listy okrouhlými, troj- až pětilaločnými, hrubě pilovitými; květy stojí po 1—3 na krátkých převislých stopečkách. Plody, bobule jsou dosti veliké, srstnaté nebo hladké, žlutavé neb i čer-vené barvy. Srstka roste v horních, skalnatých krajinách, na skalách a suchopářích vyslunných, též v plotech po celé Evropě; kvete ke konci dubna a na počátku května, plody zrají v červenci.

Srstky nezralé jsou velmi kyselé a trpké, zralé však příjemně sladké neb navinulé; jedí se syrové, zavařené nebo naložené; na slunci, na povětří neb i v peci mírně vytopené mohou se také sušiti pro kuchyňské potřeby. V krajinách révy nemajících dělají ze srstek výborné víno. — Štáva vykysavší dává výborný ocet a pálením dobrou kořalku, kterou možno i z matolin po vytlačení šťávy zůstalých připraviti. — Větve a listy poskytují víně připravené barvu hnědou, květy včelám mnoho medu; list žere rád všecken dobytek. K plotům velmi se keř tento hodí, roste v každé půdě a rozmnožuje se velmi snadno, jako meruzalka červená.

126.

### Měsíček.

*Calendula. Ringelblume.*

Měsíček zahradní, (krusíček pam-palík. *Calendula officinalis*. Ringel-blume, Todtenblume). Listy oddáleně zoubkaté, dolní kopistovité, hoření podlouhlé až kopinaté, poloobjímavé. Plody téměř všechny člunkovité, kří-dlaté, na hřbetě se špičatými hrboulky, vnější sotva zobanité, vnitř nahoře

s křídlovitým kylem. Úbory dosti velké, koruny pomorančové. Bylina jednoletá 30—46 cm. Kvete od června až do října. V zahradách



Obr. 71. Měsíček zahradní.


všude pěstována i zdivočelá. — Květy doporučují se co lék pot zbuzující, též proti žloutenici, krticím a vzteklíně. Štáva z čerstvých květů dává se na bradavice, kuří oka; spařené čerstvé květy příkladají se na opuchliny. — Z čerstvé květuční natě připravuje se posud v lékárnách extrakt, avšak málo kdy bývá předepsán. Květy pro lékárnou jakož i květuční natě sbírá se v červnu i v červenci.

127.

## Mydlice.

*Saponaria. Seifenkraut.*

Mydlice lékařská (mydlice. *Saponaria officinalis. Seifenkraut*). Bylina trávazelená, lysá neb pýřitá. Listy vejčito- neb podlouhlo-kopinaté, 3žilné. Květy svazčité, v konečném a pobočných vrcholcích. Plátky bílé neb pletně narůžovělé. Bylina mnoholetá 30—60 cm.



Obr 72. Mydlice lékařská.

Kvete v červenci a srpnu. Roste na březích potoků a řek, ve vlhkých křovinách, též v zahradách se sází pro líbeznu vůni s květem plným. Kořen její a listy v lékařství se potřebovaly, vyznačují se mydlicovinou, prvkem škrablavým, hořkým, pění se s vodou jako mýdlo. Jest lékem rozpouštějícím a krev očišťujícím, radí se proti zácpě břicha, žloutenici, pakostnici a počasným vyrážkám kožním. K odvaru, jako thé k pití, bere se 40 grm. na 400 grm. vody. Dříve se užíval též extrakt 5—10 grm. za den v pilulkách neb v roztoku. Posud se prodává v lékárně; kořen sbírá se na jaře v dubnu, neb na podzim v září a říjnu; natě v červnu.

128.

## Mléč.

*Sonchus. Gänse-distel.*

a) *Mléč hladký* (*Sonchus laevis, oleraceus. Gänse-distel*). Listy měkké, hoření oušky rovně namířeny, odstálými, namnoze zašpičatěnými objímavé, celé neb lýrovitě proti-sečné a zubaté, se zuby ze širšího dolejška skoro ostnitě přišpičatěnými. Nažky mezi pilovito-svraskalými žebry zřetelně napříč svraskalé. — Květy žluté. — Bylina jednoletá 15—90 cm. Kvete v červnu až do podzimka. Roste na rolích, záhonech, rumištích a v křovinách.

Jemu velmi podobný je *b) mléč ostrý* (*Sonchus asper*) a *c) mléč polní* (*Sonchus arvensis*).

Všechny tři druhy, pokud jsou mladistvé, jedí se na některých místech buď vařené neb surové jako salát, což se radilo dříve i z lékařského ohledu k rozředění šťáv těla. Štáva se užívala proti kapavému močení, kamenu a obtížnému dýchání; šťáva s krupovkou



Obr. 73. Mléč hladký.



Obr. 74. Mochyně boborolka.

pitá proti tlačení a svírání v žaludku. Odvar nati se radil za nápoj kojným a matkám, aby měly hojnost mléka a děti dobrou barvu v obličejí. — Zevně se přikládaly čerstvé roztlučené listí na horké nádory a na žaludek naběhlý; listí v ústech rozkusované odjímají prý páchnoucí dech a šťáva do zevnějšího zvukovodu vkapaná zahání prý rozličné bolesti ušní.

129.

### Mochyně.

*Physalis. Schlutte.*

Mochyně boborolka nebo židovská třešně (mochyně, měchuňka, višně mořská, višně židovská, liščí jablko. *Physalis alkekengi*. Judenkirsche, Schlutte. Boberelle). Lodyha větevnatá, z plazivého oddenka. Listy vejčité, vykrajované, v řapík sbíhající, hoření po 2 vedle sebe a vedle jednotlivých, za plodu nicích květů. Plodní kalich

žilnatý, posléz šarlatový, uvnitř žlazkatý. Bobule pomorančová. Mnoholetá bylina  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v červnu, v červenci a srpnu. Roste na vinicích, v plotech, rumišťích a v příkopech hájních.

Starí potřebovali nať i bobule. Listům přičítali moc chladící a svírající, bobulím ale vyhánějící, žloutenici a vodnatelnost uzdravující, na moč pudící a kámen z měchýře vypuzující, palčivý moč a všecky vnitřní vředy vyčišťující. Štávu z bobul měli za dobrou proti zahnojeným a talovitým očím. — Bobule se do octa jako salát nakládají i také surové jedí, při čemž dbáti sluší, aby se nesetřel spolu hořký prášek uvnitř kalichu se nacházející.

130.

## Mochna.

Potentilla. Fingerkraut.

a) *Mochna lesní* (Nátržník, přetržník, tržené koření. *Potentilla sylvestris*. *Tormentilla erecta*. *Potentilla tormentilla*. *Tormentille*). Lodyha položená, vystoupavá neb přímá, nikdy nekořenující, nahoře vidličnato-vrcholičnatá. Listy lodyžní přisedlé neb překrátce řapikaté, vždy 3četné; lístky podlouhlo-klínovité, skoro stříhano-pilovité. Palisty veliké, příprstnatě hluboce 3—5klané. Květy skoro vždy 4četné. Plátky menší, dosti ploše rozložené, ke kališním lístkům přiléhající. Strboul holének nízký, asi z 8 přeslenovitě sestavených holének. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kvete od června až do října. Roste na suchých lesních lukách, vřesovištích, mýtinách a rašelinách. — Kořen mnoho třísloviný obsahující je trpký a užívá se proti trpným krvotokům, dlouho trvajícím bělotokům, běhavkám, průjmům a úplavici. Zevně odporučuje se jako kloktadlo proti ochablému tipku, oduřelým dásním, městkám, vředům a vůbec proti neduhům s vysílením a ochabnutím spojeným. K odvaru se bere 10—20 gm. kořene na 200 gm. vody. — Prášku se užívá 70 ctgr.—1 $\frac{1}{2}$  gm. tři až čtyřikrát za den. Také je k dostání v lékárně extrakt. — K vystříkování a mytí odvaňuje se 30—40 gm. kořene se 400 gm. vody až na polovičku, totiž až zbude 200 gm. tekutiny. — Pro lékárnou sbírá se kořen v březnu, dubnu a pak v září a říjnu. —

b) *Mochna husí* (stříbrník, husí mýdlo. *Potentilla anserina*. *Gänserich*). Lodyha výběžkovitá, sympodiálně složená, kořenující, na uzlinách s jednotlivými květy. Úšty kališka celé, neb 2—3klané. Plátky žluté. Bylina mnoholetá; kvete v květnu, červnu a červenci. Roste na průhonech, návsích, u potoků a cest.

Kořen a nať slabě svraskují a ženou na moč; druhy v lékařství se potřebovaly, ve víně vařeny odporučovaly se proti úplavici červené, chrlení krve, krvo- a bělotoku. Mochna s pelyňkem užívala se proti červům a hryzení v břiše. — Voda s mochnou vařená a vlažná v ústech držaná utiší bolesti zubů. Pálená voda z mochny slouží k obkladům na zanícené oči. Štáva listů na čelo natřená, zastavuje krvácení nosu. — Pálenou vodou se omývá od slunce opálený obličej i též, aby pihy a jiné skvrny z něho zmizely.

Podobně se jindá i v lékařství užívaly jiné druhy mochen na příklad: c) *Mochna stříbrná* (pětílístek, pětiprstek, štírice. Pot. argentata), s malými zlatožlutými květy, která na cestách, mezích, trávnatých úklonech roste, v červnu a červenci kvete 15—31 cm. d) *Mochna plazivá* (pětílístek, pětiprstka. Pot. reptans), s květy žlutými, ponejvíc 5četnými, korunami značně velikými. Roste na vlhkých lukách, průhonech, v plotech a příkopech. Kvete v červenci a srpnu 15—90 cm. e) *Mochna bílá* (Pot. alba) s květem bílým. Roste na lesních paloučích, stráních a v suchých lesích. — 5—16 cm. Kořen mochny lesní, stříbrné a plazivé slouží k vydělávání kůží a k barvení jich na červeno.

131.

### Moruše.

Morus. Maulbeerbaum.

a) *Moruše černá* (Moruše černá, jahodník. Morus nigra. Schwarzer Maulbeerbaum, Maulbeere). Větve světle červenohnědé. Listy přitlouštělé, na lici velmi drsné, vezpod mrtnaté. Klasy mnohem delší stopky neb skoro přisedlé. Kraj okvětí a blizny srstnaté. Plody štávnaté, nakyslé a černé. Strom 6—12 m. vysoký. Kvete v květnu. Pěstuje se.

U starých Řeků užívalo se ostré a hořké kůry z kořene co léku počišťujícího a proti tasemnici; nyní však v lékárně shotovuje se z plodů jedině sirup, který slouží za přísadu jiným lékům, zvláště pak lékům svírajícím, jichž se užívá k vytírání a čištění žaber, vředů a moučnicku v ústech. — Plody pro lékárnou sbírají se v srpnu. —

Moruše černá pochází z Asie; v jižní Evropě je zdivočelá; ve střední Evropě se sází pro své chladící a lahodné ovoce k jídlu. U nás pěstuje se též b) *moruše bílá* (morus alba. Weisser Maulbeerbaum), která je nižší, má listy různotvarné, mnohem menší a měkčí, květ žlutavo-zelený, plody menší, bílé, někdy též červenavé a černavé, též jedlé, avšak mdlé a sliznaté. Listy slouží ke krmení bourců hedbávných; listy moruše černé se ke krmení bourců nehodí, proto že jsou tvrdé. — Dříví je žlutavé, dosti tvrdé od truhlářů a soustružníků na útlá díla hledané. — U nás je lépe pěstovati jak moruši černou tak i bílou jako keře a nikoliv jako stromy. Lýka ročních výstřelků potřebovati se může k děláni dobrého bílého papíru.

132.

### Narcisek.

Narcissus. Narcisse.

a) *Narcisek bílý* (narcis, narcisová růžička, narcisek. Narcissus poeticus. Weisse Narcisse). Okvětí bílé. Korunka mnohem kratší než okvětí, miskovitá, žlutá, po kraji červenavá, vroubkovaná. Listy 3—4čárkovité, z cibule vejčité. Stvol 2řízny, 1květý. Bylina mno-



holetá 30—46 cm. Kvete v květnu. Roste v zahradách pěstovaný a na některých místech i zdivočelý.

b) *Narcisek žlutý* (*Narcis kadeřavý*, žlutý květ únorový, Josefova hůl. *Narcissus pseudonarcissus*. Gelbe Narcisse). Podobný předešlému, jen že má okvěti bledožluté; korunu zdělí okvěti, číškovitou, po kraji vlnovitě vroubkovanou, temně žlutou. Bylina mnoholetá až 30 cm. Kvete v březnu a dubnu; roste na těchže místech jako předešlý. —

Cibuli hořkou, sliznatou dávali jindá pro vrhnutí, obyčejně v polévce vařenou. Květy, obsahující prvek prudký, jedovatý, mámivý a ostrý, byly před časy v lékařství potřebovány, zvláště v chorobách křečových. Zevně přikládala se cibule na rány, vředy, obzvláště spálením povstalé; cibule roztlučená a s medem smíšená na sněh, dnavé a vymknuté údy. Cibulí smíšenou s octem a semenem kopřiv natíraly se pihy, lišej, trudy, uhry a jiné podobné vyrážky.

Stejným způsobem užívalo se též před časy cibul tulipánů, jak c) *tulipánů lesního* (*Tulipa silvestris*), tak i ostatních, jež v zahradách pro ozdobu se pěstují.



Obr. 76. Narcisek bílý.

obzvláště šťávu z nich vytlačenou lid upotřebuje zevně k natírání nádorků zlaté žíly, navní kosti, kuřích ok, pih, moučnicku, popálenin a j. — Někde sázejí netřesk na střechy z pověry, že hrom odvádí.

133.

### Netřesk.

*Sempervivum. Hauswurz.*

Netřesk střešní (netřesk obecný nebo větší, rojník. *Sempervivum tectorum*. Hauswurz, Hauslauch). Listy rozetek podlouhlo-opakvejčité, zakončité. Kališní lístky a špičkově růžové plátky 12četné, hvězdovité rozložené. Tobolky okolo kotlinovité prostory postavené, vystoupající, na zevnitř do čnělky ohnuté. Bylina mnoholetá 23 až 46 cm. Kvete v červenci a srpnu. Roste na zlích, střechách a skalách. — Listy,

134.

### Ochmet.

*Loranthus. Riemenblume.*

Ochmet evropský (ochmet jmélovitý, jmělí dubové, jmělí žluté (ohledně plodů), jmělí hnědé (ohledně kůry). *Loranthus europaeus*.

Europäische Riemenblume). Větévky s 3 páry listů ne zcela vstříčných, opak vejčitých neb podlouhlých, řapíkatých, kožovitých, opadavých. Květy 2domé, v konečných, řídkých, chudokvětých klasech; okvěti skoro na zpod 6dílné a nažloutlé. Keř  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v květnu a červnu. Na dubech cizopasný.

Všechny částky zapáchají stuchlinou nepříjemně; čerstvé jsou chuti zahořklé, svráskavé, zaslizlé; kůra a zažloutlé bobule mezi prsty třené jsou lepkavé. — Upotřebuje se dříví kůry zbavené v lékárnách pod jménem: Lignum visci quercini (dřevo jmélu dubového) známé. Jest to již prastarý lék zvláště proti padúcnici chválený. Četná starší i novější pozorování stvrzují dobrý výsledek ochmetu při padúcnici čistě nervosní a ne příliš zastaralé, zvláště při útlých a citlivých nemocných, jakož i takových, kde s padúcnicí průjem, bolestný a křečovitý pocit se střídají. Mimo to ochmet se užívá při posuncině a jiných křečích, jako v hysterii, křepčivosti neb nemoci sv. Víta a j. Staří měli za to, že zapuzuje též zimnici studenou, žloutenici, souchotě, běhavku a hryzení břicha; též dělali z ochmetu flastr, který přikládali na otekliny, hlízy a vředy; k tomu cíli také užívali roztlučných bobul, které přiloženy i k umírnění bolesti dnavých prý přispívaly.

Ochmet má se sbírat v únoru, v mírně vytopené peci neb na kamnech usušiti a pak v dobře uzavřené sklenici uschovati. Dřevo oloupané má býti tak suché, aby se dalo na prášek, který prý nejlépe účinkuje, roztlouci; podává se dle stáří 2—5 grm. třikrát za den, smíšený s nějakým sirupem, medem a j. — Ostatně může se dříví též vařiti, 20—40 grm. na 400 grm. vody, s osladičem neb jinou přísadou, od čeho se za 3—4 hodiny půl šálku pije. — V únoru se dodává též do lékáren.

135.

## O l š e.

*Alnus. Erle.*

Olše lepká (olše, olše obyčejná, olcha, jelcha, jelše. *Alnus glutinosa. Erle, Erlenbaum*). Listy okrouhle opakvejčité, zpředu uťaté neb vykrojené, stejnobarevné, vykrajovaně nestejně až dvakrát pilovité. Šišťice podlouhlo-vejčité, postranní dost dlouze stopkaté. Strom až do 16 m. vysoký, každému dosti známý. Kvete v únoru a březnu. Roste na březích, bařinách a v lesích vlhkých. Listy svraškující druhy v lékařství se potřebovaly, ano i po dnes lid venkovský je přikládá na rány a vředy, též je dává do obuvi, aby nohy se nepařily a při delší chůzi neumdlely. Někde svářejí vnitřní kůru s vínem a kamencem a vyplachují tím ústa, aby dásně utvrdili a bolestem zubů zabránili. Odvar kůry této slouží i za kloktadlo při zánětu ústním a hrdelním.

Olše jest důležitá již proto, že se daří na místech, na kterých jiný lepší strom neroste; potřebuje se k upevňování břehů a hrází,

dělání plotů kolem vlhkých luk. při čemž se dá klestiti a klest usušený výbornou zimní pící poskytuje. Dříví do žluta červenavé jest prostřední palivo, k vodnímu stavení jest však dobré; ještě lépe hodí se truhlářům, soustružníkům a řezbářům; z likodry na kořenu dělají dýmky, tabatěrky a j. — Kůra hořká a trpká slouží k vydělávání kůže a k barvení na černo a hnědo.

136.

## Oman.

*Inula Alant.*

Oman pravý (Oman lékařský, voman. *Inula helenium*. Alant). Listy nestejně zubaté, vezpod jak vnější lístky zákrovu hedvábitě plstnaté, lodyžní srdčito-vejčité, objímavé. Úbory velké, koruny žluté, v paprsku čárkovité. Mnoholetá bylina 1—1½ m. Kveté v červenci a srpnu. V hornatějších krajích pěstovaný a na paloučích, u příkopů zdivočelý.



Obr. 76. Oman pravý.

Kořen sestávající ze škrobu, kafru, vosku, pryskyřice a hořčiny dřívě v lékařství byl velmi oblíbený a posud ještě se chová v lékárnách, jakož i extrakt a tinktura.

Kořen omanový povzbuzuje činnost odměšovací žaludku a střev, zvláště účinkuje též na sliznici dychadel, na miznici a jiné žlázy i na kůži těla. Odporučuje se tedy při nemocech žaludka nezáživnosti, mzech, slabém zažívání, zašlemování a j., při nemocech dychadel, kašli rozličného druhu, dýchavičnosti, bolestech a tíži na prsou, při blednici a slizotoku, třesení údů od výparu kovů, rtuť povstalém a t. d. Dřívě byl kořen v odvaru neb masti též proti svrabu chválen. K odvaru se vezme 10—20 grm. kořene na 200 grm. vody. Extraktu 35 ctgr. — 1 grm. dva-

krát i třikrát za den buď v pilulkách, neb roztoku; tinktury 20—30 kapek, 2—3krát denně. — Také se může užívat prášek z kořene buď pro sebe, buď v lektvaři nebo v soustu, po 1—2 grm. — Pro lékárnou sbírá se kořen na jaře v dubnu a březnu, na podzim v září a říjnu. — Z kořene připravují někde víno omanové.

**Oponec.**

Glechoma. Gunderman.

Oponec obecný (vopenec, voponec, openec, popenec, poponec, zádušník, budra. *Glechoma hederacea*. Gundelrebe). Lodyha položená, kořenující. Listy sístnaté neb pýřité, dolní ledvinkovité, hoření okrouhlo-srdčité, hrubě vroubkované, zřídka pilovité. Vrcholíčky úžlabní, jednostranné, 1—3 květé. Koruny světle fialové, zřídka růžové. Mnoholetá bylina 8—60 cm. Kvete v dubnu, květnu a červnu. Roste na lukách, mezích, luhách lesních a v křovištích.

Čerstvá šťáva natě byla od starých lékařů chválena proti dlouho trvajcímu kašli, chrlení krve, souchotinám a vředům ledvin a podávána po 20—40 grm. několikrát za den buď samotná neb se syrovátkou smíšená. Nyní jarního času se sbírá s jinými bylinami na polévku.

138.

**Ořešák.***Juglans*. Wallnuss.

Ořešák královský neb vlaský. (Ořech královský nebo vlaský. *Juglans regia*. Wallnussbaum, Wallnuss). Listy namnoze 7četné, lístků podlouhle eliptických, lysých, vykrajovaných. Plod skoro kulatý, lysý. Strom 12—25 m. Kvete v květnu. Zhusta sázený.

Zelené slupky ořechu byly za nejstarších dob vychvalovány co lék proti škrkavkám; později užívaly se při chabosti a zašlemování žaludku, zvláště však při zkažených šťávách těla, proti vchublým, krtičnatým, kurdějovitým, jahlinatým a příjicným vředům. Odvaru slupek užívalo se po lžičkách nebo jako thé ráno a večer šálek 10 grm. na 200 grm. vody. — Listy ořechové účinkují prý podobně jako slupky. Proti žloutenici obzvláště se doporučovaly, 2—10 grm. na kamnech usušených a na prášek roztloučených listů, zvlažovalo se od večera až do rána ve sklenici bílého vína, které se pak na lačný žaludek ráno vypilo; 12—16 takových dávek vyléčilo prý žloutenici úplně. — Odvar z listů přidává se ke koupeli proti krticím. — V lékárnách se prodává též extrakt, jehož 30 ctgr. až 1 grm. 3krát i 4krát za den užívati může proti nemocem dříve uvedeným. — Pro lékárnou sbírají se listy v červnu, nezralé plody neb ořechy v červenci, zeleuě



Obr. 77. Oponec obecný.

slupky v září a říjnu. — Zelené slupky potřebují se k barvení na černo a hnědo. Nezralé ovoce se nákládá do cukru s kořením a jí se co lahůdka, neb se dává do lihu na rosolku. Jádra zralého ovoce slouží k jídlu, též se z nich připravují torty, cukrovinky a j. Z jader dobývá se výborný olej, na jídla a k malování dobrý. Dříví z kmenu jest nahnědlé, pěkně merhované, od truhlářů hledané; puškaři zhotovují z něho pažby. Z kořene dělají pěkné hebké hole.

139.

### Orlíček.

*Aquilegia. Akelei.*

Orlíček obecný (Vorlíček. *Aquilegia vulgaris*. Gemeiner Akelei). Lodyha nahoře větevnatá. Listy 2krát trojené; lístky vejčito-okrouhlé, vezpod sivé. Ostruhy plátků hákovité. Květy fialové, růžové neb bílé.



Obr. 78. Orlíček obecný.

Bylina mnoholetá 30 až 60 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste v stinných listnatých lesích, na keřnatých stráních, v plotech a křovinách. Upotřeben bývá kořen, nať, květ a semeno. Kořen na prášek utlučený doporučoval se proti kamenu močnickému, ujímání neb hryzení břicha. Odvar z 2—5 grm. prášku dává se co kloktadlo při kurdějích k očištění vředů v ústech a k upevnění zubů i dásní. — Zpařenina nati byla též vychvalována co lék proti kurdějům. Zpařenina květů doporučuje se proti zapálení hrdla. — Semena buď v prášku po 2 grm. za tři hodiny, buď co mléko se podávají při neštovicích, spalničkách, zástavě čmýry

a moče, při žloutenici a hryzení břicha. — Orlíček obecný velmi často pro ozdobu v zahradách se pěstuje; jedině kozy žerou nať; včely nacházejí ve květech hojnost medu. Květy vodou spařené dávají modrou barvu, kterou snad by mohli jen chemikové upotřebiti ke skoumání kyselin a alkalií.

**Orsej.***Ficaria Schölkraut.*


Orsej jarní (*Celidonya* neb *celidon* menší,  $\frac{1}{4}$  roupové koření, rouník, orsej, krtičník menší. *Ficaria verna*, *Ranunculus ficaria*. Kleines Schölkraut, Feigwarzenkraut). Kořen svazčitý, s hlízkami kyjovitými. Listy ledvinkovito-srdčité, vykrajované neb uhlaté vroubkované. Kališní lístky 3, zřídka 4—5; plátky zažloutlé, počtem 8 až 12; nažky bezzobané, s bliznou skoro přisedlou, neobroubené. Bylina mnoholetá 8 až 24 cm. Kvetě v dubnu a květnu. Roste v stinných huštinách a lesích.

Kořen orseje před kvetením je velmi ostrý, na jazyku štípe, chuť má dříve kyselou pak zahořklou a hnusnou. Čerstvý rozmačkán a na kůži přiložen za chvíli zpryskuje a zvředuje. Štáva do nosu vtáhnuta způsobuje kýčání. Vařením jakož i když květy odpa-

daly, pozbývá těch vlastností a jest chuti slizovité a chladící. Suchý kořen jest moučný, zahořklý. Nať není ostrá; listy mají chuť trávovou, chladící a bývají s jinými bylinkami k připravování bylinných polévek na trh přinášeny.

Hlízky kořenu bývají často v kypré zemi deštěm obnaženy a od lidu za žito s nebe spadlé držány; jsou škrobnaté a mohou za potravu sloužiti, chléb z jejich mouky upečený jest dobrý.

Kořen sušený a roztlučený podává se s medem v krticích a zlaté žile. Zevnitř buď rozmačkaný neb rozličně připravený přikládá se na otekliny krticemi a zlatou žílou povstalé. Na některých místech užívají nať s cukrem, vínem a octem proti kurdějům. Nať rozmačkaná a s moukou smíchaná zvláště na zlatou žílu se přikládá.



Obr. 79. Orsej jarní.

141.

**Osladič.***Polypodium. Engelsüss.*

Osladič obecný (osladeč, osládeř, sladuška. *Polypodium vulgare. Engelsüss, Süßfarn*). Listy lysé, podlouhlo-kopinaté, 2řadé, přenosné, přezimující; řapík na dolejšku článkovaný; úkrojky podlouhlé neb podlouhlo-kopinaté, drobounce vroubkované. Kupky veliké; kupky výtrusnic sedí na konci kratší, kraje listového nedosahující větévky postranní žíly. Oddenek tlustý, krátkočlenný. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Zraje v září. Roste v lesích na skalách, pařezích, starých zdech.

Kořen jindá se potřeboval místo sladkého dřeva neb pravého osladiče, který u nás neroste a do obchodu přichází z jižní a jihovýchodní Evropy; (jest to kořen lekořice lysé, žlázatá a ježatá). —

Kořen osladiče obecného posud je u lidu oblíben jako lék proti kašli, nemocem plicním vůbec, kurdějím, pakostnici, nemocem jater, ledvin a měchýře a j., proti kterým i za dřívějších časů doporučován býval. — Posud se sbírá v září pro lékárnu; k odvaru se bere 15—30 gm. na 200 gm. procezeniny.



Obr. 80.  
Osladič obecný.

142.

**Ostropestřec.***Silybum. Frauendistel.*

Ostropestřec obecný (ostropestr, ostropes, ostropec, podstřel. *Silybum marianum, carduus marianus. Frauendistel, Mariendistel*). Listy veliké, lesklé, lysé, bílé žilnaté, po kraji silně trnité, dolní podlouhlé, chobotnaté, prostřední objímavé, protisečné. Úbory veliké. Bylina dvou-

letá 1—1½ m. Kvete v červenci a srpnu. Roste místy v libosadech a na rumišťích zdivočelý. —

Kořen a nať jsou velmi hořké. Odvar kořene se dříve doporučoval k pití proti zácpě jater, vodnatelnosti, žloutenici, proti zástavě čmýry a moče, písku a kamenu ledvinnému, kyčelním bolestem. Kořen se radil vařený jisti matkám a kojným, když jim mléka ubývalo. Prášek z listu a semene chválil se proti píchání neb klání v bocích. — Ocet s kořenem vařený v ústech držán sloužil proti bolení zubů. —

Mladé listy dolní (kořenové), trnitého okraje zbavené, tu a onde místo salátu jedí, chutnají skoro jako artyčok. —

## Oves.

Avena. Hafer.

Oves setý (oves pospolitý, oves obyčejný. *Avena sativa*. Hafer). Osa klásku holá. Klásek namnoze 2květý, pluchy v plévách ukryté, lysé, bezosinné neb dolejší s osinou slabě kolínkatou. Obilka k pluše přirostlá. Lata všestranně rozevřená. Bylina jednoletá  $\frac{2}{3}$ —1 m. Kvete v červenci a srpnu. Seje se a zdivočuje.

Setím na role hubená, na kterých lepší obilí se nedaří, proměnil se v rozličné odrody. Všeobecně se pěstuje oves obyčejný, s latou všestranně rozevřenou, řídkěji *oves smeták* (*avena orientalis*) s latou staženou, jednostrannou. Oba přivykají nejrozdílnějšímu podnebí a spokojí se i špatnou půdou.

V lékařství upotřebuje se krup ovesných k obměkčujícím obkladům; odvaru z nich ke kloktadlu při nemocech ústních a krčních, i též ke klystérům.

Oves hlavně slouží pící neb obrokem koňům za potravu, avšak často i místo žita neb pšenice také chudým obyvatelům hor. Kroupy ovesné a z nich uvařená kaše (kyselo) jsou jídla dobrá a potravná. Z ovsa může se kořalka páliť i pivo připravovati. V Rusku dělají z něho „kvas“, vůbec oblíbený nápoj. — Sláma ovesná potřebuje se v domácím a polním hospodářství, tak jako sláma jiného obilí.

## Ožanka.

Teucrium. Gamander.

Ožanka čpavá (Ožanka česneková, planý česnek. *Teucrium scordium*. Lachenknoblauch, Gamander). Oddenek daleko plazivý, výběžkatý. Lodyhy bylinné, huňaté. Listy podlouhlé neb podlouhlo-kopinaté, přisedlé, hrubě zubaté. Lichopřesleny všecky oddálené. Bylina mnoholetá 15 až 45 cm. Kvete v červenci a srpnu. Roste podle rybníků, na bažinných příkopech a lukách.

Nať třena zapáchá česnekem a má chuť hořkou a potřebovala se již za starodávna jako léku protihnilobního a pot zbuzujícího proti zlým horečkám, moru i proti hlistům, zvláště však zevně po 20—40 grm. v nálevu s vodou, octem neb vínem, k umývání, napaření, kloktání a vystřikování při nečistých, snětivých vředech, zastaralých ranách a záškrtech. Nyní přišla v zapomenutí. — Nať možno barvití na zeleno.



Obr. 81. Ožanka čpavá.



**Pelyněk.***Artemisia. Wermuth.*

a) *Pelyněk pravý* (Pelyněk, peluň, pelynek, peluňka, pelynka, polyněk, polýnek. *Artemisia absinthium*). Listy hedvábité šedo- neb žlutavo-plstnaté, 2—3krát peřenodílné, hoření 3dílné neb celé, ústů kopinatých a tupoukých. Úbory laty skoro kulaté a níci. Květy světle-žluté. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m.



Obr. 82. Pelyněk pravý.

Kvete v červenci a srpnu. Roste na stráních skalnatých, na návsích, cestách, místech neúrodných, výslunných, ve všech krajích. Nať zapáchá silně a chutná hořce. Od starých věků velmi vážená bylina, žaludek posilující, hlisty vypuzující, na moč pudící a proti hnilotě účinkující. Až posud je oblíbená, zvláště při slabém zažívání, kyselině žaludeční zádušných, při zašlemování zažívadel a hlistech, vodnatelnosti, žloutenici, nadýmání a k zotavení po zimnici střídavé.

V lékárnách se prodává jak bylina, tak i z ní připravený extrakt, etherický olej a tinktura. Od byliny se buď spaří 10—20 grm. na 200—270 grm. vody, nebo i zvaří, když se přeje míti více hořkosti nežli etherického oleje. Nálevu neb odvaru takového užívá se za 3 hodiny 1—2 lžice, na příklad při vodnatelnosti, nezáživnosti, při bolestech žaludku, křečích a vrhnutí. Místo toho může se užiti denně extraktu 1 grm., neb 15—20 kapek tinktury nebo i 1—4 kapky etherického oleje. — Pytlíček se suchou bylinou, smíšenou buď melisou neb mátou, denně kolínskou vodičkou

postříkán a na žaludku nosen, chváří se při slabém zažívání, nechuti k jídlu a tlačení žaludku. — Spařená bylina s přísadou lihu dává se za obkladek při zhmožděninách, nárazech, modřinách, podlitinách krve, vymknutí z kloubů a t. d. — Pro lékárnou sbírá se v červnu, červenci a srpnu. —

b) *Pelyněk černobyl* (černobýl, černobejl. *Artemisia vulgaris*. Beyfuss). Listy na líci lysé, vezpod běloplstnaté, úkrojků kopinatých, celých neb zastřižovaných. Zákrov běloplstnatý. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kvete v srpnu a září. Roste všude kolem cest, plotů, křovin a palouků. — Květy prsty rozemnuté příjemně voní a proto se dávaly dříve květoucí vršky místo koření do hus k pečení přichystaných. Nyní sotva kde to činí, tak jako, že i černobýl z lé-

kařství skoro již vymizel, kdežto byl před lety co chvalný prostředek zvláště proti hysterii a padúcině oblíben. Na počátku tohoto století používalo se však znovu kořene černobýlu v padúcině, kde v některých případech také prý se osvědčil. Prášku z kořene užívá se 2—3 grm. po 3 dní večer před spaním, smíšeného s teplým pivem. Místo toho může se 30 grm. zeleniny, zvláště květoucích vršků, třebaš usušených zvařiti a jako thé během jednoho dne vypíti. — Nať se sbírá v srpnu, kořen v září a říjnu.

c) *Pelyněk dřevinka* (Brotan, boží dřevec, boží dřevce, dřevinka. *Artemisia abrotanum*. Stabwurz). Kvete v srpnu a září. Roste na pahrbcích jižné Evropy, u nás v zahradách obyčejný a oblíbený. Celý voní příjemně a chutná kořením. Nať se užívala dříve v lékařství proti nezáživnosti, snědku, nadýmání, lepkosti neb zašlemování střev, zadrželé čmýře, blednici a hysterii a j. — Zevně se užívalo nati na obklady rozhánějící; odvaru též ke klystéru. — K nálevu se bralo 10 grm. na 140—200 grm. vody nebo vína, a užívalo se za 2—3 hodiny 2 lžice.

146.

## Petržel.

*Petroselinum*. *Petersilie*.

Petržel kuchyňská. (Petružel, petružka, apich zahradní. *Petroselinum sativum*. *Petersilie*). Lodyha oblá, pruhovaná. Listy dolní 2—3krát zpeřenošedné, úkrojků klínovitých, peřenoklaných, s úšty kopinatými, hoření 3četné. Okolík konečný, dlouze stopkatý. Obal sporný neb žádný, lístky obalíčků hojné, nitovité. Plátky nazelenale žluté. Bylina dvouletá  $\frac{2}{3}$ —1 m. Kvete v červnu a červenci. Pěstuje se ve vinicích a jinde zdivočelá.

Kořen pudí značně na moč a proto se užívá při vodnatelnosti vůbec. V lékárnách jsou: kořen, nať, semeno a voda petrželová. Voda se přidává po 30—60 grm. k jiným nálevům neb odvarům proti vodnatelnosti, ostatní slouží k odvaru po 10 grm. na 200 grm. vody. — Pro lékárně se sbírá kořen v březnu a dubnu, semena v září a říjnu. — Petrželový list i kořen v kuchyních je vůbec znám a upotřebován.


147.

## Pilát.

*Anchusa*. *Ochsenszunge*.

Pilát lékařský (volový jazyk. *Anchusa officinalis*. *Ochsenszunge*). Bylina hustě srstnatá. Listy podlouhlé až čárkovito-kopinaté, hoření poloobjímavé. Kališní úšty kopinaté. Hrboulky koruny nachově fialové, modré neb bílé aksamitnatě chlupaté. Bylina dvou- neb víceletá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kvete v květnu až do podzima. Roste na suchých lukách, porůčích, mezích a cestách.

Celá rostlina sliznatá druhdy v lékařství se potřebovala. Kořen s vínem vařený radil se proti žloutenici, nemocem ledvin a sleziny; odvar listů s vínem k zastavení běhavky. Jak přemnohé jiné rostliny tak i pilát účinkoval mocně proti uštknutí hadem; při tom Dioscorides praví: „Když člověk kořen nebo listy kouše a hadu do krku plivne, musí had pojíti.“ — Pilát také proti vyrážkám kožním se chválil, nyní však málo kdo jej vyhledává.



Obr. 83.

Pilát lékařský.

a říjnu. — Pýr potřebuje se k drhnutí nádob a je pod jménem „věchtoví“ znám.

148.

## P ý r.

*Triticum. Queckenweizen.*

Pýr plazivý (*Triticum* neb *Agropyrum repens*. Quecke. Graswurzeln). Oddenek plazivý. Listy na lici draslavé a roztroušeně chlupaté. Osa klásku nazpět drsná. Pluchy bezosinné neb s osinou sotva delší než plucha. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v červnu a červenci. Roste na suchých, pustých místech, pahorkách, křovištích a cestách.

Kořene rozkrájeného a extraktu až posud se v lékařství užívá při nemocech a horečkách zánětných, katarrech, žaludečních a rheumatických zimnicích, zácpě útrov vnitřních, nemocech kožních a j. Odvaru se užívá 40—70 grm. na 200 grm. vody; extraktu 20—40 grm. za den.

— Pro lékárnu sbírá se kořen v březnu, dubnu

149.

## Pivoňka.

*Paeonia. Pfingstrose.*

Pivoňka lékařská (pivoňková růže. *Paeonia officinalis*. Paeonie, Pfingstrose, Gichtrose). Lodyha přímá 30—60 cm. vysoká, jednoduchá neb málovětevnatá. Listy dlouhořapičné, 2—3krát trojmo sekané. Květy velké, červené, bílé nebo i strakaté. Bylina mnoholetá, v našich zahradách vůbec známá, buď planá nebo plná; kvete v květnu a červnu.

Kořen je chuti ostré, svráskující, trochu zasládlé, vůně kořeně a čpavé. Dříve byl v lékařství užíván, vyhrabával se na jaře a celý neoloupaný a nerozkrájený se usušil, aby částky těkavé z něho neodprchly. Odporučoval se proti padúcnici, rozličným křečím, obrlení, hysterii a jiným nemocem od podráždění soustavy nervové pocházejícím, dále proti zadržetí čmýry, bolestem při kamenu

močovém, pálení moče, zimnici studené, též dětem proti kašli, cukání a jiným křečím.

Prášek kořene dával se 2—3 grm. buď pro sebe nebo v lektvaři. Též šťáva z čerstvého kořene vínem vytažena a cukrem oslazena po lžičkách se užívala.

Květy mají chuť a vůni kořenu podobnou, avšak slabší. Přípravoval se z nich syrup a voda, jichž se užívalo v stejných nemocech jako kořene.

Semena jsou bílá, zasládlá a nevonná; odporučela se proti podobným nemocem, jako kořen a květ; podávala se v prášku po 1—1½ grm., ve svařenině po 1½—7 grm. — Nyní přišla pivoňka v lékařství skoro úplně k zapomenutí, od lidu však často bývá upotřebována. — Pro lékárnu však až posud sbírá se kořen v březnu a dubnu. —

Čerstvý kořen rozdrcen a vodou promýván dává škrob bílý velmi užitečný; čerstvý je chuti ostré a stahující, usušen pozbývá však těchto vlastností. — Voda s květy vařená zčervená a barví všechny tkaniny na červeno, vlněné nejtmavěji. S octem močené nabývají silnější červenosti; kamencem napájené plátno a bavlna ještě krásněji zčervenají. Vismutem močené sukno a bavlna zbarví se jimi pomerančově, avšak nestále. — Pivoňka hlízami očka majícími snadno se rozmnožuje jako brambory. — Mongolům slouží hlízy pivoňky bělokvěté, v polévce zavařené za potravu; též semena na kaši roztlučená ku thé přidávají. —

150.

## Plamének.

*Clematis. Waldrebe.*

a) *Plamének přímý* (Barvínek, plamének, plamýnek, pryskýřník. *Clematis erecta. Aufrechte Waldrebe*). Lodyha bylinná, přímá a jemně rýhovaná. Listy nejvíce 7-četně zpeřené; lístků vejčitých, srdčito-vejčitých až kopinatých, celokrajných. Lata konečná. Lístky kališní vně na kraji plstnaté, ostatně lysé, bílé. Ovásek plodní 3krát delší nežky. Bylina mnoholetá 1—1½ m. Kvete v červnu a červenci. Roste na kopcích suchopárných výslunných, keřnatých stráních, ve světlých hájích a pasekách. V okolí pražském, v Podbabě, u Karlova Týna na vysoké hoře, na Doutnáci, v polabské nížině, v kraji jičínském, v okrese teplicko-zateckém a j.

Částky užitečné jsou listy a květy. Listy čerstvé na jazyku a v hrdle silně pálejí, déle v ústech držení jazyk zčervenají, zpryskají a pak zvrhují. Taktéž činí, přiloží-li se vně na kůži rozmačkané. Listy mají chuť do kysela zasládlou, zvolna svraskující a trochu palčivou. Květy kousány způsobují na jazyku a částkách blízkých pálení dlouho trvajcí. Listy sbírají se dříve než poupata se rozvíjí. Plamének přímý přišel v novějším čase téměř k zapomenutí, dříve však byl co lék velmi oblíben, zvláště proti dlouhotrvale

bolesti hlavy, proti příjici, zimnici čtvrtodenní, svrabu, zlým vředům, divokému masu (plíny, vojanské maso), které zžírá neb leptá, vředy čistí, talov opravuje a v dobrý hnis proměňuje a takto vředy hojí.



Obr. 84. Plamének přímý.

na hřbet ruky položená vytahuje pryskyře a dávala se proti bolesti zubů. Listy rozmačkané na kůži přiložené zpryskují ji. Staří také dělali olej z listů, močice je v oleji olivovém, a užívali ho v klistérech proti bolení kyčlí nebo jako masť v téže nemoci a v obtížném močení. —

b) *Plamének plotní*. Plamýnek celolistý, barvínek. (*Clematis vitalba*, Gemeine Waldrebe.) Kmen dřevnatý, opletavý, hluboce brázdovaný. Listy 5—7 čtné; lístků srdčitých nebo vejčitých, celokrajných neb hrubě až laločnatě vroubkovaných. Květenství konečné; lístky kališní obak plstnaté, vonné, vně bílé; vnitř žlutavo-bílé. Ovásek plodní mnohokrát delší nežky. Keř 2—4 m. Kveté v červenci a srpnu. Roste sem tam v lesích a plotech na př. u Vajačovic v Chrudimsku, blíž rakouských hranic u linecké dráhy, též pěstovaný a zdivočelý.

Plamének plotní jest povahy vesměs podobné jako u plaménka přímého, avšak mnohem mocnější. Chuť všech částek jest ostrá, palčivá, jazyk a kůži zpruzující. Suché jsou mnohem mírnější. —

Suchých listů zpařuje se 10 grm. s dostatečnou vodou v zavřené nádobce až do 400 grm. procezeniny; poněáhla může se vystoupiti až na 15 grm. listů. Květu se dává 5 grm. na 400 grm. zcezeniny. Obojich se užívá 2-3krát za den po půl kávového šálku. Z čerstvé natí může se i výtah neb extrakt učiniti a od něho 7—20 ctgrm. denně užiti. Prášek ze 4 ctgrm. extraktu a 70 ctgr. cukru může se třikrát za den nemocnému podávati.

Těž prášku ze suchých listů utřeného může se užívati a sice 20 ctgr. se 40 ctgrm. cukru dvakrát neb třikrát za 24 hodin. Prášek na vředy nasypan působuje z počátku silné pálení; proto se radí, aby prvněkrát málo se sypalo, dle toho jak nemocný to snese. — Vnitřní kúra

Vychvalován byl při těchže nemocech, jež byly u předešlého podotknuty, v dávkách stejně velkých. — Zvláště byl doporučen proti zimnici čtvrtodenní, žloutenici, krticím, příjici a zevně proti vředům. Dle Traga účinkuje i kořen ve víně vařený co lék počistující při vodnatelnosti. Ve Francii hojí práškem ze suché nati připraveným hříběcí koňů, oslů a mezků, kteří se nutí, aby prášek do nosu vtáhli. — Ze šlahounů tam zhotovují na některých místech provazy a koše.

Plamének plotní hodí se dobře v zahradách k opletení besídek a loubí, neb se rozmnožuje snadno a rychle roste. Dříví prý jest vonné a slouží k vykládanému dílu. Listy a větve mohou se v barvířství potřebovati a z osin semenových možno i dobrý papír zhotoviti.

151.

### Plavuň.

*Lycopodium. Bärlapp.*

Plavuň obecná (Plavuň vidlačka, vidlák, špárek, čertův spár •čili čpár, vlačeha, sv. Jana pás, medvědí lapa, moří noha, jelení



Obr. 85. Plavuň obecná.

skok, jelení růžek. *Lycopodium clavatum*. Bärlapp). Listy čárkovité, v dlouhou, bledou vláskovitou špičku vyběhající a celokrajné. Klasy na konci dlouhé, roztroušeně drobně listnaté, často vidličnaté stopky

jednotlivé neb častěji 2—5. — Mnoholetá bylina. Kvete v červenci a srpnu. Roste v lesích horních. Semena se doporučují při rozličných nemocech močidel, zejména při zástavě moče, křečovitém a bolestném močení, řezavce a křečích měchýře. — Práškem ze semene zasypávají zpružená místa zvláště dětem, úročky, opary neb chrasty tvářní, rozpraskané bradavky při kojení a t. d. — Obyčejně se užívá prášku vnitř se syrobem eibišovým a podává se dětem po 70 ctgr. — 1 grm. 2—3krát za den; vzrostlým jednou tolik. — Pro lékárnou sbírá se semeno v srpnu. —

Semeno je mastné a nedá se vodou smíchat; snadno chytne a hoří, proto se potřebuje v ohňostrojství; v silozpytu slouží k dělení obrazů zvukových.

152.

### Plicník.

*Pulmonaria Lungenkraut.*

Plicník obecný (plicník lékařský, hvězdoš. *Pulmonaria officinalis*. *Lungenkraut*). Lodyha srstnatá, se vtroušenými žlaznatými chlupy. Listy postranních výhonků



Obr. 86. Plicník obecný.

v úzkokřídly dlouhý řapík súžené, přišpicatěné, dolní srdčito-vejčité, vnitřní eliptické neb eliptično-kopinaté; lodyžní velmi málo sbíhavé, dolejší kopistovitě ku zpodu súžené. Koruny nejprv červené, pak modrofialové, zřídka bílé. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kvete v dubnu a květnu. Roste ve vlhkých, stinných lesích.

Listy sbírají se v dubnu a květnu pro lékárnou, ačkoliv po nich malá poptávka jest, lid však obecný posud si jich váží a užívá jich jako thé, zvláště při nemocech plicních a prsních. —

153.

### Podběl.

*Tussilago Huflattich.*

Podběl obecný (devěsíl, devěsíl, koňské kopyto, podkovka. *Tussilago farfara*. *Huflattich*, *Huflattig*). Listy přízemní, po květech se vyvinující, srdčito-okrouhlé, úhlatě zubaté, vezpod šedoplstnaté, posléz trochu olýsalé; postranní nervy na zpodu listů substancí


listovou obroubené. Květy žluté. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kveté v březnu a dubnu. Roste v příkopech, na rolích, cestách a u potoků. — Listy, obsahující sliz, tříslovinu a trochu hořké látky, byly již od nejstarších dob užívány proti nemocem prsním, souchotinám, počasným kašlím, dychavičnosti a podobným, též proti krticím na krku a jiným krtičnatým vyrážkám. Listy, které až posud v lékárnách jsou, užívají se jako thé v odvaru 20 až 40 grm. na 200—300 grm. vody, s přísadou osladiče, eibiše a j. — Pro lékárnou sbírají se květy v dubnu, nať v květnu a červnu.

154.

### Podražec.

*Aristolochia. Osterluzei.*

Podražec obecný (podražec, podražec dlouhý, kokorňák, vlkové jablko, hořký traňk. *Aristolochia clematitis*. Gemeine Osterluzei). Lodyha přímá, jednoduchá. Listy řapikaté, okrouhlé neb vejčité 3hranné a srdčité, tupé. Květy po 2—6 úžlabní, světle žluté. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kveté v květnu a červnu. Roste na vinicích, mezích, březích a v plotech. — Upotřebuje se nať a kořen. Nať čerstvá mnutá zapáchá a jest chuti hořké, protivné a prudké. Kořen čerstvý, zápachu jest kořenného dosti líbezného, chuti zaslizlé, kořenné, ostré a zahořklé. Sušením vlastnosti tyto se nemění. Dříve se chválil proti dnám a blednici. Rusové svařené byliny proti všelijakým bolestem údů potřebují, a plody fíku podobné surové proti zimnici střídavé za lék vyhlašují. —



Obr. 87. Podběl obecný.

155.


### Posed.

*Bryonia. Zaunrube.*

Posed černý (*Bryonia alba*. Zaunrube, Gichtrube). Listy srdčité dlanitě 5laločné, laloky ostře chobotnato-zubaté, úponky namnoze jednoduché. Vrcholky samčí v dolejších úžlabích listových, dlouze stopkaté samičí v úžlabích hořejších, zdělí neb delší řapíka. Koruna běložlutavá, květu semenikového zdělí kalicha. Blizny lysé. Plody černé. Bylina mnoholetá 1—2 m. Kveté v červnu až do září. Roste



v plotech a křovištích. Bambulatý kořen má chuť ostrou a hořkou, kterou však vařením pozbývá; čerstvý kořen způsobí vrhnutí, závratě a jiné povážlivé příznaky. Za starých časů byl v lékařství oblíben, na jaře před květem byliny sbírán, na koláčky rozkrájen, nití protáhnut a sušen, pak v odvaru neb prášku předpisován, proti padůcnici, ochromeninám, vodnatelnosti, dýchavičnosti, pakostnici, šlelosti; zevně na zhmožděnině, otoky a nádory. — Od suchého kořene užívá se 1—3 gramy jednou neb dvakrát za den. —



Obr. 88. Podražec obecný.

156.

### Potočnice.

*Nasturtium. Brunnenkresse.*

Potočnice lékařská (Řeřicha potoční, rukev řeřicha. *Nasturtium officinale*).

*Brunnenkresse, Wasserkresse*). Lodyha kořenující, dutá, hranatě rýhovaná. Listy zpeřené, 1—7jařmé; lístky celokrajné neb vejčito-podlouhlé, přisedlé, konečný větší, často srdčitý. Plátky bílé, 2krát delší kalicha; prašníky žluté. Šesule namnoze srpovitě ohnuté, na stopkách rovnovážných neb sehnutých as stejně dlouhých. Chuť řeřichovitá. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v květnu, červnu a červenci. Roste ve vodě v pramenech, potocích, příkopech a podle rybníků. — V některých krajinách jí se řeřicha potoční místo salátu. Ku konci května a na začátku června se vytlačuje z čerstvé natě a listů šťáva, která za lék slouží, zvláště proti kurdějím, krticím a nemocem ledvin, jelikož na moč žene. —

157.


### Přeslička.

*Equisetum. Schachtelhalm.*

a) *Přeslička polní* (přeslice, přeslička, skřib. *Equisetum arvense*. *Kannenkraut, Schafthalm*). Jarní lodyhy žlutavé neb pletní, nerýhované, 15 cm. vysoké, jich pošvy kornoutkovité s 9—12 kopinatými

zuby. Lodyhy letní 9—12žebřé,  $\frac{1}{3}$ —1 m. vysoké, zelené, s větvemi 4—5hrannými, jednoduchými neb opět rozvětvenými; zuby jich pošev krátce kopinaté a zelené. Bylina mnoholetá. Kvete v březnu a dubnu. Roste na rolích, paševinách, písčících a v lesích.

Přeslička s vínem neb vodou vařená, voda z ní pálená nebo i šťáva z ní vymačkaná užívala se za dřívějších časů proti chrlení krve, zlaté žíle, úplavici červené, krvotoku, přílišné čmýře, močení krve, vůbec k zastavení každého krvácení. Nať i s kořenem odporučovala se proti obtížnému kašli. Nať zelená mírně žene na moč a užívala se též proti kamenu. — Šťáva z nati natírala se na nos neb se šňupala při krvácení z nosu. Roztlučená nať se šťávou se přikládala na krvácející rány. Plátěné šátky v pálené vodě přesličkové smočené, dávaly se na růži neb oheň svatý a na horké nádory rozličného druhu. Na rány se sypal též prášek z usušené a roztlučené nati. Podobným způsobem užívalo se též jiných druhů přesliček, ku kterým patří na př. *b) Přeslička bahenní* (Eq. palustre) na bahnivých lukách, v příkopech rostoucí. *c) Přeslička lesní* (Eq. silvaticum) v stinných trochu vlhkých lesích. *d) Přeslička mokřadní*



Obr. 89. Posed černý.


(močální. Eq. limosum) na lesních mokřadech, březích řek a rybníků. — Přesličkou drhne se nádobí cínové a měděné. —

## P r h a.

Arnica. Wohlverlei.

Prha chlumní (Prha, šlakové koření, anjelský traňk, Arnika. Arnica montana). Lodyha žláznato-pýřitá. Listy vstřičné, přízemní v rozetce, podlouhle opakvejité, lodyžní podlouhlo-kopinaté, toliko v 1—2 párech. Koruny velkých úborů pomorančové. Bylina mnoholetá 15—46 cm. Kvete v červnu až do srpna. Roste na horních a lesních lukách, zvláště v horách Jizerských a Krkonošských, Krušných, Brdských, Šumavských a jich předhořích, jakož i v Česko-Moravské vysočině.

Na těchto místech bývá prha v čas květu od lidu sbírána a ve velkém množství materialistům a lékárníkům zasílána, i pro domácí potřebu uschována. — V lékárnách se prodává květ, listy, kořen, z nich pak připravený extrakt, olej a tinktura. Jak květy tak i kořen obsa-



Obr. 90. Prha chlumní.

hují zvláštní hořkou látku, etherický olej a trpkou tříslovinu. Květu užívá se při nemocech jak náhlých tak i počasných, při nervosní zimnici, hnilé horečce neb zimnici s petečemi a sněti, při tvrdošijné zimnici střídavé, dlouho trvajícím zánětu, bezsilné mrtvici, ochromení údů a močového měchýře a černém oblaku očním. Odvar květů získal si od dávna dobré jméno při vnitřních bolestech a vyprýštěninách, udeřením neb upadnutím povstalých, také při denní mlze neb oslepení osvědčil se nálev květů 2 až 10 grm. na 400 grm. vody, po 3 až 6 dní v šálcích užíván. — Kořen zasluhuje, proto že více tříslovinu obsahuje, přednost při tyfu, běhavce, při průjmu z ochablostí střev povstalého, jakož i při choleře. Někde se radí při květu nálev a při kořenu odvar; nejlíp je oboje nejdříve spařiti a pak trochu povařiti. K nálevu i odvaru bere se 2 až 10 grm. buď květu, buď kořene na 400 grm. vody, od kterého se může za 2—3 hodiny půl šálku píti. — Z květu se vyrábí extrakt a dává se při nemocech počasných, chronickém rheumatismu a jeho následcích, jakož

i při pakostnici 1—1½ grm. za den. — Prášek z roztlučených květů dává se 35—70 ctgr. 3—krát denně, avšak smíšený se syrupem neb medem, proto že sám o sobě v krku škrábe. — Prášek z kořene dává se 70 ctgr. — 1 grm. 3krát i vícekrát za den, zvláště při běhavce v tyfu. — Odvaru arniky, jakož i tinktury buď pouhé neb smíšené s vodou užívá se co nátěru nebo obkladů při poranění, zvláště při zhmožděninách, obraženinách, modřinách a podlitinách krve. — Pro lékárnu sbírá se květoucí nať v červnu, kořen na jaře v březnu a dubnu, pak v srpnu, září a říjnu. —

159.

## P r y š e c.

*Euphorbia. Wolfsmilch.*

a) *Pryšec obecný* (Rupík. *Euphorbia esula. Wolfsmilch*). Šupiny na dolejšku lodyhy za kvetení oprchalé. Listy opak kopinaté neb čárkovito-podlouhlé, ku zpodu klínovitě súžené, na mnoze hrotité,

na nemnohých neplodných větévkách o něco užší. Listy obalu podlouhlé neb vejčito-podlouhlé. Mnoholetá bylina 30—60 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste na mezích, průhonech a cestách.

b) *Pryšec chvojka* (Hadí mléčí, kolovratec cypřišový. *Euphorbia cyparissias*. Wolfsmilch). Šupiny na dolejšku lodyhy za kvetení ještě zachovalé. Listy čárkovité neb čárkovito-klinovité, namnoze bezhrotné, na četných namnoze neplodných větévkách úzce čárkovité a



Obr. 91. Pryšec obecný.



Obr. 92. Proskusník lékařský.

skoro nitkovité. Listy obalu ze širšího zaokrouhleného dolejška čárkovité. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kvete v dubnu a květnu. Roste na písčinách, návrších, podle polí, cest a na suchých paloukách. — Mlékem z přetrhnuté lodyhy prýstícím potírají se a zahání bradavice. Vnitř se neužívá proto, že způsobuje násilné vrhnutí a průjem.

160.


## Proskurník.

*Althea*. — *Eibisch*.

Proskurník lékařský (Eibiš, ibišek, sléz vysoký. *Althea officinalis*. *Eibisch*). Bylina aksamitově plstnatá. Listy vejčité, na zpodu často srdčité, vroubkované, slabě laločnaté. Svazečky hojnokvěté. Kalíšek namnoze 9klaný, ústů kopinatých. Korunybledorůžové. Mnoholetá bylina  $\frac{2}{3}$ —1 m. Kvete v červenci a srpnu. Roste na vlhkých slaných lukách, velmi mnoho se pěstuje; též zdivočelý. —

Nať a kořen až posud je co lék velmi oblíben, slizovitým prvkem zdárně účinkuje na sliznice veškerých ústrojí. Odporučuje

se při katarrech dychadel, chraptivosti, kašli, při řezavce moční a kamene, proti nemocem ústním, hrtanu, žaludku a j. V lékárnách se prodává nať, kořen a prášek z něho i syrup. — K odvaru se běře 10 grm. kořene na 200 grm. vody. Kořen se nemá déle nežli  $\frac{1}{4}$  hodiny vařit, proto že pak odvar chutná nepříjemně a škrábe. Prášku se užívá obyčejně jako spojiva jiných léků k pilulkám. Syrup se přidává po 40—70 grm. k jiným nálevům a odvarům. Nať spařená slouží k obkladům obměkčujícím a klystérům. — Pro lékárnou sbírá se kořen dvouletý v březnu a říjnu, květy v červenci a srpnu. —



Obr. 93. Protěž písečná.

Protěž s vínem vařená jindá se užívala proti úplavici, hlistům, proti zácpě jater, sleziny, ledvin a měchýře. Přišla úplně v zapomenutí. — V zahradách pro okrasu se pěstuje. —

161.

### Protěž.

*Gnaphalium. Strohblume.*

Protěž písečná (smil písečný, plesnivec, radostka. *Gnaphalium arenarium. Strohblume*). Listy jak lodyha běloplstnaté, dolní podlouhlo-opakvejčité, horní čárkovito-kopinaté. Úbory kulatovejčité v latě hustě chocholičnaté. Lístky zákrovu volné, za plodu koncem nazpět ohnuté, lesklé, citronové nebo pomorančové. Bylina mnoholetá 15--30 cm.

Kvete v červenci a srpnu. Roste na písčinách, pastvinách, kopcích, vřesovi-

162.

### Prvosenka.

*Primula. Himmelschlüssel.*

*Prvosenka obecná* neb *petrklič* (podléska, dnavá, šlakovní neb mrtvičná bylina, kropáček, petrův klíč, prvnička, *Primula officinalis. Himmelschlüssel, Petrusschlüssel*). Bylina krátkými a hustými chlupy aksamitnatě pýřitá. Kalichy nadmuté a široce otevřené, se zuby vejčito-kopinatými, špičatými, mnohem delší než tobolek. Okolík obyčejně hojnokvětý. Kraj koruny žluté kratší než trubka, miskovitě vydutý, do  $\frac{2}{3}$  roz. klaný. Bylina mnohotetá 15—30 cm. Kvete v dubnu a květnu. Roste v lesích, křovištích, na lesních a chlumních lukách. —

Květy druhdy v lékařství se potřebovaly, nyní slouží toliko u venkovského lidu co příjemné thé, zvláště proti nemocem prsním, též proti závratí, bolestí hlavy a rozličným bolestným nemocem soustavy nervové. Na některých místech připravují z čerstvých květů májové víno, na způsob jako z květů mařinky vonné. —

163.

### Pšenice.

*Triticum. Weizen.*

Pšenice obecná (*Triticum vulgare. Weizen*). Klas 4stranný. Klásek ponejvíce 4květý. Plévy chruplavkovité, vejčité, uťaté, s zoubkovitým hrotem. Bylina jednoletá neb ozimá. Květe v červnu. Seje se.

Z pšenice připravená škrobovitá mouka, v lékárnách pod jménem „*Amylum tritici pulverisatum*“ přidává se obyčejně ke klystérům, 1—2 kávové lžičky v  $\frac{1}{2}$ —1 koflíku vařící vody, neb s jiným sli-

zovitým, bolest utišujícím odvarem, proti běhánkám, vysilujícím průjmům, úplavicím a zvláště s nimi spojeným nepříjemným nucením na stolici. Také slouží k zasejpaní. V ně velmi zřídka se užívá, nanejvýš jako přísada k jiným lékům proti nemocem prsním. —

Pšenice seje se již od nejdávnějších časů a poskytuje, jak vůbec známo, nejbělejší mouku k rozličnému pečivu; dělá se z ní též škrob; na slad obrácená slouží na pivo a kořalku. Z nezralých zrn připravují někde polévky velmi chutné. Slámu potřebují nejen v hospodářství, ale i v řemesle na slaměné klobouky a jiné věci.



Obr. 94. Prvosienka obecná.

164.

### Ptačí zob.

*Ligustrum. Rainweide.*

Ptačí zob (Ptačízob obecný. *Ligustrum vulgare. Rainweide, Beinhholz*). Listy podlouhle kopinaté neb eliptické, celokrajné, posléz skoro kožovité. Lata kytkovitá, podlouho-vejčitá. Koruny bílé, plody černé. Keř 1—3 m. Květe v červnu a červenci. Roste v hájích, na keřnatých stráních.

Za starých dob. připravoval se z květů odvar neb voda k pití proti chrlení krve, přílišné čmýře a bělotoku. Zevně přikládal se květ v octu močený na čelo proti hlavy bolení. Dřevěný olej, ve kterém květ v láhvi po celé léto na slunci ležel, chválil se k natírání zanícených ran a natírání čela při bolestech hlavy, od horkokrevnosti povstalých. Odvar listů sloužil za kloktadlo proti vředům v ústech. Listí rozmačkané ve způsobu flastru přikládaly se na nežitý, černé neštovice, snět a hlízy.



Obr. 95. Ptačí zob.

Ptačí zob roste v každé i sebe chudší půdě, jest velmi dobrý na živé ploty, udrží list v mírných zimách až do příštího jara a poskytuje plody svými mnohým ptákům potravu.

V zahradách pěstují se odrody pěkné s bobulemi zelenými a bílými.

Dříví jeho tvrdé upotřebují zvláště soustružníci.

165.

### Pupava.

*Carlina. Eberwurz.*

Pupava bílá (*Carlina acaulis. Weisse Eberwurz*). Lodyha namnoze 1-úborná a silně zkrácená, s úborem

u prostřed rozetky přízemních listů přisedlým, zřídka do 30 cm. prodloužená, řídce listnatá s úborem menším. Listy hluboce chobotnato-peřenosečné, mimo to zubaté a ostenaté, všechny řapikaté. Vnější lístky zákrovu listovité, z části delší než úbor, nejvnitřnější bílé. Zákroveček plév 2krát delší než nažka. Bylina mnoholetá. Kvete v červenci a srpnu. Roste na pahrbcích, stráních, mezích, průhonech a pasekách.

Kořen zapáchající a hořce chutnající, před časem byl lékem velmi váženým, nyní toliko dobytku se dává. Usušený a na prášek roztlučený kořen užíval se s vínem proti tasemnici, zácpě sleziny a jater, vodnatelnosti a proti žloutenici, zvláště když byl užíván s jablečnickem, dále proti kamenu, všemu otrávení a moru. Čerstvý nastrouhaný kořen jedl se při zastavené čmýře.

Ocet s kořenem vařený doporučoval se k mytí proti lišejí, strupům, chrastům a jiným kožním vyrážkám. —

## Rdesno.

*Polygonum. Knöterich.*

a) *Hadí kořen* (rdesno, hadí kořen, hadovec, úžovník. *Polygonum bistorta. Natterwurz*). Listy vezpod sivozelené, podlonhle vejčité neb vejčito-kopinaté, dolejší v křídlovitý řapík přikrojené, hořejší přisedlé, trochu srdčité. Botky lysé a nebrvité. Květy bělo-



Obr. 96. Pupava bílá.

růžové. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v červnu a červenci. Roste na tučných, vlhkých lukách, po horách i rovinách.

Kořen velmi svráskavý obsahuje mnoho trísloviny a druhdy se potřeboval co mocný lék naproti běhavkám, počasným krvo- a slizotokům. K odvaru se bralo 5—10 grm. na 200 grm. vody — Též se užíval prášek ze suchého kořene po 14 ctgrm. dvakrát i třikrát denuě. Odvaru se upotřebovalo též k vystříkování, k obměkčujícím obkladům neb záhřivkám, co kloktadla při krvácení dásní, nadeřlosti, ochablosti mandlí a čípku. —

b) *Truskavec* (truskavec větší, štukavec, štukavice, štukavka, štikovec, chrustavec. *Polygonum aviculare. Wegetritt*). Lodyha neoplétavá, položená neb vystoupavá a hladká. Listy vejčité až čárkovito-kopinaté i žebernaté. Botky suchomázdřité, stříbrolesklé, posléz roztrhané. Okvětí hladké. Nažky tříhranné, neleské. Bylina jednoletá 9—46 cm. Kvete od června až do podzimu. Roste na cestách, pastvinách a rolích.

Červené kyselé víno s truskavcem vařené neb s práškem ze semene smíšené užívalo se proti úplavici červené, chrlení krve, bělo- a krvotokům. Odvar z praženého semene chválil se proti kapavce, písku a kamenu močnickému; šťáva z nati proti zimnici; voda proti hlístům. — Zevně přikládala se šťáva na rány, vředy,



přítěle, dále sloužila k zastavení krvácení nosu, hnisotoku ušního, proti vředům v ústech a dásní a t. d. — Nať truskavce dává dobrou píci, zvláště dobytku vepřovému. —

167.

## R d e s t.

Potamogeton. Laichkraut,

Rdest vzplývavý (rdest vodní, brčál. Potamogeton natans. Schwimmendes Saamenkraut, Samkraut). Listy všecky dlouhořapičné, ponořené, úzce kopinaté až podlouhlo-kopinaté, namnoze záhy uhnívající, nejhořejší vždy vzplývající, kožovité. Klas z květů dosti řídkých, 4řadých a nachových. Plody na hřbetě tupé 3—4 mm. Mnoholetá bylina. Kvete v červenci a srpnu. Roste v stojatých i plynoucích vodách. —

Nať usušená a ve víně vařená užívala se proti běhavce a úplavici červené. Octem a olejem usmažená přikládala se vlažná na údy, aby odejmula horkost a ukrotila bolesti při dnách nohou. Listy se pokládaly na horké, shnilé a tekuté vředy, aby je vysušily a zahojily. —

Hovězí dobytek a kozí celou rostlinu rádi žerou a prasata ní mohou se krmiti; ovce však ji nemilují.

Rdest vzplývavý rozmnožuje se velmi rychle, tak že místy i plynoucí vody může v toku jejich zastavovati a v rybnících rybám v plování překážeti. Zde pak možno jej na pole a do zahrad vyvážeti; bývá totiž často celý blátem potažen a pohnojí půdu výborně. K tomu cíli poslouží též ostatní četné druhy rdestů, na př. *rdest prorostlý*, *hřebenitý*, *hustolistý*, *dlouhý*, *špičatolistý* a t. d.

168.

## Řebříček.

Achillea. Schafgarbe.

Řebříček obecný (*Achillea millefolium*. Schafgarbe). Oddenek plazivý. Listy v obrysu kopinaté neb čárkovité, větveno jich bezzubé neb ku konci s jednotlivými zoubky. Květy jazykové rovnovážně odstálé, 2—3krát kratší než zákrov. Úkrojky jazykové krátce kopinaté neb čárkovité. Úbory a květy větší, krajní kor. bílé neb růžové. Bylina dosti lysá neb roztroušeně vlnatá, mnoholetá 30 až 60 cm. Kvete v červenci, srpnu a září. Roste na lukách, pastvinách, cestách a krajů lesních.

Nať a květy velmi prospívají co hořký, kořenný a mírně svíravý lék při počasném krvotoku dělohy, přílišném krvácení zlatých žil, bělotoku, při bolestném, obtížném nebo i přílišném čmýře, při bledniče s nedostatkem čmýry. Jak natě tak i květu běře se k nálevu

5—10 grm. na 200 grm. vody. — Extraktu řebříčkového užívá se 70 ctgrm. až 1 grm. dvakrát za den, buď ve vodě mátové neb jiné rozpuštěného, buď v pilulkách. — Pro lékárnu sbírá se v květnu a červnu. —

169.

## Ř e p í k.

*Agrimonia. Odermennig.*

Řepík lékařský (řepíček, starček. *Agrimonia eupatoria. Odermennig*). Lodyha přibíblá. Listy přetrhovaně lichožpeřené; lístky větší vejčité až podlouhlo-kopinaté, vezpod hustě srstnato - šedoplstnaté se žlázkami málo patrnými. Hrozen dlouhý, dole velmi řídkokvětý. Číška kališní hustě srstnatá, kulato-vrtlkovitá, až skoro k dolejšku hluboce rýhovaná, ostny její hákovité, vnější menší, daleko odstálé. Plátky žluté. Rostlina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m.

Kvete v červnu, červenci a srpnu.

Roste na suchých kopcích, travních, mezích a v křovinách.

Nař květoucí trochu trpká a kořená před časy se potřebovala v lékařství proti nemocem jater a plic, žloutenici, kašli rozličnému a bĕhavce; zevně jako kloktadlo při nemocech úst a krku, jakož i k teplým obkladům a k vymývání ran. — Nyní přišla úplně v zapomenutí. —



Obr. 97. Řebříček obecný.

170.

## R é v a.

*Vitis. Weinrebe.*

Réva vinná (vino, *Vitis vinifera. Weinrebe, Weinstock*). Listy srdčité, 3—5laločné, hrubě zubaté, vezpod huňato-plstnaté, později olysající. Květy žlutavo-zelené. Rostlina mnoholetá. Kvete v červnu. Ve vinicích a při domech pěstovaná.

Štáva z mladých výhonků užívala se dříve proti úplavici červené; štáva z odříznutých na jaře prutů proti kamenu; zevně proti zakalenému zraku, chrastům, lišejí a t. d. Popel z odříznutých prutů a hůh z něho upotřeboval se k zasypání vředů nebo k omývání strupovité a jinak nečisté kůže. Zelené listy se přikládaly na čelo proti hlavy bolení, na zanícené oči a na vředy. Štáva z nezralých bobul se užívala v horečkách pro ochlazení, k posílení žaludku a k povzbuzení chuti k jídlu.

Hrozny vinné jsou ovocem nejlahodnějším a nejzdravějším, též bobule česané a sušené, totiž *hrožinky*. Znamenitější výrobky z révy vinné jsou: víno, líš a ocet; jak v domácnosti užitečné jsou, jest každému dostatečně známo. Z kvasícího mestu (šťávy z bobul vytlačené) odlučuje se také droždí, z něhož se opět připravuje zvláštní pálenka „Cognak“. Dříví a matoliny na uhlí spálené dávají dobrou čern knihtiskařskou a modrou barvu. Z jader se tlačí olej. Matolinami krmí se dobytek vepřový. Víno zanechává v sudech sůl, tak zvaný „vinný kámen“, též v rozličném ohledu užitečný.

171.

### Rojovník.

*Ledum.* — Porst.



Obr. 98. Rojovník bahenní.

Rojovník bahenní (*Ledum palustre*. Sumpfporst). Listy podlouhlé až čárkovito-kopinaté, po kraji široce ohnuté, vezpod jak mladé větévky rezavě vlnatoplstnaté. Květy dlouhostopečné v konečném bohatém chocholíku; stopky žláznaté s plodem převislé. Koruny bílé. Keř  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kveté v květnu a červnu. Roste na rašelinách a v bažinných lesích.

Z mládí zapáchá nař příjemně balsamem, později ošklivě a mámivě, chuti jest hořké a trpké. V lékařství se doporučují listy, zvláště proti kašli dusivému, rheumatismu, pakostnici a počasným kožním vyrážkám. — 10 grm. listů spaří se vodou, mlékem neb syrovátkou na 200 grm.; což se po lžičkách za den využívá. — Nař lze v lékárně dostati a sbírá se v červnu. — Luhem z rojovníka vydělává se nejtenší korduán; silicí z listův vydobytou natírají se juchty, aby příjemnou vůni měly. Květy poskytují včelám dobrou pastvu. —

Nesvědomití sládci dávají do piva rojovník místo chmelu, aby bylo opojnější.

## Rosmarina.

Rosmarinus. Rosmarin.

Rosmarina obecná (Rosmarýn. *Rosmarinus officinalis*. Rosmarin). Keř vždy zelený,  $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  m. vysoký, u nás všude v zahradách pěstovaný pro ratolístky, jež se nosí o svatbách, též do rakve jinochům a dívkám se dávají. Květy má bledě modré nebo bělavé, kvete v březnu až do května.

Listy zapáchají velmi kořeně kafrem, chutnají ostře a hořce, účinkují mocně na soustavu nervovou a dříve se v lékařství doporučovaly vnitř proti slabé paměti, nervosní závratí, mdlobám, křečím, zvláště hysterickým a proti zástavě čmýry; zevně mnohem více proti slabosti zraku, ochromeninám, křivici a podobným nemocem. V lékárně lze dostati listy k lázním a obkladům, masť, olej a lih rozmarinový k natírání proti zhmožděninám, modřinám neb podlitinám krve, nadmutí neb nadýmání břicha a t. d. Pro lékárnou sbírá se květ v květnu a nať v červnu. —


173.

## Rosnička.

*Drosera*. *Sonnenthau*.

a) *Rosnička okrouhlostá* (Rosnatka, rosa slunečná, bylina slunečná. *Drosera rotundifolia*. *Sonnenthau*). Listy skoro okrouhlé, náhle v dlouhý řapík skrojené, rovnovážně rozložené, několikrát kratší stvolu až 10květého. Stvol nahý s konečným lichohroznem, listy s červenými lepkavými žláznatými chlupy. Plátky bílé. Mnoholetá bylina 8 až 20 cm. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste na bařinách, rašelinách, mokřích písčinách. —

b) *Rosnička dlouholistá* (*Drosera longifolia*) a c) *rosnička obvejčitá* (*Drosera obovata*) jsou podobny předešlé, liší se hlavně tím, že mají listy klínovité, v dlouhý řapík poznenáhla súžené, přímo odstálé, jen 2krát kratší stvolu namnoze 4—6květého. Rostou na podobných místech často pohromadě. — Před časy byly rostliny tyto v lékařství velmi váženy a chváleny, zvláště proti kašli, chraptivosti, dušnosti, souchoťinám a při skleslosti sil neb chřadnutí. Novějšího času neužívají se, poněvadž jejich jindy vychválená moc se nepotvrdila, kdežto Arnoldus de Villanora svého času vypravoval, že by člověk ani



Obr. 99.

Rosnička okrouhlostá.

nikterak umřítí nemohl, který by každé ráno květenství této rostliny užíval. Nejspíš jako veliký ctitel rosničky, tak činil s důvěrou sám, avšak předce zemřel. —

174.

## Routa.

Ruta. Raute.

Routa obecná (routa domácí neb zahradní. *Ruta graveolens*. Raute). Listy sivozelené, umáleně 2—3krát peřenodílné, úkrojků klínovito-podlouhlých až čárkovitých. Vrcholík vidličnatý, pak jedno-ramenný. Koruny žluté. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kvete od června do srpna. Roste na stráních, vinicích, kopcích výslunných, suchoparných. —



Obr. 100. Routa obecná.

Nať zapáchá silně a nepříjemně, v dřívějších časech byla v lékařství velmi vážená co lék pot a větry vypuzující, na moč ženočí a křeče utišující. Zvláště doporučovala se proti hysterii a zástavě čmýry, v nálevu 10—20 grm. na 200 grm. vody. — Zevně upotřebovala se proti zlým vředům na obklady, ke kloktadlům, k napáření a vystříkovaní. — Pára z nálevu vpouštěla se do očí, při slabosti zraku, od mnoho čtení povstale.

Listy routové posud v lékárně jsou v zásobě, sbírají se v květnu a červnu. — V starých herbářích je o routě a její báječné moci pojednáno na několika velkých stranách a sám Mathioli psal, že routa skoro proti všem neduhům dobrá jest. —

175.

## Rozchodník.

*Sedum. Fetthenne.*

Rozchodník ostrý (tučný mužík, netřesk nejmenší. *Sedum acre*. Mauerpfeffer). Listy vejčité, na líci ploché, na hřbetě vypouklé, dole uťaté a jen krátce povytažené. Květenství ze 2—3 více květných lichoklasů, květů žlutých skoro přisedlých. Kališní lístky vejčité, na zpodu povytáhlé. Tobolky uvnitř hrbolaté. Semena hladká. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kvete v červnu a červenci. Roste na suchých kopcích, cestách, mezích, zdech a skalách. —

Celá rostlina má chuť ostrou a pevnou; zpruzuje kůži. Štáva z natě a listů, ku konci května neb v červnu vytlačena, užívala se dříve proti padůnci, kurdějím a zimnici studené po 1—2 grm. třikrát za den; usušených listů s natí spaří se též tolik a pije se jako thé. —

Jak čerstvé šťávy, tak i odvaru upotřebuje lid proti rozličným nemocem kožním, popáleninám, kurdějím, zesnětivelým a rakovitým vředům, bradavicím a kuřím očím. —

176.

## Rozrazil.

*Veronica. Ehrenpreis.*

a) *Rozrazil lékařský* (přitržník, tržník, přitržné koření, veronika, čistec, rozrazil a úložník, *Veronica officinalis. Ehrenpreis*). Lodyha položená, kořenující, kolkolem srstnatá až huňatá. Listy vejčité až podlouhlé, drobně pilovité, v krátký řapík skrojené.



Obr. 101. Rozchodník ostrý.

Stopky s tobolkou k ose hroznu přitisklé. Tobolka delší než kalich. Hrozny mnohokvěté, namnoze vstříčné. Koruny světle modré, lilákové neb bílé. Bylina mnoholetá. Kvete v červnu až do srpna. Roste na vřešovištích, v suchých lesích, na pastvinách a suchých lukách.

Nahořklá, přitrpká a kořená nať odporučovala se dříve proti nemocem prsním, proti počasnému kataru plic, dušnosti, souchotinám a proti všem nemocem plic s lepkostí spojeným. K odvaru neb nálevu se bralo 20 grm. na 200 grm. zcezeniny, od které se pilo za tři hodiny půl šálku jako thé. Druhdy se nať potřebovala pod jménem „čaje evropského“ na místo čínského. Sbírá se pro lékárnu v červnu.

b) *Rozrazil potoční* (rozrazilka. *Veronica beccabunga*. Bachbungen, Wasserbungen). Lodyha skoro oblá. Listy vejčité neb podlouhlé, nepravidelně vroubkovano-pilovité až skoro celokrajové, všecky v krátký řapík súžené. Stopky za plodu namnoze zdělí listenů. Tobolka velmi mělce tupě vykrojená, okrouhlá, naduřelá. Koruny modré, žíldka růžové. Hrozny nejčastěji vstříčné, v úžlabích obou vstříčných listů. Bylina mnoholetá 15—46 cm. Kveté v květnu až do srpna. Roste v potocích, příkopech i stojatých vodách.

Listy šťavnaté, slané, zahořklé, pojídá lid v salátu proti kurdějím. —



177.

### R ů ž e.

*Rosa. Rose.*

a) *Růže nízká* (růže plazivá. *Rosa gallica* neb *pumila*.) Ostny jehlicovité, silnější, z nich někdy i přísrpkovité, z velké části žlázonosné, na hořeních větvích husté neb roztroušené nebo žádné. Listy namnoze 2jařmé (1 až 3jařmé); lístky vejčité až podlouhlo-eliptické, namnoze příkožovitě tuhé, tmavozelené, vezpod sivozelené, zubů mělkých, plochých, jichž druhořadé co pouhé žlásky. Palisty na kvetoucích větévkách skoro stejně úzké jak nekvetoucích. Plod

Obr. 102. Rozrazil lékařský.

vejčito-kulovitý. Plátky velké, tmavonachové, pořídka světle růžové neb bílé. Keř. Kmen plazivý, větve  $\frac{1}{3}$ —1 m. vysoké. Kveté v červnu. Roste na okrajích lesních, na mezích, keřnatých stráních. — Listy květu slouží za lék mírně svírající v uálevu po 5—15 grm. co přísada k jiným lékům k užívání, více však jako kloktadlo, na př. při záškrtu, zánětu madlí a j. — Z listů připravuje se voda, med a olej; první dvě se přidávají též zevně k vodičkám na oči, k vyplachování a kloktání úst. Olej růžový nejvíce slouží za voňadlo a jedna kapka stojí 6 krejcarů.

b) *Růže stolistá* (*Rosa centifolia*) všude v zahradách pěstována a každému známa, upotřebuje se týmž způsobem. — Pro lékárnu sbírají se květy v červnu. —

178.

### S a d e c.

*Eupatorium. Wasserdost.*

Sadec konopáč (Sadec konopěvec. Sv. Kunigundy traňk, ranné kořelí. *Eupatorium cannabinum*. Wasserdosten). Listy vstříčné, krátko-

řapíčné, ve 3—5 lístků peřenosečně rozdělené, řídčeji nedělené; lístky vejčito- až prodlouženě kopinaté, hrubě pilovité, vezpod jak lodyha drobně žlázkovité a vonné. Úbory svazčité, v choličnaté latě. Květy brunátné neb bílé, 5—6 v zákrovu. Bylina mnoholetá 1 až 1½ m. Kveté v červenci a srpnu. Roste ve vlhkém křoví, mýtinách a na lesních stráních. Kořen a nať chuti hořké, byly za starých časů ve vážnosti i v lékařství se užívaly, zvláště jako lék krev počišťující a na moč pudící. Odvar konopáče s vínem nebo vodou doporučoval se proti zácpě sleziny a jater, žloutenici, vodnatelnosti, zastavené čmýře, dlouhotrvajícím zimnicím a t. d.

Štáva z čerstvých listů se pila k umoření (červů) hlístů; štávou s octem a soli smíšenou natíralo se tělo při svrabu a chrastech. Konopáč hojil rány, ku kterému cíli se nejen na rány přikládal, ale i v odvaru pil. —



Obr. 103. Sadec konopáč.

179.

## Sedmikráska.

*Bellis. Maaslieb.*

Sedmikráska ozimá (Chudobka, sedmikráska, matečník menší, kakuška, zapomenutka, cikánka. *Bellis perennis*. Gänseblume, Maaslieb). Listy v rozetce kopistovitě, vroubkované. Stvol namnoze bezlistý, lůborný. Květy krajní paprskující, bílé, vně často červené. Bylina mnoholetá 2½—8 cm. Kveté v dubnu až do listopadu. Roste na trávnících, lukách a pastvinách.

Mladé listí jako salát s octem, olejem a soli se jedí, nebo v polévce zavařené doporučují pro lehkou stolicí. Čerstvé rozmačkané listí přikládají se na rány, naběhliny a horké otoky. Kvetoucí nať se upotřebuje k napařeninám proti ochromeným údům, jakož i k mastím a flastrům proti dnám a jiným bolestem v údech. Odvar též ke klystérům slouží při nemocech, zvláště zánětu střev. V zahradách pěstují pro okrasu sedmikrásu plnou. —



180.

**Sevlák.**

Sium. Merk.

Sevlák širolistý (požír. *Sium latifolium*. Merk, Wassermerk.) Oddenek výběžkatý s kořinky nitovitými. Lodyha hranato-rýhovaná. Listy jednou zpeřené, lístky podlouhlo-kopinaté až čárkovito-



Obr. 104. Sevlák širolistý.

kopinaté na dolejšku šikmé, ostrými jemnohrotitými zuby jednoduše pilovité, listů ponořených hřebenitě stříhané neb mnohodílné, s úšty čárkovito-štetinovitými. Okolík zřejmě konečný, dlouhostopečný. Obaly i obalíčky mnoholisté. Plátky bílé. Keř  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Kvete v červenci a srpnu. Roste v stojatých vodách, tůních a příkopech nížin.

Kořen a nať zápachají, nahořkle a ostře chutnají, druhdy v lékařství se potřebovaly. Odvar se

vnitř užíval proti zástavě čmýry a moče, proti vrtošivosti, temnotě zraku a močnickému kamenu. Semeno na prášek ntlučené s červeným kyselým vínem doporučovalo se proti úplavici červené a všem tokům břicha. Pihy a všechny skvrny prý s obličejem zmizí, když se na noc obličej rozmačkanými čerstvými listy nebo šťávou z nich natře, ráno pak ječnými otrubami a vodou omyje.

181.

**Sléz.**

Malva. Malve.

a) *Sléz okrouhlostý* (Sléz zaječí, syrečky. *Malva rotundifolia*. Malve, Kaspappel). Stopky plodní rovnovážně odstalé nebo sehnuté, s kalichem přímým. Lístky kalíško-čárkovito-kopinaté. Květy a plátky dosti malé. Listy okrouhlo-srdčité, mělce laločnaté. Bylina položená, větevnatá. Kališní úšty dlouze zakončité, na kraji ploché, s brvami ku předu namřířenými. Plátky hluboce vykrojené, 2—3krát delší kalicha, bledorůžové. Terč podčnělkový skoro zšíří tvrdek;

tyto hladké, po krajích zobléné, na postranních plochách bez žeber. Bylina dvou- neb mnoholetá. Květe od května až do října. Roste na návších, n silnic, podle cest a zdích.

Květy slezu mají stejný účinek jako proskurník lékařský a také se v těchže nemocech doporučují. Květy však málo kdy samy pro sebe se vaří, obyčejně jako thé ještě s jinými, eibišem, podbělem a j. po 10—20 grm. — Listy k mokrým, obměkčujícím záhřivkám a košičkám. Jak květy tak i listy lze dostati i v lékárně. — Sbírá se v květnu, červnu, červenci a srpnu. —

V zahradách se pěstuje *b) Slez zahradní* neb *římský* (topolovka, topolovka růžová. Malva arborea, Alcea neb althea rosea. Baummalve, Pappelrose, Stockmalve). Krasné červené květy pro lékárn sbírají se i s kalichem i bez kalichu v červenci a srpnu. Užívá se jich jako předešlých. —


182.

### Smetanka.

*Taraxacum. Butterblume.*

Smetanka obecná (Pampeliška, pampališka, pleška obecná. *Taraxacum officinale. Leontodon taraxacum. Löwenzahn, Pfaffenröhrein*). Vnější lístky zákrovu dolů sehnuté neb rovnovážně odstálé. Nažky častěji červené, s ostenci četnými, špičatými. Listy kracovitě protišecné neb stříhaně přenodlné. Bylina mnoholetá 2½—30 cm. Kvete v dubnu, květnu a červnu, pak zas na podzim. Roste na lukách, trávnicích. —

Kořen a nať doporučují se proti zácpě jater, sleziny, žláz okružních a proti rozličným z toho povstávajícím nemocem, jako žloutenici, vodnatelnosti, zádumčivosti, úbytu, zlaté žíle atd. — Na jaře se podává čerstvé šťávy z celé rostliny vymačkané 10 až 20 grm. v hovězí polévce, neb s jinými šťávami. Obyčejně však užívá se odvaru suchého a rozkrájeného kořene po 40—60 grm. na 200—300 grm. vody. V lékárně je též extrakt, kterého se užívá 10—20 grm. za den buď v pilulkách neb rozpuštěného s jinými léky. — Pro lékárn sbírá se kořen v březnu, září a říjnu, v dubnu pak i s natí květoucí. —



Obr. 105. Slez okrouhlolistý.

183.

**Smládník.***Peucedanum. Haarstrang.*

a) *Smládník jelení* (Srník, srní kořen, libeček jelení. *Peucedanum cervaria. Haarstrang, Hirschwurz*). Lodyha oblá, rýhovaná. Listy přízemní 2krát zpeřené; lístky většinou přisedlé, podlouhlo-vejčité,



Obr. 106. Smetanka obecná.

ostře pichlavě pilovité, jen nejdoleji zastříhované. Pochvy velké, nadmuté, hoření skoro bezčepelné. Plátky bílé neb zprvu červenavé. Obalíčky mnoholistečné. Bylina mnoholetá 1—4. Kvete v červenci a srpnu. Roste v suchých světlých lesích, na lesních lukách, stráních.

b) *Smládník alsatský* (smládník obecný, jelení kořen. *Peucedanum alsaticum* neb *officinale*) má květy žluté.

Kořen zapáchá a chutná nepříjemně, tak též i nať; druhdy se potřebovaly v lékařství. Štávu z nati s vejcem užívají někde proti kašli, nevolnému neb obtížnému dýchání, větrům a hrýzení v břiše, nadeřelé slezině, křečím, bolestem v slezině


a měchýři. Místo štávy může se užívati odvar z kořene, který prý ale je o něco slabší. — Štávu z nati, smíšenou s růžovým olejem a octem natírají na tělo proti bolestem hlavy, závratí, padúcnici, hysterickým a jiným křečím, spanlivosti. Štávu s růžovým olejem vkládají tepiou k utišení bolestí do ucha a kotlavých zubů. — Kořen upražený a roztlučený sypají na staré, nečisté, hnisající vředy atd. — Posud se užívá ještě ve zvěrolékařství. —

184.

**Sporýš.***Verbena. Eisenkraut.*

Sporýš lékařský (železník. *Verbena officinalis. Eisenkraut, Eisenhart*). Lodyha 4-hranná. Listy prostřední k dolejšku klínovité,

3-klané s velkým středním ústem, tupě stříhano-pilovité, hořejší nedělené, přisedlé. Klasy latnatě sestavené. Koruny bledolilákové. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kvete v červnu až do září. Roste na návších, u silnic a cest, příkopů. Květučí nať byla druhdy v lé-



Obr. 107. Smlánek jelení.

kařství vážena a doporučovala se v nálevu jako thé proti katarům plicním, chrlení krve, souchotinám, hostci kloubnímu a pakostnici, proti nemocem soustavy nervové atd. Zkrátka byl to lék pro všechny nemoci, který však z lékařství úplně zmizel a jedině na některých místech v domácnosti posud platnosti má. —

186.

### S r d e ě n í k.

*Leonurus. Herzgespann.*

Srdečník obecný (srdečník. *Leonurus cardiaca. Herzgespann*). Listy řapíkaté, vezpod hustěji než na líci tmavozeleném pýřité, dolní na zpodu srdčité, 5—7-klané, hoření k dolejšku klínovité,

3-klané, nejhořejší též jednoduché pilovité. Koruny malé, růžové. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Kvete v červenci a srpnu. Roste na návších, plotech, u silnic. Nať zapáchá a chutná hořce; jindá se



Obr. 108. Sporýs lékařský.



Obr. 109. Srpek barvířský.

s vínem vařená doporučovala proti třesení a bušení srdce, proti padůcnici a jiným křečím, ochromení údů, zástavě čmýry a moče. Odvar se několik dní pil a spolu i teplý na patřičná místa přikládal.

186.

## S r p e k.

*Serratula*. Scharte.

Srpek barvířský (Srpek, jelení traňk. *Serratula tinctoria*. Scharte, Färberscharte). Lodyha nahoře chocholičnatá neb chocholičnato-latnatá. Listy vejčito-podlouhlé, jemně ostnitě až stříhanozubaté, hoření přisedlé často protisečné, dolní dlouhořapičné. Zámkrovy válcovité. Květy nachově lilákové, zřídka bílé. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Květe v červenci a srpnu. Roste na lesních lukách, ve světlých hájích. — Víno s natí vařené dává se někdy pít lidem, kteří z výše spadli a se pohmoždili. Červené víno s natí

vařené přikládají na fisly a oduřelé žíly kolem řitě, také ním vymývají rány, aby nehnisaly a snadno se zahojily; též připravují z nati fastr neb náplast na průtrže a napuchliny. —

Listí barví pěkně na žluto. —

187.

## Starček.

Senecio. Kreuzkraut.

*Starček obecný* (Lomihnat, přímětné koření menší. Senecio vulgaris. Kreuzkraut). Lysý neb pavučinato-vlnatý. Úkrojky listů vejčité neb podlouhlé. Vnější listky zákrovu velmi krátké, na konci jak znhelně černé, namnoze 10. Nažky spoře chlupaté. Květy žluté, stejné. Bylina jednoletá 1½—30 cm. Květe od dubna až do podzimku. Roste na rolích, záhonech, cestách, rumišťích. —

Vůbec známý je větší, ½—1 m. vysoký  
b) *Starček přímětník* (Přímětník, přímětné koření větší, květ sv. Jakuba. Senecio Jacobaea. St. Jakobsblume), který na suchých lukách, mezích, kopcích a v lesích roste, v červenci a srpnu žlutě květe. —

Obě rostliny chuti nahořklé byly před časy v lékařství vážené, zvláště proti bolení, svírání a křeči v žaludku; obyčejně se pila nať s vodou a vínem svařená. — Roztlučená čerstvá nať s práškem kadidla neb s octem smíšená, přikládala se na všechny bolestné a horké otoky, nádory a napuchliny. —



188.

## Stračka.

Delphinium. Rittersporn.

Stračka polní (Ostrožka polní, svalník královský, kozí bradka, rytířská ostruha. Delphinium consolida. Rittersporn). Listy mnohokřídlé s úkrojky čárkovitými. Plátek 1, vykrojený, 2-křídlý, 1-ostružný. Semeník 1, řídko 2—3. Hrozen chudokvětý; stopky květní nífovité, delší listenu. Květ tmavě modrofialový, zřídka bílý. Měchýřky lysé, náhle v dlouhou čnělku ztenčené. Bylina jednoletá 30—46 cm. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste na rolích mezi osením.

Kořen a nať nemá patrné chuti; semena jsou hořká. U starých byla stračka velmi vážena. Květům připisuje se moc proti kamenu. Květy v růžové vodě močené přikládá lid na zanícené oči.

Nať pudí na moč, rozpouští kámen v měchýři, usnadňuje čmýru a stolicí, vypuzuje hlísty a zahání vši z hlavy; — zvláště

Obr. 110. Starček obecný.

ašak jí bylo přičítáno, že rány hojí. Při tom všem pozorovati sluší, zby vnitř jen v malých dávkách se užívala; před ostatními druhy, vláště před stračkou znamenanou (*Delphinium ajacis*), která v zahradách se pěstuje, náhodou i zdivočelá někde roste a k bylinám jedovatým náleží, sluší se varovati. —

Ovce, kozy a koně žerou stračku polní, skot ale a prasata se jí nedotýkají. — Štáva z květů poskytuje cukrářům barvu zelenou; s kamencem vařena stane se modrou, kterouž se může psáti. —

189.

### Střemcha.

*Padus. Traubenkirsche.*

Střemcha obecná (střemcha, trpka. *Padus vulgaris*, *Prunus padus*. Ahlkirsche, Traubenkirsche). Listy podlouhlo-opakvejčité neb eliptické drobně pilovité, vezpod nasivělé; řapíky se 2 žlázkami. Květy na konci listnaté větve v hroznu prodlouženém, vzpřímeném neb šikmo převislém, po vývinu listů se rozvíjející. Plátky bílé, opakvejčité, zapáchají hořkými mandlemi. Plody zvící hráchu, namnoze černé. Keř často strom 6—12 m. Květe v květnu. Roste ve vlhkých lesích, po-



Obr. 111. Stračka polní.

břežních křovištích, na skalách horských. — Plody neb střemšalky jsou zasládlé, kyselé a hořké, nejedlé, užívaly se proti úplavici. Kůra větví a listy jsou trpké, hořké, ženou na pot a na moč. Kůra se užívala též místo chinu proti zimnici a list co thé proti soucho-  
tinám plicním. — Pro lékárnu sbírá se kůra v březnu. —

Z střemšalek pálí na severu kořalku. Dříví je lehké a dělají se z něho pažby pro ručnice, z větví bičičtě a trubky k dýmčím. Květ prý zahání myši a štěnice. —

190.

### Stulík.

*Nuphar. Nixblume.*

Stulík žlutý (štulík žlutý, lekno žluté, lekuta žlutá, vodní růže žlutá, taška žlutá. *Nuphar luteum*. Gelbe Seerose, gelbe Seeblume). Řapíky listů srdčito-vejčitých 3-hranné. Plátky as 3-krát kratší než kalich. Prašník podlouhle čárkovitý, vícekrát delší než širší. Blizna nálevkovitá, celokrajná neb vykrajovaná, 10—20 paprsečná, s paprsky

plochými, kraje nedosahujícími. Květ žlutý. Mnoholetá bylina. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste ve vodách stojatých, bahnitých, v kalužích a rybnících. V ohledu lékařském srovnávají se jeho účinky s leknínem bělostným, v mnohých případech dávala se mu i přednost, jelikož mnohem více prvku svraskujícího, třísloviny obsahuje. Stulík žlutý doporučuje se v těchže nemocech a v tomtéž způsobu, jak u leknínu bělostném bylo udáno. Listy čerstvé přikládaly se na prsy kojících, k zahánění mléka jakož i na vředy a rány, k jich zahojení. — Též v ohledu řemeslnickém platí vše, co bylo u leknínu bělostného udáno, jedině s podotknutím, že listy a kořen stulíka ještě více třísloviny a kyseliny duběnkové uzavírajíce tím lépe k vydělávání koží se hodí. V některých krajinách dávají listy sušené dobytku vyjma ovce místo píce. Kořen mlékem rozetřený moří šváby a cvrčky. K rozmnožování stulíka žlutého radí někteří, aby zralé plody se sbíraly a do vody uvrhly, kam se chtějí přesaditi, jiní opět zasazují na určitém místě kořeny do mastného bahna, které stále vodou přeplaveno jest. — Na ten způsob rozmnožuje se též leknín bělostný. — Za naší doby však sotva tyto krásné a v řemeslnickém ohledu užitečné rostliny se rozmnoží, neb na rybnících, kde rybářství přednost má, vypleňjí se všechny více méně bující rostliny na př.: rákos, skřípina, orobinec, kosatec, a s nimi i rostliny zplývající. —

191.

### Světlice.

*Carthamus. Saflor.*

Světlice barvířská (šafrán planý. *Carthamus tinctorius*. Saflor, wilder Safran).

Lysá. Listy tuhé, žilnaté, podlouhlo-vejčité, trnitě zubaté. Úbory velké, s květy šefránovými. Nažky bez chmýru. Bylina jednoletá



Obr. 112. Světlice barvířská.



$\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{3}$  m. Kvete v červenci a srpnu. Někde se pěstuje v zahradách. Květy byly druhy v lékařství užívány jako lék počišťující a posud někde suché květy svářejí v polévku pro lehkou stolicí. Stejný účinek má i semeno na prášek roztlučené. — Za naší doby sází se světlice pro ozdobu v zahradách a pro květy, ježto k barvení hedvábí a děláni červeného líčidla slouží.



Obr. 113. Světlík lékařský.

192.

### Světlík.

*Euphrasia. Augentrost.*

Světlík lékařský (ambrožka, potěšení očí. *Euphrasia officinalis. Augentrost*). Lodyha jak listy pýřitá a odstále žláznato-chlupatá. Listy vejčité neb vejčito-podlouhlé, se zuby kratěji brotitými.

Květy v hořejších úžlabích. Koruny hluboce vykrojené neb 2-klané, bíle a žlutě malované s fialovými pruhy. Tobolky podlouhle klínovité. Bylina jednoletá 5—20 cm.

Kvete v červenci a srpnu. Roste na lukách, pastvinách.

Nať zahořklá a zatrpkalá druhy se počítala k lékům očním velmi váženým; nyní se v lékařství zapoměla a pouze u lidu posud odvarem bolavé oči se vymývají. Pro lékárnu sbírá se nať v červenci. —

193.

### Svízel.

*Galium. Klebekraut.*

a) *Svízel obecný* (přítula, deryzka. *Galium aparine. Klebekraut*). Listy po 6—9, široce opakopinaté neb čárkovito-kopinaté. Vrcholky delší podpůrného listů, na konci lodyhy často v jedno květenství splývající. Stopky za plodu rovné, rozevřené. Plody namnoze s hákovitými štětini, zřídka bez štětín. Květy bílé. Bylina jednoletá  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{3}$  m. Kvete od června do září. Roste na polích, v plotech a křovištích.

Štáva z nati druhy se užívala proti vodnatelnosti a voleti; odvar nati proti tuhé stolici a žloutenici. Štáva se kapala do uší k utišení bolesti. Nať s máslem neb sádlem rozetřená natírala se na vole. Listy přikládaly se na rány, k zastavení krve. —

b) *Svízel syřištový* (syřištová bylina. *Galium verum*. Labkraut). Lodyha přiohlá, 4-žebřá, nejdoleji též často 4-stranná, pýřitá neb srstnatá. Listy nejvíce po 8 (6—12) čárkovité, ku konci širší, namnoze silně ohrnuté, ve-zpod pýřím hustším na-šedivěle třpytivé. Úšty korunní s krátkou špičkou. Koruny citronově žluté neb bledožluté, namnoze medově vonné. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$  až 1 m. Kvete v červnu až do podzímku. Roste na suchých lukách, mezích, cestách.

Roztlučené květy přikládali dříve na snět, opáleniny a opařeniny; vkládali je do nosu a jiných otvorů, k zastavení krve; svářeli je ke koupeli dětem proti chřastům a jiným kožním vyrážkám, též umývali tím nohy, unavením se-sláblé, neb na ně přikládali masť z květů svízelo-vých, z bílého vosku a růžového oleje při-pravenou. —

Kořen svízele obecného barví na červeno, kořen syřištového na žluto. Nať květoucí svízele syřištového sráží mléko a proto se potřebuje u připravování sýra. —



Obr. 114. Svízel syřištový.

194.

## S v l a č e c .

*Convolvulus*. Winde.

a) *Svlačec rolní* (svlačec, sladčec. *Convolvulus arvensis*. Ackerwinde). Listy vejčité až čárkovité, dole střelovité neb hrálovité, od květu oddělené. Tobolka 2-chlopná. Koruny bílé neb nárůžovělé. Bylina mnoholetá; lodyhy, několik z jednoho kořene, jsou točivé nebo po zemi plazivé, rozličně dlouhé. Kvete od května po celé leto až do října. Roste na rolich, mezích, cestách a písčinách.

Před časy byl kořen v lékařství co lék počišťující vážen, také nať k tomu cíli byla užívána. Nať třena vydává šťávu mléčnou více méně ostrou, také kořen tak chutná. Dle starých zaceluje nať také

rány a semeno svlačce bylo chváleno proti kapání moče. — Nať je dobrá píse pro ovce. —

ú) *Svlačec větší* (svlačec plotní, opletník, opletník plotní. *Convolvulus sepium*. Zaunwinde). Listy vejčité, srdčito-střelovité s ouškou úhlatě utatými. Květy úžlabní jednotlivé. Listence velké, srdčito-vejčité, pod samým kalichem. Tobolka nepravidelně pukající. Koruny velké, bílé. Mnoholetá bylina. Kvete v červenci, srpnu a září. V křoví porůžněm a potočném, v plotech vlhkých.

Kořen jest maličko prudký a celá rostlina jest naplněná mléčnatou šťávou, která mírně a bez hryzení počišťuje a též při vodnatelnosti dobře působí. Šťavy zhuštěné dávalo se vzrostlým po 1—1½ grm. a dětem po 35—70 ctgr. Též listy rozmačkané a zpařené i sušené a na prášek utlučené se podávaly k počišťování. Před časy připisovali bylině této moc, že kámen v měchýři rozměluje, obrlení a hrbatost léčí. — Listy s olejem na kaši rozetřené a na kůži přiložené rozhánějí prý otoky. —



Obr. 115. Svlačec rolní.

louhlé, drobně vroubkované. Hoření pysk kalicha 3-zubý. Kratší rameno spojidla nerozšířené s malým pytlíčkem. Koruny fialové. Keř 30—60 cm. Květy v červnu a červenci. V zahradách pěstovaná, zřídka zdivočelá.

List má vůni silnou, pronikavou, chuť zahořklou, trpkou, obsahuje silici a tríslovinu a upotřebuje se zvláště proti velkým, tělo vysilujícím potům, které při mořivých zimnicích neb po těžkých nemocech povstávají, též proti bělotoku. Mnohem více však se upotřebuje nálevu co kloktadla proti kurdějím dásní, zábrám, moučnicku, rozličným vředům ústním, ochablému tǐpku, naduření a zánětu mandle atd.

K nálevu se bere 10 grm. listů na 200 grm. vody nebo červeného vína. V lékárně lze dostati též extrakt, vodu a olej šalvějový. — Sbírá se koncem května a v červnu. — List potřebuje se též v kuchyních, za příchut k jídlům. —

195.

### Šalvěj.

*Salvia. Salbei.*

Šalvěj lékařská (Šalvěj obecná. *Salvia officinalis. Salbei*). Lodyha dole dřevnatá, křovitá; větévky a mladé listy šedoplstnaté. Listy pod-

## Š í p a t k a.

*Sagittaria. Pfeilkraut.*

Šípatka vodní (šípěnka obecná, hadí jazyk. *Sagittaria sagittae-folia*. Gemeines Pfeilkraut). Listy dlouhořapíčné, hluboce střelovité, ponořené čárkovité. Přesleny 3-květé na konci stvolu. Plátky útlé, bílé, s nehem načervenalým. Mnoholetá bylina  $\frac{1}{2}$ —1 m. Kvete v červnu, červenci a srpnu. V stojatých vodách, kalužinách nepřilíš hlubokých.

Z kořene může se připravit škrobovitá moučka, která prospívá slabým a krtičnatým dětem, připravená s dobrým mlékem neb hovězí polévkou. Nyní sotva kdo ji bude sám dělati, neb pod jménem Arrow-root je mnohem lepší škrobová moučka k dostání, která se z rozličných rostlin i z brambor vyrábí a do obchodu přichází. — Ostatně zasloužil šípatka vodní, aby pro pěkný květ a zvláštní tvar svých listů byla sázena, zvláště na místech příhodných v libosadech. —

197.

## Š í š v o r e c.

*Acorus. Kalmus.*

Šišvorec obecný. (Puškvorec, prustovec, prstovec. *Acorus calamus*). Listy z rovnovážného oddenku čárkovitomečovitě. Stvol smáčknutý, po jedné straně ostrý, na druhé žlabovitý, mečovitým listenem ukončený. Palice válcovité kuželovité, šikmo stranou odstála. Bylina mnoholetá;  $\frac{1}{2}$ —1 m. Roste všude v bačinách, příkopech a na krajích rybníků. Kvete v červnu a červenci.

Celá bylina, zvláště její kořen jest hořký. Dříve byl šišvorec velmi vážen zvláště pro svůj etherický olej, spojený s ostrou a hořkou látkou, která mocně působí na zažívadla, nyní však od lékařů málo se předpisuje. Užívá se při zašlemování žaludku, nezáživnosti, nadýmání a blednici, dříve se doporučoval i při zimnici střídavé, vodnatelnosti, rheumatismu, křivici, při krticích a kurdějích. — Kořen na kousky rozkrájený a ocukrovaný prodává a jí se u nás jakož i v Indii, kde jim i jídla koření. Tatarové pijíce drží kousek v ústech, aby voda špatná se napravila. V lékárnách je k dostání extrakt, kořen a prášek z něho. S prospěchem dává se co přísada k těžko záživným, nepřijemným lékům jako k železu, chininu a j. — Sbírá se v březnu, dubnu, pak v září a říjnu. —



Obr. 116.

Šalvěj lékařská.

198.

**Š r u c h a.***Portulaca. Portulak.*

Šrucha obecná (Kuří noha, Portulák. *Portulaca oleracea*. Portulak, Burtzel). Lodyha větevnatá, rozprostřená. Listy skoro vstříčné, podlouhle opakvejčité, dužnaté. Květy po 1—5 v svazečkách konečných a vidlových, žluté. Bylina jednoletá 15 až 30 cm. Kveté od července do září. Roste na vzdělávané a pusté půdě, pořídku zdomácnělá.



Obr. 117. Šišvorec obecný.

Šrucha jest chuti trochu slané, jídá se jako salát též v polévkách. Za starých časů se k jídlu doporučoval salát, vařena šrucha nebo i šťáva z čerstvé rostliny proti pálení žáhy, palčivosti moče, horkým nemocem ledvin a měchýře, proti chrlení krve, úplavici červené, krvotoku, zlaté žíle, kapače a hlistům.

Roztlučená nať smíšená s ječnou moukou přikládá se na zanícené oči, na čelo proti hlavy bolení a nepokojnému spaní. Stejný účinek má prý i šťáva z listů vy-mačkaná, do očí vkapaná

neb na čelo natřená, čímž prý i krvácení nosu se zastaví. Šrucha s růžovým medem smíšená přikládala se na prsy naběhlé po porodu a na nohy dnavé. Nať a semena jindá se potřebovala též proti kurdějům. —

199.

**Š ť o v í k.***Rumex. Ampfer.*

Šťovík tupolistý (šťovík koňský, pletich. *Rumex obtusifolius*. Waldampfer, Grindwurz). Větve přímo odstálé. Listy dolejší a prostřední vejčité neb podlouhlé, u zpodu srdčité neb zaokrouhlené. Lichopřesleny dolejší oddálené, listnaté, hořejší bezlisté, přiblížené. Krovky 3-hranně podlouhlé, tupouké, na dolejšku s několika

3-hrannými, někdy jen slabými zuby. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Květy v červenci a srpnu. Roste na lukách, okolo vesnic, na návsi i v huštinách lesních.

Kořen se sbírá v březnu a říjnu, ačkoliv v lékárnách po něm malá poptávka jest. Dříve se odvar kořene užíval jako lék krev čistící a mírně projímající, zvláště při zácpě a žloutenici. Odvarem se omývalo tělo při chrastech, lišěji, svrabu a jiných nemocech kožních. Nyní v lékařství takřka úplně jest zapomenut. —

200.

### Tamaryšek.

*Myricaria. Mirikarie.*

Tamaryšek obecný (Tamaryšk pravý, židovinník tuhý. *Tamarix* neb *Myricaria germanica. Mirikarie, Tamarischken*). Větve prutovité. Listy malé, vřesovité, šedozelené, podlouhle čárkovité, střechovité se kryjící. Květy v konečných, dosti hustých, dlouhých hroznech; plátky růžové, dlouho vytrvalé. Keř 1—2 m. Kvete v červnu. Roste podle potoků i řek.

Odvar z kůry nebo i z plodů doporučoval se k pití proti chrlení krve, přílišné čmýře, zimnici, žloutenici a uštknutí hadem. Odvar listí s vínem užíval se proti oduření sleziny. — Zevně přikládaly se plody na opuchliny a nádory, odvar sloužil k vyplakování úst proti bolení zubů a k sedací lázni k zastavení přílišné čmýry. Malé větvičky v octě vařené přikládaly se na oduřelou slezinu. Popel z dříví tamaryškového zasypal se na hnisající a mokvající vředy, k jich vysušení a zahojení. Luhem tamaryškovým umývala se hlava, aby vši a hnidy pošly. — Tamaryšek potřeboval se za starých časů též v lékařství, nyní přišel však úplně k zapomenutí.

Z větví rovných zhotovují se trubky k dýmčím; kůru možno upotřebiti k vydělávání koží; rozhy listnaté dávají někde do piva místo chmele. —

201.

### Tykev.

*Cucurbita. Kürbis.*

a) *Tykev obecná* (turek. *Cucurbita pepo. Kürbis*). Listy srdčité, mělce uhlaté 5-laločné. Úponky rozvětvené. Plod kulatý neb elipsoidický, hladký. Květy velké, žloutkové. Bylina jednoletá. Kvete od června do září. Pěstuje se.

Semena ze slupek vyloupaná v ječmenové vodě někde vařejí, odvar pak pijí proti nemocem jater a ledvin, jakož i proti všem palčivým nemocem vnitřním. Štáva cukrem oslazená užívá se pro lehkou stolicí a proti kašli. — Dužnina plodu přikládá se na zanícené oči a nohy dnavé, horké nádory a opuchliny, i na čelo při bolestech hlavy. Práškem ze semene zasypají se rány a popelem z kůrky plodu vydobytým sněživé vředy. —

Stejným způsobem upotřebuje se dužniny a semen *b) melounů* (*Cucumis melo. Melone*) a *c) okurek* (*Cucumis sativa. Gurke*). — Tykev obecná čili turek slouží chudšímu lidu rozličně připravená za potravu. K vykrmení vepřového dobytka je velmi prospěšná. —



Obr. 118. Tolita lékařská.

Kořen čerstvý zapáchá silně a nepříjemně, chutná zasládle a potom hořce, působí vrhnutí a průjem, žene na pot a na moč; druhdy se doporučoval proti vodnatelnosti, krticím, zástavě čmýry a jiným nemocem, usušený buď v prášku nebo odvaru po 36 ctgr. až 1 grm. dvakrát neb třikrát za den. —

Melouny se jedí u nás surové s cukrem, v jižních zemích také s pepřem, solí nebo vínem. Z jader melounů jako i turků připravuje se jako z mandlí mléko. — Okurky jak známo slouží za potravu oblíbenou buď surové na salát neb rozličným způsobem nakládané. —

202.

### Tolita.

*Vincetoxicum. Schwalbenwurz.*

Tolita lékařská (vlašťovičník. *Vincetoxicum officinale. Schwalbenwurz. Gottesgabwurz*). Listy vstříčné, zřídka po 3, vejčité neb vejčito-kopinaté, často přisrdčité, zakončité. Latky skoro okolkovitě stažené, dlouze stopkaté, mimoúžlabní vedle listů. Koruny žlutavě nazelenale bílé. Bylina mnoholetá 30—46 cm. Květe v červnu až do září. Roste v lesích, na kamenitých, keřnatých stráních.

203.

### Topol.

*Populus. Pappel.*

*a) Topol balšámový* (*Populus balsamifera. Basampappel*). Větve hnědé, přiblé. Listy vejčité neb eliptické, tupě zubaté, vezpod bělavé se zřetelnou tmavší sítkou žílkovou. Řapíky přiblé, nahoře žlábkovité. Pupeny a mladé listy pryskyřicí lepkavé. Strom kvete v dubnu. Roste v sadech a sází se u silnic, potoků.

Pupeny se sbírají v březnu a dubnu pro lékárnu, kde se z nich připravuje masť. Na některých místech užívá jich lid jak

vnitř tak i zevně proti souchotinám, rheumatismu a pakostnici; někde z nich připravují pomádu na vlasy.

K tomu cíli slouží i pupeny jiných našich topolů na př. *b) topolu černého* (*Populus nigra*), *c) bílého* (*alba*).

Krom jmenovaných všude známa jest u nás *d) osyka* (*populus tremula*). Dříví topolů jest měkké, nehodí se k pálení, tím lépe k řezbářství a na lehká prkna; k stavení se málo kdy potřebuje. Uhlí z osykového dříví zvláště spůsobilé jest k přípravě ručičného prachu, a kůra osyková může se potřebovati k vydělávání kůže. — Pro ozdobu často se topole sázejí. —

204.

## T o t e n.

*Sanquisorba. Wiesenknopf.*

Toten lékařský (*toten, tosten, mateří ličko, krvavé koření. Sanquisorba officinalis. Wiesenknopf*). Listy lichozpeřené, 4—5-jahmé; lístky srdčito-podlouhlé, hrubě vroubkovano-pilovité. Klasy strboulovité, vejčito-kulovité až podlouhlé. Květy tmavě hnědonachové. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v červnu a červenci. Roste na vlhkých lukách.

Toten druhdy se potřeboval v lékařství proti úplavicím, krvotokům, na rány a vředy, na spůsob jako krvavec obecný, (*Poterium sanquisorba*). — Ve zvěrolékařství posud se chválí co lék proti hříběci.

205.

## Třemdava.

*Dictamnus. Diptam.*

Třemdava bílá (*třevdava, třemdala, jesenka. Dictamnus albus. Diptam*). Listy lichozpeřené, 6—3 jahmé; lístky eliptické neb podlouhlé, drobně zubaté, průsvitavě tečkované. Hrozen prodloužený, doleji složitý, žláznatý. Koruny světle růžové, nachově pruhované, zřídka bílé. Bylina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ —1 m. Kvete v květnu a červnu. Roste na keřnatých stráních, v hájích.

Květ a celá nať zapáchá silně, dosti příjemně. Kořen její býval druhdy v lékařství oblíben a doporučován zvláště proti křečím a vodnatelnosti, obyčejně v prášku po 1—2 grm. dvakrát neb třikrát za den. — Nyní po něm se nikdo neptá. — Pro ozdobu v zahradách se pěstuje. —



Obr. 119. Třemdava bílá.



## Třezalka.

*Hypericum. Hartheu.*

a) *Třezalka tečkovaná* (bylina sv. Jana, zvoneček, zvonec, děravec, křížek, krevníček, třezalka. *Hypericum perforatum. Johannis-kraut, Hartheu*). Lodyha dvouhranná. Listy vejčité až podlouhle čárkovité, okrouhlým spodkem přisedlé, průsvítavě po kraji černě tečkované. Kališní lístky kopinaté, špičaté. Koruny zlatožluté.

Bylina mnoholetá 15—60 cm. Květy v červenci a srpnu. Roste na suchých lukách, mezích, kopcích, v lesních mýtinách.

Nať kvetoucí v prstech rozetřená vydává šťávu červenou a zápach pryškyřičný, nepříjemný; taktéž zabarvuje olej olivový s natí svařený. Jinda nať kvetoucí v lékařství se potřebovala jako lék mírně svráskující proti suchotinám, úplavici červené, chrlení krve a zlaté žíle. Zevně se přikládala na rány, spáleniny, opařeniny, které se natíraly též olejem, jež se doporučoval zevně i proti bolestem reumatickým. —

Jí podobná je b) *třezalka čtyrkřídla* (*Hypericum tetrapterum*) podle potoků a příkopů lučních rostoucí, pak c) *třezalka čtyrhnaná* (*Hypericum quadrangulum*), která se nachází v hornatějších krajinách na lukách a okrajů lesních. Obě se sbírají s třezalkou tečkovanou k stejnému účelu.



## Trnka.

*Prunus spinosa. Schlehe.*

Trnka (trn, trnky. *Prunus spinosa*.

Obr. 120. Třezalka tečkovaná. Schlehe, Schlehdorn, Schwarzdorn.) Větévky z mládí pýřité neb plsnaté, v stáří lysé. Listy pilovité, ve spod v úžlabičkách žil vousaté; řapíky listů bezžlázné. Květy ponejvíce jednotlivé, jich stopky nanejvýš 2-krát delší trubky kališní, lysé. Plátky čistě bílé, vejčité, ku krátkému nehtu dole zaokrouhlené. Plod kulatý, přímý, černý, trpký. Keř trnitý 1—2 m. Květy v dubnu a květnu. Roste v křovištích, na krajích lesů, mezích, cestách.

Dříve než list objevuje se na keři květ, který se sbírá pro lékárnu v dubnu za suchého povětrí, když se počíná rozvíjeti; co možná nejrychleji se usuší, aby nezčernal a uschová se v plechových nádobkách. Květy se spařují po 7—10 grm. a pijí jako thé, počí-

šťují mírně a nespůsobí bolení při tom jako na př. listy sennesové. — Poptávka v lékárnách je však nyní velmi slabá. — Listy trnkové někde piji místo čínského thé. — Trpká kůra se jindy užívala proti zimnici střídavé. — Plody neb trnky sušené a vařené jedí se a odporučují proti běhavkám a krvotokům.

Květy se sbírají v dubnu pro lékárnu, kde se pod jménem Flores acaciae prodávají.

Kůra jakož i plody nezralé potřebují se k barvení na černo. Někde připravují z vyzrálých plodů víno. Květy dávají včelám dobrou pastvu. —

208.

## U ž a n k a.

*Cynoglossum. Hundszunge.*

Užanka lékařská (myšinec, psí jazyk. *Cynoglossum officinale. Hundszunge, Venusfinger*). Listy šedopýřité, podlouhlo-kopinaté, dolní kopistovité, hoření poloobjímavé. Tvrdky na ztlustlém kraji hustě, na ploše roztroušeně měkkoostenné, bez uzlin mezi ostny. Koruny špinavě krvavé s hrboulky nachovými. Bylina dvouletá 46 cm. Kvete v červnu a červenci. Roste na pahorkách, cestách, pustých místech.

Za starých časů byla nať, zvláště pak kořen v lékařství odporučován jako lék bolesti a křeče utišující, proti kašli, chrlení krve, běhavce, úplavici, bělotoku atd., zevně na obklady proti nádorům krtičnatým, popáleninám, voleti, uštknutí hadem a pokousání zběsilým psem. — Nyní přišla docela v zapomenutí. —

Nať třená zapáchá myšinou a zapuzuje prý také myši. —

209.

## Vachta.

*Menyanthes. Bitterklee.*

Vachta třílistá (Trojlistník, třílistník, dětel neb jetel vodní, hořký, trojlistný, trojice vodní, trojan vodní. *Menyanthes trifoliata*). Listy 2-řadé, střídavé z plazivého oddenku, trojené, dlouze řapikaté; lístky opakvejitě až podlouhle opakvejitě, vykrajované. Stvol bezlistý s konečným hroznem. Koruny bělavě narůžovělé, prašníky fialové. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kvete



Obr. 121. Užanka lékařská.

v květnu a červnu. Roste na rašelinných lukách, bařinách. Dospělá nať jest velmi hořká, zápachu poněkud protivného, mladá však méně hořká, proto se sbírá, když byla již odkvětla, zvláště v podzimku. Sušená chuti nepozbývá. Semena hořká.

Dle účinku zdá se býti rostlinám hořcovitým, hořepníkům, příslitům, nostřekům a zeměžluči podobná, toliko že hořkost není tak příjemná. Jako jmenované rostliny povzbuzuje zažívání, čistí krev a oběh její urychluje ve všech nemocech zaživadel od slabosti pocházejících, též

hlisty moří, nashromážděnou vodu rozhání a stolici propravuje.

Vachta prospívá v slabosti strojů zaživacích a z ní pocházejícím zasližení, zkyselení a při hlistech. V zapání jater, v hypochondrii a žloutenici. Proti kurdějím zvláště se vychvaluje. Proti počasným vyraženinám, v zlých vředech. V dnách a pakostnici. V zimních studených, střídavých, zvláště v slabosti po nich zůstávající, slizotocích, krvotocích a j. — Vně ve vředech nečistých a ocháblých prospěšná jest.

Štáva vachtová (*Sucus trifolii fibrini*) dělá se vytlačováním z nati čerstvé na jaře, prospívá zvláště proti kurdějím.

— Výtah neb extrakt shotovuje se z nati suché jako hořcový, jest hořký, černohnědý, málo lesklý. — Sušené listy slouží za thé, nebo dávají se na jemný prášek utlučené.

Štáva z čerstvých listů užívá se buď sama o sobě nebo smíšena s jinými štávami na př. řebříčkovou, pleškovou, kerblíkovou a j., též v polévce masité, syrovátce neb ve vodě některé kořenné, aromatické, po 20—40 grm. — Sušené listy užívají se jako thé spařené neb odvařené po 10—20 grm. Ondy podával se z nich prášek po 1—2 grm. se svařeninou jeho nebo v letkvaři s nějakým dobrým syropem nebo i medem proti hlistům. Extrakt po 1—5 grm. ve vodě kořenné, na př. mátové, při špatném zažívání a p., s petrželovým neb jalovcovým thé při vodnatelnosti atd. Také se užiti může v pilulkách. —



Obr. 122. Vachta třilistá.

S prospěchem se dávají listy dobytku špatně zažívajícímu, též ve vodnatelnosti a zácpě jater ovcí. Podává se svařenina ze 40 grm. listů najednou, nebo 15—30 grm. listů na prášek roztlučných, s medem nebo povidly bezovými promíchaných.

Hovězí dobytek pro hořkost tuto rostlinu nerad žere, kozy ji rádi, koně toliko čerstvou, suchotinným ovcím prý jest velmi prospěšna, zajáci ji vyhledávají; včely v květu nacházejí mnoho medu a semena žere drůbež.

V některých zemích, kde není mnoho chmelu, přidávají listy vachty, sbírají je před květením, oddělují od řapíků a lodyh, suší, sváří pak a opěňují a po lžících pak přidávají tolik, aby pivo příjemné hořkosti nabylo.

V Laponsku v čas neúrody suší lodyhy, roztlukou, míchají je s trochem mouky obilné a pekou z toho chleb, který jest ovšem hořký. Z listů vařených a vymačkaných možno barvu pro malíře a barvíře učiniti. Tkaniny vismutem močené zbarví se pěkně na žluto i také na zeleno, že ani octem barva se nezmění. —

Čtyry sta grm. nati vydá 70 grm. popele a tento 35 grm. salajky. Vachta jest k vysušení bahen velmi prospěšná, zláště svými tuhými plazivými lodyhami. Na Islandě všechna bahna jsou ní porostla, takže po nich možno choditi. K tomu cíli prospěšno jest na taková místa z jara sítí semeno, které snadno klíčí, nebo lodyhy asi 2 palce dlouhé s pěkným okem neboli pupenem do trsu rostlin bažinných zastrčiti a pod zem asi na palec hluboko zasaditi, které pak snadno se ujmou a rozmáhají. —

210.

## V i o l k a.

*Viola. Veilchen.*

*a) Viola* neb *Fijalka vonná* (Violka vonná, fiola modrá. *Viola odorata. Blaues Veilchen*). Oddenek s dlouhočlennými, kořenujícími výběžky. Listy okrouhle ledvinkovité až srdčito-vejčité, jemně pýřité. Palisty vejčito-kopinaté, špičaté. Stopky květní as v prostředku se 2 listenci. Přívěsky kališní široké, od stopky volně odstálé. Semeník namnoze hustě pýřitý. Koruny fialové, růžové neb bílé, vonné. Bylina mnoholetá. Kveté v březnu, dubnu a květnu. Roste v křovištích, plotech, na mezích. —

Z květu se připravuje v lékárnách tak zvaný syrop fialkový neb fialový, který se po malých lžičkách dává dětem užívat proti chraptivosti a kašli; také se přidává k jiným mišeninám. — Sbírá se v dubnu i v květnu. —

*b) Viola trojbarevná* neb *maceška* (violka trojice, trojičná bylina, macoška. *Viola tricolor. Dreifaltigkeitsblume. Stiefmütterchen*). Lodyha s kúlovým kořenem. Listy vroubkovano-zubaté. Palisty lýrovité protisečné, jich konečný úkrojek větší, často vroubkovaný, ku zpodu silně zúžený. Kališní lístky kopinaté, poznenáhla zakončité. Bylina jedno- neb dvouletá 8—30 cm. — Kveté od května až

do zimy. Roste na polích, suchých lukách, rumišťích, lesních luhách a stráních hornatějších. Od macešky je mnoho odrodků, nejhlavnější jsou: *maceška zahradní*, *hrubokvětá* neb *štěpná* a *maceška polní*. Pro ozdobu v zahradách se pěstují. — Nat violek jmenovaných dříve vážena byla jako lék, zvláště na kůži těla, na žlázy mízní a na ledviny působící a doporučovala se proti počasným kožním vyrážkám, zejména proti chrastům na hlavě u dětí, lyšejím, trudům neb uhrům na tváři, zvláště pak proti úročkům neb oparu tvářnímu.

Prášek ze sušené natě podává se po 70 ctgr. až 1 grm. dvakrát za den buď v mléku neb kaši krupičné; odvar z 6—10 grm. na 200 grm. zcezeniny mléka neb vody, jako thé k pití. V lékárně lze dostati nat i prášek (*Herba jaceae*). — Sbírá se v květnu a červnu. —



Obr. 123.  
Vítod hořký.

211.

### V í t o d.

*Polygala. Kreuzblume.*

a) *Vítod hořký* (vítod. *Polygala amara. Kreuzblume*). Listy nejdolejší velmi veliké, opak vejčito-klínovité, v rozetku směstnané, tamže často s malolistými vedlejšími lodyžkami, nad rozetkou silně zmenšené. Křídla kališní zdělí neb kratší než tobolka, zaokrouhleně tupé, k dolejšku súžené, nervu sotva spojených. Semeník přisedlý. Chuť hořká. Bylina mnoholetá 5—15 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste na bařinách, lukách rašelinných.

Všecky částky byliny vyznačují se hořkostí patrnou a doporučují se proti bezsilným nemocem dychadel, počasným katarům, pozůstalé slabosti po zánětu plic a chrlení krve, a souchotinám.

Obyčejně se pije odvar natě jako thé, neb po lžičkách 10—20 grm. na 200 grm. vody. Také se užívá prášku po 1—2 grm. z počátku 2krát, později i víckrát za den, smíšeného buď s cukrem neb nějakým syrubem. — Rostlina se v lékárnách kupuje, sbírá se v červnu. — Stejně účinkuje a

upotřebuje se b) *Vítod obecný* (*Polygala vulgaris*), který roste na lukách suchých, kopcích a pažitech výslunných, lesích řídkých a kvete od května až do září. — Roste pak u nás od obou druhu několik odrodků, které však vesměs stejnými vlastnostmi se vyznamenávají.

212.

### Vlašovičnik.

*Chelidonium. Schellkraut.*

Vlašovičnik větší (vlašovičnik, krvovník, nebeský dar, celidon, celiston. *Chelidonium majus. Schellkraut, Schwalbenkraut, Schell-*

wurz). Listy chobotnato-peřenodílné, úkrojků vejčitých, hrubě stříhanozubatých. Květy okoličnaté, žluté. Žlutomléčný. Mnoholetá bylina 30—60 cm. Roste na rumišťích, zdích, skalách, v huštinách.


Upotřeben bývá kořen, nať a šťáva. Kořen a nať, čerstvé, vydávají zápach hnusný; chuť mají ostrou, nepříjemnou. Šťáva jest hustá, pomorančově žlutá, hořká, leptavá, smradlavá, palčivě ostrá, prsty stále barvicí. Sušením kořen, nať i šťáva nazvíce ostroty své pozbývají.

Za čerstva svou těkavou a ostrou dráždivostí zvláště na nervy břišní působí, ústroje břišní k větší čilosti popuzuje, moč a pot vyvádí. Příliš dlouho neb ve větších dávkách užíván chuť a zažívání ochabuje, svaly i pohyb srdce zeslabuje, ba i povážlivé příznaky způsobuje, tak na př. velká lžice vzatá buď průjem buď vrhnutí v zápětí má. Šťáva čerstvá na kůži přiložená zanítí ji a rozbolaví.

Vlašťovičník doporučoval se při žloutenici a vodnatelnosti neduhem jater pošlé, v zimnici studené, zácpaní žláz okružných, v zlaté žíle, v nepořádné čmýře, v dnách, proti kamenu žlučnímu a hlístům. Vně podává se v zánětech očních, okalu očním, proti bradavicím, fíkům, povrchným vředům, lišejům, svrabu a j.

Čerstvé šťávy se užívá smíšené s jinými šťávami rostlinnými, nebo stejné částky šťávy, v medu a vody; začne se s kávovou lžičkou znenáhla až k lžici k jídlu polévkové. Do očí se kape pozorně 3—5 kapek šťávy; bradavice, fíky a j. šťávou se potírají. — Šťáva z čerstvé rostliny vymačkaná sváří se za stálého míchání zponenáhla až na hustost syrupu. Od toho syrupu neb výtahu dává se, když není možno čerstvé šťávy dostati, 10 ctgr. až 1 grm. buď v roztoku neb v pilulkách. Také prášek z usušené nati se užívá 14 ctgr. na dvakrát, ráno a večer, s cukrem neb v pilulkách, s kterou dávkou může se vystoupiti až na 70 ctgr.

Pro lékárnou sbírá se v květnu.



Obr. 124. Vlašťovičník větší.

Štáva se též vychvalovala k léčení vředů talovitých u koní. K tomu cíli se míchala kamencem a přikládala na vlnu natřená na vředy. Také se vymývají podobné vředy odvarem kořene, aby červi v nich bydlící umořeni byli. —

Štávou možno látky na žluto barviti. Někteří knihaři prý štávu potřebují, když k pozlacování půdu kladou. Též šlupky šešulek dávají stálou barvu slámovou, s kamencem ale pomerančovou. — Nať s kamencem dává prý jako boryt barvu modrou, toliko musí břečka déle státi. — Ze semen může se tlačiti olej, tak sladký jako mandlový. —

213.

### Vraní nožka.

*Coronopus. Krähenfuss.*

Vraní nožka (vraní noha, kolocír. *Coronopus Ruellii*, *Senebiera coronopus*. Krähenfuss). Lodyhy četné, rozvětvené, položené. Listy peřenodílné, úkrojků čarkovitých neb podlouhle kyjovitých. Hrozny krátké, protilistné, přisedlé; květy krátce stopkaté, malé, plátky bílé. Šešluka ledvinkovitá, čnělkou jehlancovitou špičkatá, síťnatě svraskalá, na kraji hřebenitě žebnatá a zubatá. Bylina jednoletá 2 $\frac{1}{2}$ —16 cm. Kveté od června do konce srpna. Roste na průhonech, kolem cest, příkopů.

Jí se v salátu a doporučována byla dříve proti bésnosti; také nať i s kořenem vařená proti chrlení krve, bělo- a krvotoku; štáva z čerstvých listů dávala se píti užtknutým od hada. Kořen s bílým vínem vařený radil se proti vodnatelnosti, při čemž nemocný několik dní po sobě vždy ráno kofík vína toho měl vypíti a na to se vypotiti. Teplý odvar natě s červeným vínem neb octem, v ústech držáný utiší prý i velké bolesti zubů. —

214.

### V r á t i č.

*Tanacetum. Wurmfarrrn.*

Vrátič obecný (vrátýč. *Tanacetum vulgare*, *Chrysanthemum tanacetum*. Wurmfarrrn, Wurmkrout, Rainfarrrn). Koruny krajní nítkovitotrubkovité, nejvíce třizubé, v terči s válcovitou oblou trubkou korunní. Květenství směstnané, krátkovětevné. Vřetenolistů ku konci rozšířené a zubaté. Úkrojky listů na lici žláznato-tečkovaných kopinaté, stříhano-pilovité neb protisečné. Nažky 5-žeberné. Květy žlotožluté. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ —1 $\frac{1}{4}$  m. Kveté v červenci až do října. Roste na mezích, cestách, v mýtinách, poříčí. —

Květoucí nať zapáchá silně a nepříjemně, chutná hořce a doporučuje se proti křečím a škrkavkám, buď v nálevu po 10—20 grm. na 200 grm. vody, buď v prášku po 60 ctgr. až 1 grm. za den. — Nať posud v lékárnách je na skladě, avšak málo kdo se po ní

shání. Dříve se z nati připravovala též voda a olej vratičový, kterých se upotřebovalo obyčejně jako přísady k jiným mixturám, na př. oleje 2—3 kapky proti křečím hysterickým. — Nať se pro lékárnu sbírá v červnu a červenci. — Nať zahání prý blechy a štěnice. —

215.

### Vratička.

*Botrychium. Mondraute.*

Vratička obecná (Vrať se zase, zasevratec. *Botrychium lunaria. Mondraute*). Řapík neplodného listu až po čepel téměř s řapíkem plodního dílu srostlý. Čepel neplodná ze širšího zpodu vejčito-podlouhlá, jednou peřenodílná, úkrojky z klínovitého dolejšku poloměsíčné, s žilami vějířovitě rozvětvenými, zředu celokrajné, vroubkované neb prstnatě stříhané. Bylina mnoholetá 8—24 cm. Kvete v červnu a červenci. Roste na lesních lukách, vlhkých písčinách. —

Nať slabě svraskující a sleznatá jindy v lékařství se potřebovala. Nať vařená neb prášek z ní s červeným kyselým vínem dával se k pití proti chrlení krve, běhavce, úplavici červené, bělotoku a kapavce. Čerstvá nať roztlučená, šťáva z ní, neb ze suché nati prášek sloužily k zahojení vředů. —

216.

### V r b a.

*Salix. Weide.*

Vrba bílá (bělice, potočnice. *Salix alba. Sahlweide, Silberweide*). Listy podlouhle kopinaté, dlouze zakončité, na lici mdlé, vezpod sivozelené, tamtéž a někdy obak hedbávité. Šupiny velmi tenkých jehněd podlouhlé, zředu nejvíce lysé. Stopka pestíka kratší než žláзка. Strom kvete v dubnu a květnu. Roste na březích řek, potoků i vod stojatých. —

Upotřebuje se kůry z větví oloupané, mnoho tříslovin a hořké látky obsahující proti bezsilným, nervosním zimnicím, krvo- a slizotokům, nezáživnosti z ocháblosti žaludku pocházející, zvláště po těžkých a dlouho trvajících nemocech.

V některých krajinách užívají prášku z kůry vrbové místo chinu proti zimnici studené, zvláště lid chudší na drahý chinin peněz nemající. — Prášku se užívá po 1½—5 grm., obyčejně však v odvaru 20—40 grm. na 200 grm. vody. — Také se připravuje z kůry extrakt, jehož se může 2—10 grm. denně užiti buď v rozvodu neb pilulkách. — Nyní se v lékárnách předpisuje z kůry vyráběný: Salicin. — Kůra pro lékárnu sbírá se v březnu a dubnu.

Vrb je více druhů. Vrba bílá je velmi rozšířena, z kletů dělají se otečky i starší dříví slouží k pálení. — Vrba žlutá je houževnatější a slouží k pletení rozličného nářadí, k vázání, zvláště ve



vinicích. *Vrba křehká* obsahuje v kůře mnoho třísloviny a potřebuje se proto v koželužství, kořen její barví těž na červeno. *Vrba mandlová* hodí se nejlépe k upevňování břehů a pruty její k pletení košíků, stejně tak dobře jako *vrba košařská*. — V sadech pro

ozdobu a hřbitovech sází se *vrba smutková* neb *babylonská*. — K vrbám náleží též *jiva* (*Salix caprea*), která nejvíce v našich lesích roste a jejíž dříví nejen k pálení ale i k zhotovování drobnějších prací slouží. —



Obr. 125. Vrbina penížková.

rozšířené a krátce srostlé. Koruny větší, zlatožluté, hnědě tečkované. Bylina mnoholetá. Lodyhy  $\frac{1}{3}$ —1 m. dlouhé. Kvete v červnu a červenci. Roste na vlhkých lukách, lesích, poráčích.

Nať je chuti zakyslé, hořké a trpké, druhy se užívala proti průjmům, kurdějím a vředům. Posud někde pijí šťávu z listů vymačkanou neb s vínem vařené listy proti chrlení krve a úplavici červené; nať přikládají na rány neb na nos k zastavení krve. —

Podobně se potřebuje b) *Vrbina obecná* (*Lysimachia vulgaris*), která v křoví u řek, potoků a rybníků roste. — Nať její slouží k barvení na žluto. —

218.

### V s t a v a č.

Orchis. Stendelwurz.

a) *Vstavač obecný* (vstavač, nuďatka, žežhulka. Orchis morio. Stendelwurz, Ragwurz). Listy dolní podlouhle kopinaté, hoření kornoutovité. Klas vejčitý neb podlouhlý, dosti volný. Listky vejčité lebky nachové, zeleně žebernaté, zaokrouhleně tupé. Pysk nachový;

3-laločný; jeho laloky široké, krátké, přikrouhlé. Ostruha zdělí semeníka, válcovitá, vystouplá. Zřídka květ bílý neb pletní. Bylina mnoholetá 8—26 cm. Kveté v květnu a červnu. Roste na suchých lesních lukách. —

b) *Vstavač mužský* (vstavač samčí. *Orchis mascula*). Lístky okvetní špičaté neb vláskovitě přišpičatěné. Listeny blánovité, 1—3 žilné. Listy nejhořejší kopinaté neb čárkovito-kopinaté; lodyha nad nimi nahá. Hlízky podlouhlé, vždy nedělené. Klas podlouhlý, posléz prodloužený. Pysk hluboce 3-laločný, ústů širokých zoubkatých. Okv. nachové, zřídka lilákové neb bílé. Bylina mnoholetá 20—46 cm. Kveté v květnu a červnu. Roste na lesních a horních lukách. —

Kořen obou vstavačů obsahuje mnoho škrobu, slizu a klovatiny, spůsobilých to látek k obživování, obměkčování, zaobalování a zkrocování. Odporučuje je proti chraptivosti, kašli, souchotinám, průjmu, úplavici a úbytu (mze), kořen sestává ze dvou bambulin, pod jménem „Salep“ známých, užitečnější je bambulina mladší, nesoucí příští lodyhy, jelikož druhá vypustivši lodyhu květuoucí jest vyčerpána. Očištěné bambuly náleží na několik minut ve vřelé vodě močiti, pak na niti navléknouti a co možná čerstvě usušiti, tím stvrdnou a nabudou barvy šedé nebo žlutavě bílé. — V lékárně se prodává kořen a prášek z něho. — Obyčejně se užívá prášek v odvaru s vodou, mlékem, polévkou hovězí nebo vínem, 1—1½ grm. na 200 grm. tekutiny. —



Obr. 126. Vstavač obecný.

219.

## V š e d o b r.

*Imperatoria. Meisterwurzel.*

Všedobr horní (*Všedobr. Imperatoria ostruthium. Meisterwurz, Meisterwurzeln*). Listy jednou (neb přízemní 2-krát) trojené; lístky široce vejčité, konečný často 3-laločný, postranní 2-laločné, hrubě pilovité; listy lodyžní menší s pošvami nadmutými. Lístky obalíčku nitkovité, nehojné. Plátky bílé. Bylina mnoholetá 1/3—1 m. Kveté v červnu a červenci. Roste na horních lukách, blíž obydlí lidských.

Kořen byl dříve co lék pot vzbuzující, větry vypuzující a čmýru vyvodící odporučován. Podněcuje mocně činnost nervů a cév, odměšování kůže, ledvin a plic a je prospěšný jak v náhlých tak

i počasných nemocech oslabujících, na př. v tyfu, zimnici studené a j. Kořen čerstvý na jaře je plný šťávy zahořklé, ostré, bělavé na vzduchu žloutnoucí, účinkuje podobně jako anjelikový, obzvláště ve zvěrolékařství. K nálevu se bere 10—20 grm. na 200 grm. vody, za 2 hodiny 2 lžice k užívání; prášku z kořene se užívá 70 ctgr. až 1 grm. dvakrát neb třikrát za den. — Nyni přišel v lékařství k zapomenutí, v lékárnách však posud se chová kořen, který se sbírá v březnu a říjnu. —



Obr. 127.  
Ysop lékařský.

220.

## Y s o p.

Hyssopus. Ysop.

Ysop lékařský (Hysop. *Hyssopus officinalis*. Ysop). Lodyha polokřovitá, nejdoleji větevnatá. Listy krátkorapíčné, kopinaté až čárkovito-kopinaté, lesklými žlázkami tečkované. Lichopřesleny v hrozen sestavené, jednostranné, s listenci čárkovito-šidlovitými. Koruny modré, růžové neb bílé. Rostlina mnoholetá 30 cm. Květe v srpnu a září. Pro ozdobu v zahradách obyčejný, na skalách a zděch různě zdivočelý.

Vršky kvetoucí mají obzvláštní, pronikavou, kořenovou vůni, chutnají zahořkle a podávaly se v nálevu jako thé proti občasným nemocem dychadel, katarům plicním a dýchavičnosti.

Lékárníci jich upotřebují pouze k některým jiným připraveninám jako přísady. —

221.

## Z á b ě l n í k.

Comarum. Blutauge.

Zábělník bahenní (Pětílistek červený. *Comarum palustre*. Blutauge, rothes Fünffingerkraut). Listy zpeřené, 5-četné, někdy 7-četné, nejhořejší 3-četné; lístky podlouhlé, ostře pilovité, vezpod sivé, na žilách plstnaté. Kalich krvavě naběhlý, jeho ústy vejčito-kopinaté, za plodu zvětšelé, plátků hnědonachových mnohem větších. Bylina mnoholetá 30—60 cm. Kvete v červnu a červenci. Roste na bařinách, rašelinách rybnických a horských poloh.

Šťáva z mladého kořene užívala se proti chorobám plic a jater, jakož i co protijed při otrávení. Vino s kořenem vařené se odporoučelo pít proti žloutenici; odvar s vodou neb kyselým vínem proti úplavici červené, chrlení krve a krvotokům rozličným; odvar listů proti zimnici studené a psotníkům. — Proti uvedeným nemocem připravovala se z kořene též pálená voda a extrakt. — Voda s ko-

řenem vařená sloužila za kloktadlo proti zubů bolení, chraptivosti, vředům a poranění v ústech a krku. Kořen v octě vařený přikládá se na vole, tvrdé nádory a prašiviny. Listy s medem a solí smíšené dávaly se na rány, píštěle hnisající a mokvající vředy. — Víno, ve kterém nať v měděné nádobě močena byla, natíralo se před spaním kolem krhavých očí. Pálenou vodou natíraly se třesoucí se údy a čelo při krvácení z nosu. Kořen s octem vařený přikládá se na rakovité vředy. —


Zábělník může se potřebovati k vydělání kůže; kořen dává též barvu červenou, avšak méně dobrou. —

222.

### Zběhovec.

*Ajuga. Günsel.*

*Zběhovec plazivý* (svalník prostřední, ranník, zběhový nebo drábský traňk. *Ajuga reptans*, Günsel). Lodyha 2-řadě chlupatá, jinak lysá neb skoro lysá, s velkými přízemními, podlouhlo-opak-vejčitými listy, nad těmito oddáleně listnatá, bez postranních lodyh, leč s výběžky listnatými, plazivými. Listeny oddálené, nejhořejší kratší neb zdělí květů. Koruny s širší trubkou. Koruny modré. Semeno tupými lištami síťovité. Bylina mnoholetá 1—10 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste na vlhkých lukách, pastvinách okrajích lesů. — Nať jest zahořklá a trpká, druhdy se užívala proti úplavici a krvotoku, proti zácpě jater a sleziny, žloutenici. Nať roztlučená neb šťáva z ní přikládala se na hnisající a rozžírající se vředy. Ostatně se jí připisovala skoro stejná moc jako černohlávkou obecnému, který též „svalník menší“ jmenovali. —



Obr. 128. Zběhovec plazivý.

223.

### Z e m ě d ý m. (Routička).

*Fumaria. Erdrauch.*

Zemědým lékařský (routička, rutka polní, zemská pára, routička pospolitá. *Fumaria officinalis*. Gemeiner Erdrauch). Kališní lístky vejčito-kopinaté, 3-krát kratší než koruna, užší než trubka korunní. Vnější lístky korunní tupé. Plod na přič širší, hruškovitý, zpředu uťatý a povykrojený, se 2 okrouhlýma jamkama. Bylina jednoletá 15—30 cm. Kvete v květnu po celé leto. Roste na rolich, rumišťích a v houštích. Nať čerstvá má chuť hořkou, trochu ostrou, suchá nabývá

k tomu ještě slanosti. Až posud se užívá, ačkoliv zřídka, v lékařství co lék rozhánivý při zácpě a žloutenici. Dříve byl zemědým velmi odporčován při zácpě jater, sleziny a žláz okružných, v žloutenici



Obr. 129. Zemědým lékařský.

a vodnatelnosti od toho povstalých. Dále se chválil v zimnici studené a slizné, zlaté žle, hypochondrii neb těžkomyslnosti, nemocech ledvin, dnách a rozličných vyrážkách kožních. — Vně se podával v klístech v nemocech břišních dříve jmenovaných. Spařenímou nati myla se kůže, aby byla hladkou jako i tenkrát, když lišejem neb jinou vyrážkou podobnou pokryta byla. —

Nejlépe účinkuje šťáva z čerstvé nati, která se podává za den po 70—100 grm. pro sebe, nebo s jinými šťávami, na př. smetankovou, řebříčkovou, kerblíkovou, lžičnickovou, krešovou a j., též s polévkou masitou, syrovátkou nebo s vodou zaječickou, selterskou a j. — Výtah se dobude, když se šťáva z čerstvé nati nad mírným ohněm na hustost povidel sváří; podává se denně po 5 grm, buď v pilulkách nebo v nějaké vodě kořenné rozpuštěný. — Od suché nati bere se k odvaru 20—40 grm. na 200 grm. vody, od kterého pak za 3 hodiny 2 lžice

se užití mohou. — Pro lékárnou sbírá se nať v květnu a červnu. — Z nati vydobyti lze barvu žlutou, stářejší než z rytu.

Zemědým slouží mezi jinými rostlinami dobytku za píce.

224.

## Z e m ě ž l u ě.

*Erythraea. Tausendguldenkraut.*

Zeměžluč obecná (zeměžluč lékařská, zeměžluč, zeměžluč menší, hlístník. *Erythraea centaurium. Tausendguldenkraut*). Listy spodní sblížené, v rosetce, často vedlejší lodyhy vyhánějící. Květy na konci prodloužené lodyhy a větví ve vidličnatých, nejprv dosti hustých vrcholcích. Kraj koruny ploše rozprostřený, s ústy nejvíce přístupnými. — Listy tak jako lodyha na plochách a na kraji hladké, podlouhlovejčité až kopinaté. Vrcholík hojnokvětý, větviček skoro stejně vysokých. Kalich v čas rozkvětu o polovic kratší růžově pletní, zřídka bílé koruny; tato pod krajem sotva zaškrčená. Bylina jedno- a dvouletá 15—46 cm. Kvete v červenci, srpnu a září. Roste na lesních lukách, pasekách,

vřesovištích. Sbírá se květoucí nať, která má chuť nepříjemnou, zatrpklou, jež sušením mizí; účinkuje podobně jako hořec, jest toliko slabší a nezahřívá tak silně; užívá se skoro ve všech nemocech jako onen, zvláště v slabosti ústrojů zaživacích, v zimnici střídavé, v žloutenici, vodnatelnosti, pakostnici, proti krticím, slizotokům, vzteklině, zlaté žile, rýmám počasným a hlístům. Neradí se podávati při zánelech, krvotoku a zimnici horké. Staří mnohem více užívali zeměžluče zevně; natí svařenou zaháněli wszeliké neštovice, ubry, píhy, vši a prašivinu hlavy. Štávu z byliny přikládali proti zácpě jater a sleziny, proti hlístům, na rány a vředy; s medem smíšenou vpouštěli do očí při zákalu a povlaku. — Při bolesti kyčelní a břišní dávaly se klistéry. — Až posud se v lékařství užívá proti slabému zažívání, zácpě útroh břišních a odtud pocházejících nemocích. V lékárnách se chová nať a extrakt pod jménem: *Herba et Extractum centaurei minoris*. K nálevu se bere 5—10 grm. na 200 grm. vody; Extraktu 50 ctgr. až 1½ grm. v míšenině neb v pilulkách. Ke klistéru zvaří se 70 grm. natě se 400 grm. vody až na polovičku totiž 200 grm. — Pro lékárnou se sbírá nať v červnu a červenci.

— Zeměžluč jest k barvení velmi užitečná. Pouhá svařenina rostliny této barví plátno zelenavě-žlutě. Břečka se stejným množstvím soli kuchyňské nasycená dává tmavou šedohnědou barvu, s kamenem ale místo soli poskytuje tmavo-citronovou žlutost, se skalicí zelenou však barvu zahnědlou do zelené spadající. Vlnu možno na červenožluto barviti, jestli tkaniny dříve v roztoku cínovém byly močeny; barvu ale pleťovou do žluta padající přijímají, jestli roztokem vizmutovým se připravily. — Květoucí rostlina může se upotřebiti k vydělávání kůže. — Včely mnoho medu z květů sbírají. Dobytek rád žere suchou nať a dobře mu slouží. Sládcí, šibalové, dávají zeměžluč do piva místo chmele. —



Obr 130. Zeměžluč obecná.

225.


### Zimoléz neb kozí list.

*Lonicera. Heckenkirsche. Geissblatt.*

a) *Kozí list obecný.* (Růže z Jericha, lilium lesní. *Lonicera caprifolium.* Geissblatt, Jelängerjelier, durchwachsene Lonicere).

Kmen popínavý a opletavý. Vrcholčky 3—2květé v úžlabí vstříčných listů přisedlé, tudíž květy jako v přeslenech neb strbouli. Kraj kališní na plodu stálý. — Listy okrouhlé eliptické, vezpod nasivělé, na kvetoucích větvkách hoření po 2 srostlé; v jich paždích květy jako přeslenaté, nejhořejší strboulovitě nahloučené. Koruny nejprv nachové, pak růžové a žlutavobílé, lysé, vonné. Bobule šarlatové. Keř, 3—6 m. vysoký. Kveté v květnu a červnu. Roste na keřnatých kopcích, zvlášt na vápně, v křovích a plotech, krom toho v zahradách pěstován. —

b) *Kozí list německý* (kozí list, růže z Jericha. *Lonicera periclymenum*, *Caprifolium periclymenum*. Deutsche *Lonicere*, *Geissblatt*).



Obr. 131. Kozí list obecný.

Podobný předešlému. Listy však jsou všecky oddělené, řapikaté. Vrcholčky v úžlabí listenů v konečný strboul sestavené. Koruny žlutavobílé a listeny silně žláznato-srstnaté. Kveté v červnu, červenci a srpnu. Bývá v sadech pěstován. —

Listy jsou chuti perné a ostré. Dříví, listy, květy a bobule pudí na moč, tak že někdy i krev se objeví. Dříve se doporučovaly proti dýchavičnosti. — Štáva z listů vytlačená na rány přiložená prý je čistí a zaceluje. Svařenina z nich slouží ke kloktání proti zánětu mandlí. Voda přes květy pálená má se za užitečnou proti zánětům očí. — V posledních 3 způsobech až posud lid na venkově velmi často kozího listu upotřebuje.

c) *Zimolez obecný* (zimolýz, zimolez, zimoláz. *Lonicera xylosteum*. Gemeine *Lonicere*,

*Hundskirsche*, *Brechweide*, *Beinholz*). Stopka květonosná asi zdělí květů. Listeny čárkovito-šidlovité, zdělí neb delší semeníka. Listy vejčité neb eliptické, špičaté neb zašpičatěné, po obou stranách jak stopky květní roztroušeně pýřité, vezpod bledší. Kališní úšty vejčité. Koruny žlutavě bílé. Bobule červené neb žlutavé. Keř do 8 cm. Kveté v květnu a červnu. Roste ve světlých hájích, na obrostlých stráních, v plotech a křovištích podle lesů.

Rusové z dříví zimolezu obecného sestupujícím pužením vydobývají přiboudlinu neboli olej černý, hustý, kterým studené otoky natírají a velmi jej chválí. Také proti jakýmkoli znečištění krve vnitř užitý za prospěšný mají, též v rozličných případech přijíče v kurdějích a ve svrabu za působilý lék ho vydávají. — Bobule po

čišťují a vrhnoutí způsobují. — Kozí list obecný a německý zvláště oblíben jest u zahradníků; ohebné a dlouhé větve jejich dají se proplétati a pnouti po besídkách, zdich, stromech atd. Ku konci květnu a v červnu vynikají ozdobné květy, které zvláště času večerního líbeznou vůni vydávají. Ten čas není radno v besídkách spáti nebo květy ve světnici přes noc míti, neb silnou vůní svou pitomost, mrákoty a mdloby způsobiti mohou. — Oba keře rozmnožují se velmi snadno odnožemi, hřízenicemi; vyžadují půdu ani příliš výslunnou ani velmi stinnou; zimu snášejí dobře, a třebas kmeny zmrzly, zůstávají kořeny neporušeny. —

Dříví zimolezu obecného je velmi tvrdé a pevné, krásně žilnato-žíhané, zažloutlé, avšak málokdy dosti silné. Z prutů dělají se nabíjaky, cvočky a jiné menší věci. Uhlí k přípravě střelného prachu má býti výborné. — Včely z květu mnoho medu sbírají. —

226.

### Zlatobýl.

*Solidago. Goldruth.*

Zlatobýl obecný (celík, žlutá metla. *Solidago virga aurea. Goldruth*). Úbory v přímé, všestranné, jehlancovité latě. Koruny žluté, krajní úzké, čárkovito-podlouhlé, delší zákrovu. Listy v křídlatý řapík sbíhavé, dolní eliptické neb eliptičnokopinaté, drobně pilovité. Bylina mnoholetá 9 až 30 cm. Kvete v červenci a srpnu. Roste v lesích, pasekách, na horních a lesních stráních.

Květoucí nať byla za starodávna velmi hledána a zvláště proti nemocem ledvin, měchýře, močidel, kamennu a písku v moči doporučována. Užívalo se nálevu z 2—5 grm. nebo tinktury, ze šťavy čerstvé rostliny a lihu zhotovené, po 20—30 kapkách několikrát za den. — Pro lékárnu sbírá se květoucí nať v srpnu. —



Obr. 132.  
Zlatobýl obecný.

227.

### Žabník.

*Alisma. Froschlöffel.*

Žabník jitrocelový (jitrocel vodní. *Alisma plantago. Gemeiner Froschlöffel, Wasserwegerich*). Listy všecky z oddenku, řapikáté, namnoze vnořené, vejčité, trochu srdčité, neb kopinaté až čárkovitokopinaté, řídčeji ve vodě ponořené, čárkovité, trávovité, průsvitavé, některé s kopistovitou, vzplývající čepelí. Lata na pohled přeslínkatá. Nažky smáčknuté, tupé, bezhrotné, na hřbetě 1 až 2rýhé,



v strboulek tupě 3-hranný sestavené. Plátky bílé neb narůžovělé. Bylina mnoholetá 9—60 cm. Kvete v červenci a srpnu. V stojaté vodě, v blátech, v příkopech a kalužinách. —

Dříve byla upotřebena nať a kořen, který se ku konci srpna sbíral, vodou umyl a ve stínu sušil. Kořen na prášek roztlučený s jahodovou vodou pítý, doporučoval se proti písku neb sutému kamenu v měchýři. Svařenina kořene dávala se proti kurdějím a vodnatelnosti. Ještě na začátku toho století byl žabník proslaven co lék proti vzteklině, jak u lidí tak i u zvířat. Pokousaným osobám dávalo se hned po leptání rány, jakož i později, když běsnost vypukla 1—1½ grm. kořene v prášku, která dávka za 2 hodiny se opakovala. Pokousaným psům i v největším záchvatu vztekliny dával se prášek z jednoho neb dvou kořenů s máslem smíšený a na chleb natřený, jednou, dva- neb třikrát denně, což prý k vyléčení postačilo. —

Listy roztlučené přikládaly se na nohy vodou oteklé, aby puchýřky a úlevu způsobily. Nať se dávala na nežidy a vředy, také na prsy, aby mléko zmizelo. — Štávou žabníku vymývaly se rány od psů a hadů způsobené. —

Včely z květu mnoho medu a vosku vybírají. —

228.

## Ž i n d a v a.

*Sanicula. Sanikel.*

Žindava evropská (žanykl, zanykl, ženiklejt, ráček živý nebo černý. *Sanicula europaea. Sanikel, Bruchkraut.*) — Listy přízemní dlanito 5-dílné; úkrojky zaokrouhleně klínovité, 2 až 3 laločné, nestejně 2-krát pilovité; listy lodyžní 1—2 malé, přisedlé. —

Okolíčky strboulovité z květů obojakých přisedlých, prašníkových stopkatých, vrcholíkovitě sestavené. Plátky malé, bílé neb načervenalé.

Obr. 133. Žindava evropská.

Bylina mnoholetá 30—46 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste v stinných lesích hornatějších. Kořen a nať, chuti nahofklé druhy v lékařství velmi váženy byly. —

Listy žindavy posud sem a tam lid jako thé užívá proti všemožným nemocem dychadel, plic a prsou; také zevně jako kašiček, obkladů a omývání při zhmožděninách, ranách, zlomeninách kostí a t. d. —



## Žlutucha.

*Thalictrum. Wiesenraute.*

a) *Žlutucha menší* (*Žlutucha. Thalictrum minus. Kleinere Wiesenraute*). Lodyha a listy lysé. Hlavní úkrojky listů ostrými úhly odstálé; lístků mělčeji vroubkovaných, vezpod trávo- neb sivo-zelených. Nažky eliptické neb podlouhle eliptické, málo smáčkuté, 8—10 žebřé, s bliznou široce 3-hranně hrálovitou, málo nazpět ohnutou a nezubatou. Rostlina mnoholetá  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Květy zažloutlé uprostřed bledě zelené. Kvete v červnu a červenci. Roste roztroušeně na skalnatých a keřnatých stráních, na mezích, lukách, na př. na Smíchovské louce u Prahy, u Kel v Boleslavsku atd.

Jsou pak známy ještě jiné podobné druhy jako: b) *Žlutucha orličkolistá* (*Th. aquilegiaefolium*) v horních lesích, skalách, u lesních potoků; c) *Žlutucha smrdutá* (*Th. foetidum*) na vápených skalách, u sv. Ivana, sv. Prokopa a Závistě blíže Prahy; d) *Žlutucha jednoduchá* (*Th. simplex*) na lukách, v huštinách u Žatce; e) *Žlutucha luční* (*Th. flavum*) na vlhkých lukách v Polabí; f) *Žlutucha úzkolistá* (*Th. angustifolium*). Sem tam roztroušena na vlhkých lukách a v křovinách. —

Staří lékařové připisovali všem žlutuchám povahy mírně zahřívající a vysušující s nějakým svraskováním. —

Listy mladé s jinými zelinami požívané obměkčují břicho, a činí řídké neb volné stolice. Tutěz vlastnost avšak mnohem silnější připisovali kořenu a užívali ho místo rhebarbory co léku počišťujícího, s prospěchem zvláště při žloutenici. Nati a hlavně kořenu roztloučenému připisovali moc proti kamenu v ledvinách a proti všem neduhům ledvin a močového měchýře, an na moč žene a kámen vyvádí. —

Štáva z nati a květu, které se dává po 70 grm., slouží v krvotoku, bělotoku, přílišné čmýře a zlaté žíly.

Semena tentýž mají účinek.



Obr. 134. *Žlutucha jednoduchá.*

Zevnitř potřebovalo se nati k hojení ran, jakožto výborného prostředku. —

Svařeným kořenem v luhu mořily se vši a zákožky svrabové; prášek z kořene byl šňupán k zaražení krvácení z nosu a na vředy sypán, aby se čistily a vysušily. —

Čerstvé listy a kořeny zvláště žlutuchy menší a luční s kamecem močené barví tkaniny na žluto, skoro šafránovo; salmiakem nabývá se bledší barvy. —

---

## Rostliny nebezpečné.

K rostlinám prudkým, neb jak lid vůbec říká jedovatým, patří několik, z kterých i v lékárnách zhotovují se rozličné přípraviny, jichž však jedině lékař, za všechny následky zodpovědný, smí použít. Velice by si uškodil na zdraví, kdo by jich co domácího léku upotřebil, neb již pouhé sbírání těchto bylin vyžaduje opatrnosti. Tak na příklad šťáva oměje, při vázání kytek, do rány na prstu, třebaš i nepatrné, vniklá, způsobí bolest, zánět, tlučení srdce, mdloby a jiné příznaky. Proto dlužno připomenouti, aby byliny podobné pro lékárnou nikdo nesbíral, kdo od materialisty neb lékárníka k tomu nebyl vybídnut a patřičně poučen, jak s rostlinami těmi zacházeti má. — Za naší doby sáhne málo kdy lékař k přípravinám těchto rostlin, tím méně by se měl osmělit jiný, zvláště když má po ruce byliny neškodné, které podobně účinkují. — Mnohem hůř by pochodil, kdo by chtěl ve zlém úmyslu bylin následujících použití, aby se otrávil, neb smrt nenásleduje vždy a když, tedy po dlouhém trápení a velkých mukách. Pro odstraňující příklad jsou níže některé účinky těchto rostlin uvedeny.

Rostliny zdraví lidskému škodlivé neb jedovaté, jsou hlavně:

1. *Oměj*. (*Aconitum. Eisenhut*), mezi lidem obyčejně „šalamounek, zlý mníšek neb mordovník“ jmenován. Roste na vysokých horách, v zahradách, pak se pro ozdobu všude pěstuje a každému známý je květem obyčejně modrým, příblci podobným, který na konci  $\frac{1}{2}$ —1 m. vysoké, tlusté, po celé délce tmavozelenými listy porostlé lodyze v jednoduchý hrozen upraven je. Známé druhy oměje u nás jsou:



Obr. 1. Oměj šalamúnek.

*Oměj šalamúnek*, (šalamounek, zlý mníšek, mordovník. *Aconitum napellus*). Lodyha ztuha přímá; listy tuhé, přitloustlé, trochu leské. Květ modrý, tmavě fialový, pořádku světlý neb bílý.

*Oměj modrý*. (Jména prstonárodní předešlého. *Aconitum variegatum* neb *camarum*). Lodyha přímá neb popínavá; listy neleské, dosti hebké. Hrozen doleji listnatý. Přílba vysoko klenutá. Plátky na nehtu rovném přímé neb šikmo nakloněné, stropu přílbového namnoze nedosahující, ostruha silně hákovitá. Květy modré.

*Oměj pravý*. (Svolina, ostatní jména prstonárodní prvního. *Aconitum Stoerkianum*.) Listy leské. Hrozen sotva listnatý. Přílba nížeji klenutá, širší a kratší než u předešlého. Plátky na obloukovitém nehtu nahnuté, stropu přílbového dosahující; ostruha slaběji hákovitá. Květy modré.

*Oměj žlutý*. Hrozen dosti hustý. Přílba kališní válcovito-kuželovitá. Ostruha z kápovitých plátek spirálně stočená. Květy bleďozluté.

Jmenované byliny jsou vesměs mnoholeté,  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. vysoké. Kvetou v červenci a srpnu, rostou ve světlých hájích, na horských stránkách a bývají v zahradách pro okrasu pěstovány.

Užije-li někdo oměje, objeví se následující příznaky: palčivé bolesti v celém zažívacím kanálu, zvláště škubání a řezání v životě, necitelnost kůže, vrhnutí, krvavé stolice, ku konci ztráta řeči, křeče, strnutí, blouznění, šílenost, studené poty, ochrnutí, a konečně po dlouhých bolestech smrt.

Tytéž úkazy vyvádí kýchavice bílá.

2. *Kýchavice bílá*. (Kýchavka, ellebor bílý. *Veratrum album*, Germer). Lodyha jak listy pýřitá, nahoře latnatá. Listy obloučně žebnaté, dolní široce eliptické, nejhořejší kopinaté. Ústí okvětní zoubkaté. U nás jen odruda s květy zelenavými. Bylina mnoholetá  $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{4}$  m. Kveté v červenci a srpnu. Roste na lesních, též mokřích lukách horských.

3. *Rulík jedovatý* (rulík zlomocný, ruřík, lilík, němnice, nadragula. *Atropa belladonna*. *Tollkirsche*). Lodyha větevnatá. Listy vejčité neb eliptické, v řádku sbíhající, v květenství po 2 vedle sebe. Květy namnoze nící; koruny špinavě hnědofialové; bobule černé. Bylina mnoholetá 1— $1\frac{1}{2}$  m. Kveté v červnu a červenci. Roste v pasekách horních lesů.

Příznaky požití rulíku jsou: Obličej je naduřelý, nachovité barvy, oči červených a rtů modrých; zorničky očí jsou nápadně rozšířeny neb zvětšeny; silná horečka, bílé usmívání, ospalost, škrcení v krku, nesmírná žízeň, obtížné močení, mrtvice.

Podobné úkazy objevují se při následujících:

4. *Náprstník červený*. (*Digitalis purpurea*. Fingerhut). Lodyha a rnb listů vejčitých až vejčito-kopinatých, vroubkovaných hedvábitě šedoplštnaté. Ústí kališní vejčité, tupé, hrotité. Koruny nachové neb bílé. Bylina dvouletá  $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$  m. Kveté v červnu až do října. Pěstuje se v zahradách.

5. *Bolehlav blámatý* (bolehlav. *Conium maculatum*. Schierling). Lodyha mělce rýhovaná, sivě ojiněná, lysá, dole nachové skvrnitá.

Listy 2—3krát zpeřené, ústů podlouhlých, celých neb stříhanopilovitých. Obal a obalíčky 3—6 listečné, ohrnuté. Plátky bílé. Zápach protivný myšinou. Bylina dvouletá 1—2 m. Kveté v červnu a červenci. Roste v plotech, křovích, na návsi.

6. *Blín černý* (blín, blén. *Hyosciamus niger*. Bilienkraut). Bylina lepkavě chlupatá. Listy vejčité neb podlouhlé, chobotnaté až vykrajované, dolní řapikaté, hoření poloobjímavé. Lichoklas jednostranný, listnatý. Koruna bledě špinavožlutá, fialově žilkovaná. Bylina



Obr. 2. Rulík jedovatý.

jedno- a dvouletá 30—60 cm. Kveté v červnu až do září. Roste na rumišťích, cestách, návších.

7. *Chvojka*. (Klaštorská chvojka, chvojka rajska, rýnská, netáta, možucha, břinka. *Juniperus sabina*. Sadebaum). Kmen položený, větve přímé. Listy přitisklé, tupé. Šišky kulaté, na stopce kratší nazpět ohnuté, keř nebo strom 1½—3 m. Kveté v dubnu a květnu. V sadech v zahradách sázená.

8. *Ocún jesenní* (ocún, naháč, ocoun, luční matečnick, jeseňka, naháček, popovo moudří, zimovít. *Colchicum autumnale*. Zeitlose). Lodyha nejdoleji napuchlá ve hlízu vejcovitou, v hnědé slupky zaobalenou. Listy v čas květu ještě nevyvinuté, pod zemí, s plodem pak na lodyze povyneslé, široce kopinaté. Okvětí pletní, lilákové

do růžova, neb bílé. Bylina mnoholetá 15 cm. Kvete v září a říjnu; plody na to v květnu; opožděné květy někdy až z jara. Roste na lukách zvláště hornatějších.

9. *Vraní oko*. (Vranovec čtyřlístý. *Paris quadrifolia*. Einbeere). Lodyha toliko se 4 (řídce 3—6) listy široce vejčitými neb eliptičnými, zašpicatěnými v přeslenu. Květ konečný, přímý. Lístky kališň kopinaté, zelené. Bobule černomodrá. Bylina mnoholetá 15—30 cm. Kvete v květnu a červnu. Roste v stinných lesích, zvláště horních.

10. *Mák vlčí* (pleskanec, ohníček, tleskanec, panenka. *Papaver rhoeas*. Wilder Mohn, Klapperrose). Úkrojky listů vícekrát stříhano



Obr. 3. Náprstník červený.


zubaté. Stopky květní s odstálými chlupy. Blizna nízko kuželovitá, se 7—14 po krajích se kryjícími laloky. Nitky tyčinek nitkovité. Paprsky bliznové nízké, úzké, v prostřed terče bliznového nesplývající. Tobolky 3lysé, opakvejitě. Květ šarlatový. Bylina dvouletá, ozimá 30 až 60 cm. Kvete v květnu, červnu a červenci. Roste na rolech, cestách a rumišťích.

Nať a vesměs celá rostlina mezi prsty třená vydává nepříjemný zápach makový. Od dávna se má za rostlinu omamující, bolesti utišující a kašel usnadňující. Z té příčiny dává lid květy jako thé nebo syrup z nich připravený nemocným. Dosti často nerozumné matky a chůvy svaňují makovice dětem křiklavým, aby spaly, čímž však děti zpitomí a často

i po celý věk zvláště na duchu chory zůstanou. Makovice jsou mnohem mocnější a škodlivější nežli květ a nať. Květy máku vlčího sbírají se pro lékárnu v červnu; makovice v červenci.

Pod stejnými prstonárodními jmeny jako mák vlčí, znám je také *mák polní* neb *rolní* (*papaver argemone*) s květy vodnaté krvavými a *mák pochybný* neb *malokvětý*, (*papaver dubium*) s květem šarlatovým. Oba rostou na polích, kopcích a ladách písčných, mají slabší, tenší lodyhy a menší květy i makovice. Květy účinkují tak jako květ máku vlčího.

Mnohem silnější a nebezpečnější jako lék jest *mák setý* neb *snodárný* (*papaver somniferum*), který se u nás seje, a v ohledu hospodářském i řemeslnickém velmi užitečný jest. Vůbec známo, že mák k nádivkám do buchet a koláčů se tluče, tře s mlékem, cukrem, sirupem nebo medem míchá, na vdolky, housky, rohlíky surový se sype a k rozličným moučným pokrmům pro chuť se přidává. Olej



Obr. 4. Bolehlav blámatý.


z máku dobře upravený je lepší nežli olej olivový nebo dřevěný a slouží k omaštění jídel.

Z máku bílého, černého i šedého vydobytý olej má tu dobrou vlastnost, že zimou nestydně; hoře čadí sice víc než jiné oleje, zato však zápachem méně obtěžuje, ostatně se k pálení málo užívá, proto že je mnohem dražší. Tím více slouží k malování, k přípravování pokostů mastných, k černidlu tiskařskému, tmelům čili kytům vodou neproniknutelným. Pro malíře s olejovými barvami obzvláště se hodí, proto že rychle schne a nežloutne. Rmut neboli záboj usušený a roztlučený dává vodou navlhčen velmi pevný tmel.



Rmut po vytlačení oleje zůstávající slouží též ke krmení dobytka. — Ptáci rádi semeno makové žerou. Prázdné makovice a nať suchá k pálení a ke stlaní užitečné jsou, ku stelivu však se rozsekávají, aby tím lépe hnily. —

V lékařství potřebuje se květ máku, nať, makovice nezralé, šťáva z nati a makovic zelených (opium). Z nich se připravují roz-



Obr. 5. Blín černý.



Obr. 6. Chvojka.

ličné léky, kterými však jedině zkušený a opatrný lékař může prospěti, kdežto nikdo jiný by se neměl osmělit makovinu vůbec podávat.

Právě jsem dopsal tyto řádky a čtu „Národní listy“ ze dne 6. července 1886, kde o máku příhodný článek následující: *Zakázané užívání odvaru z makovic*. V některých krajinách bledí nezkušené matky nemluvnátka ukonejšiti tím, že jim dávají napít se odvaru z makovic (*capita papaveris somniferi*). Dítě po tomto léku sice usne, avšak některé více se neprobudí, poněvadž odvar tento zvláště na slabší organismy rozrušeně působí. Za příčinou tou upozorňují se lékaři, lékárníci a majitelé závodů materialních a obecní starostové na škodlivý druh tohoto odvaru s doložením, že před úplným dozráním posbírané, zavité a nezralým mákem naplněné makovice nesmějí se sněšené ani samotné, ani k jinému thé přimí-

sené prodávati, poněvadž nápoj z nich připravovaný jest silně omamující. Lék tento smí býti prodáván jedině a výhradně na předpis oprávněného lékaře, a v tomto případě smí ho prodati jedině lékárník a žádný jiný obchodník neb materialista. Obmezení prodeje tohoto bude při příští revisi lékárnické taxy vyznačeno † na znamení, že jest lék tento jedovatým. Zároveň upozorňují se pomocnice ku porodu, aby nejen nikdy neradily k užívání odvaru takového, nýbrž aby nezkušené matky před užíváním léku toho varovaly.“

Krásný, vábivý je květ oměje, náprstníka i ocúnu, který růžovými kališkami, nejposlednější ze všech květin naše louky ozdobuje, ačkoliv všemožně k jeho vyplnění se pracuje.

— Pěkná je mnoho-semenná, černá, třešni podobná a růžovou šťávou naplněná bobule rulíka zlomocného a často již nezkušený lid, obzvláště děti krásným na pohled ovocem tímto k jídlu svedeny byly a povážlivě onemocněly. Ještě častěji se najedí děti bobulí vranovce čtyřlístého neb vraního oka, borůvkám (černým jahodám) podobných, ačkoliv snadno jsou k poznání, zvláště dle toho, že vranovec má jen jednu bobuli, která uprostřed 4 širokých, na konci lodyhy vodorovně roztažených listů se nachází. — Nať bolehlava blámatého snadno se může pomíchat s petrželí a kerblíkem, který omyl již mnoho neštěstí způsobil atd. —


Kdyžby někdo jakýmkoliv způsobem jmenovaných rostlin byl požil a otravující, dříve udané příznaky se objevily, sluší mu dáti protileku a sice *třísloviny*, která by v každé domácnosti měla býti.

Tříslovina (kyselina tříslová, tannin. *Acidum tannicum*) v nejnovější době oblíbený lék dobývá se nejvíce z duběnek, ve kterých se z větší části nachází. V přírodě je velmi rozšířena a nalezá se zvláště v kořinkách mnoha bylin, ve větvích keřů a nejvíce v kůře stromů. Tříslovina tvoří zažloutlý prášek, který se ve vodě rozpouští, má chuť trpkou, stahující a jest lacino všude u materialistů



Obr. 7. Ocún jesenní.

a v lékárnách k dostání. — Když se tedy onemocnění neb otrávení uvedenými rostlinami stalo, když se krev do hlavy hrne a mrtvice hrozí, dají se nejdříve studené ledové obklady na čelo; napotom se zjedná vrhnutí buď lehtáním čípku neb davidlem z kořene davidvého. Co odjed podá se tříslovina a sice každou čtvrt hodiny plná špička velkého nože, buď v oplatce nebo na lžici s vodou rozmíšená tak dlouho, dokud povážlivé úkazy nadržují. V dalším průběhu



Obr. 8. Vraní oko.



Obr. 9. Mák vlčí.

se položí do týla, mezi lopatky a na lýtka křenové placky a dají se klystéry z octa. Při ochrnutí podá se k pití černá káva.

Když by tříslovina nebyla při ruce, tedy ji nahradí částečně kůra z dubů, ve které tříslovina též u velkém množství se nachází. Vezmou se dva loty dubové kůry na jeden žejdlík vody, půl hodiny se nechá povařit, pak odcedí; při otrávení se užívá z toho odvaru každou čtvrt hodiny 2—3 lžice. —



# Seznam rostlin léčivých.

| Strana |    |   | Strana |
|--------|----|---|--------|
|        |    | Ambrožka viz světlík.                             |        |
|        |    | Angréšt, agrešt viz meruzalka srstka.             |        |
|        | 18 | Anjelika větší, lékařská . . . . .                |        |
|        |    | Aujelský traňk viz prha.                          |        |
|        |    | Anýz viz bedrník.                                 |        |
|        |    | Apich veliký viz libeček.                         |        |
|        |    | Apich zahradní viz petržel.                       |        |
|        |    | Arcisek viz narcisek.                             |        |
|        |    | Arnika viz prha.                                  |        |
|        | 19 | Aron skvrnatý, blámatý, aronová brada . . . . .   |        |
|        |    | Babí hněv viz jehlice trnitá.                     |        |
|        |    | Baldrián viz kozlík.                              |        |
|        |    | Barvínek viz plamének.                            |        |
|        | 20 | Bazalice planá viz bažanka.                       |        |
|        |    | Bazalika obecná, bazalka . . . . .                |        |
|        |    | Bažanka polní . . . . .                           | —      |
|        | 21 | Bedrník obecný, menší . . . . .                   |        |
|        |    | Bělice viz vrba.                                  |        |
|        |    | Betonie viz bukvice.                              |        |
|        | 22 | Bez černý, domácí, bezoví . . . . .               |        |
|        |    | Bez chebd, zemský . . . . .                       | —      |
|        |    | Bylina dnavá, mrtvičná, šlaková viz prvosenka.    |        |
|        |    | Bylina slunečná viz rosnička okrouhlostá.         |        |
|        |    | Bylina sv. Jana viz třezalka.                     |        |
|        |    | Bíser viz konvalinka.                             |        |
|        | 24 | Blatouch bahní . . . . .                          |        |
|        |    | Bluň viz břečtan.                                 |        |
|        |    | Bobál viz lilek brambor.                          |        |
|        |    | Boleočko viz blatouch.                            |        |
|        |    | Borovice, bor viz jedle borovice.                 |        |
|        |    | Borovička viz jalovec.                            |        |
|        |    | Borůvka viz brusnice.                             |        |
|        |    | Bouchavec, bouchaveček viz drnavec lékařský.      |        |
|        |    | Božcové koření viz mařina vonná.                  |        |
|        |    | Boží dřevce, dřevce viz pelyněk dřevinka.         |        |
|        | 25 | Brambor, viz lilek brambor.                       |        |
|        |    | Brambořík obecný . . . . .                        |        |
|        |    | Brčál viz rdest.                                  |        |
|        | 26 | Břečtan obecný . . . . .                          |        |
|        |    | Bříza obecná, bríza, březa . . . . .              | 26     |
|        |    | Broc, brotec, viz mařina barvířská.               |        |
|        |    | Brotan viz pelyněk dřevinka.                      |        |
|        | 27 | Brukev obecná . . . . .                           |        |
|        |    | Brusnice borůvka . . . . .                        | 28     |
|        |    | Brutnák obecný . . . . .                          | 29     |
|        |    | Budra viz oponec.                                 |        |
|        | 29 | Bukvice lékařská, červená . . . . .               |        |
|        |    | Burák viz brutnák obecný.                         |        |
|        |    | Burák viz cvikla.                                 |        |
|        |    | Buřina bílá viz jablečnk obecný.                  |        |
|        |    | Bzina viz bez černý.                              |        |
|        |    | Celidon, celiston viz vlašovičnk větší.           |        |
|        |    | Celidon menší, celidonya viz orsej.               |        |
|        |    | Celik viz zlatobýl.                               |        |
|        |    | Ceterák viz kyvor lékařský.                       |        |
|        | 36 | Cibule obecná, cibule hlavatá, cibule . . . . .   |        |
|        |    | Cikánka viz sedmikrása.                           |        |
|        |    | Cukrovka viz cvikla.                              |        |
|        | 30 | Cvikla, cvika . . . . .                           |        |
|        |    | Čabr viz čibr.                                    |        |
|        |    | Čápi nůsek viz kakost smrdutý.                    |        |
|        | 30 | Čekanka obecná, čekanka . . . . .                 |        |
|        |    | Čekanka šterbák . . . . .                         | 31     |
|        |    | Čemeřice černá, čemerka . . . . .                 | 31     |
|        |    | Čemeřice zelená . . . . .                         | 32     |
|        |    | Čemín viz jasmín obecný.                          |        |
|        |    | Černá jahoda viz brusnice.                        |        |
|        |    | Černé koření viz čemeřice černá.                  |        |
|        |    | Černé koření falešné, domácí, viz hlaváček jarní. |        |

| Strana   | Strana |
|--|--------|
| Černice viz brusnice.                                    |        |
| Černobýl, černobejl viz pelyněk<br>černobýl.             |        |
| Černohlávek obecný . . . . .                             | 33     |
| Černucha rolní . . . . .                                 | 34     |
| Černucha setá . . . . .                                  | 34     |
| Černucha zahradní . . . . .                              | 34     |
| Čertkus luční, obecný . . . . .                          | 35     |
| Čertův spár, čpár viz plavuň.                            |        |
| Česnek kuchyňský, obecný . . . . .                       | 35     |
| Česnek planý viz ožanka.                                 |        |
| Čibr obecný . . . . .                                    | 37     |
| Čičoretka, čičeretka viz brusnice.                       |        |
| Čistec viz rozrazil lékařský.                            |        |
| Čtverák viz ječmen.                                      |        |
| Čubr viz čibr.   |        |
| Čáhlík bahenní, vodní . . . . .                          | 37     |
| Dejvovec mrkvovitý . . . . .                             | 37     |
| Dan a noc viz drnavec lékařský.                          |        |
| Denivka plavá . . . . .                                  | 38     |
| Denivka žlutá . . . . .                                  | 38     |
| Děravec viz třezalka tečkovaná.                          |        |
| Děvec viz jedle modřín.                                  |        |
| Deryzka viz svízel obecný.                               |        |
| Deruzda viz bříza obecná.                                |        |
| Devandula viz levandule.                                 |        |
| Devětsíl, devěsíl viz podběl.                            |        |
| Dymnivka bobovitá . . . . .                              | 39     |
| Dymnivka dutá . . . . .                                  | 39     |
| Dymnivka prstnatá . . . . .                              | 39     |
| Divižna malokvětá . . . . .                              | 40     |
| Divižna velkokvětá, srpovitá . . . . .                   | 39     |
| Dobrá mysl domácí viz dobromysl                          | 40     |
| Dobromysl obecná . . . . .                               | 40     |
| Dobromysl voněkras . . . . .                             | 40     |
| Douška úžkolistá, mateří . . . . .                       | 41     |
| Douška vlašská . . . . .                                 | 41     |
| Dřevinka viz pelyněk dřevinka.                           |        |
| Dřchnička rolní . . . . .                                | 41     |
| Dřín, dřínka, dřínkový strom . . . . .                   | 42     |
| Dřítál obecný . . . . .                                  | 43     |
| Drnák viz dub zimní.                                     |        |
| Drnavec lékařský, obecný . . . . .                       | 46     |
| Dub letní, letnák . . . . .                              | 46     |
| Dub šipák . . . . .                                      | 46     |
| Dub zimní . . . . .                                      | 46     |
| Dubravník viz meduňka.                                   |        |
| Eibiš viz proskurník.                                    |        |
| Ellebor český, falešný viz hlaváček jarní.               |        |
| Endivie viz čekanka štěrčák.                             |        |
| Erpetle viz lilek brambor.                               |        |
| Fenykl obecný . . . . .                                  | 47     |
| Fijalka vonná viz violka vonná.                          |        |
| Hadí jazyk obecný, hadí jazyček . . . . .                | 48     |
| Hadí-jazyk viz špatka.                                   |        |
| Hadí kořen, hadovec viz rdesno.                          |        |
| Hadí mléčí viz pryšec chvojka.                           |        |
| Hadí mord španělský a nízký . . . . .                    | 48     |
| Hádnec obecný . . . . .                                  | 49     |
| Halucha, kmín vodní . . . . .                            | 49     |
| Heřmánek pravý obecný . . . . .                          | 50     |
| Heřmánek římský . . . . .                                | 51     |
| Hysop viz Isop.  |        |
| Hlaváček jarní . . . . .                                 | 51     |
| Hlavatice viz brukev.                                    |        |
| Hlavuška viz černohlávek obecný.                         |        |
| Hlístník viz zemězluč.                                   |        |
| Hlízník viz chřastavec polní.                            |        |
| Hlízní koření viz krtičník hlíznatý.                     |        |
| Hloh obecný . . . . .                                    | 51     |
| Hluchavka bílá . . . . .                                 | 52     |
| Hořčice bílá . . . . .                                   | 52     |
| Hořčice černá . . . . .                                  | 52     |
| Hořec tolitový, modrý . . . . .                          | 53     |
| Hořec šumavský, červený, český,<br>uherský . . . . .     | 53     |
| Hořepník uherský viz hořec šu-<br>mavský.                |        |
| Hořký traňk viz podražec.                                |        |
| Hromové koření, hromok viz chřest.                       |        |
| Hruštička menší, prostřední a okrou-<br>hlostá . . . . . | 54     |
| Husí mýdlo viz mochna husí.                              |        |
| Husí nožka, nožka viz kontryhel.                         |        |
| Hvězdoš viz kontryhel.                                   |        |
| Hvězdoš viz plicník.                                     |        |
| Hvozdík lesní . . . . .                                  | 55     |
| Hvozdík zahradní, plný, hvozdíček<br>hvozdíčka . . . . . | 55     |
| Chbez, chbeza viz bez chebd.                             |        |
| Chebdi viz bez chebd.                                    |        |
| Chébz viz bez černý.                                     |        |
| Chleběk viz bramborík obecný.                            |        |
| Chlupáček viz jestřábník chlupáček.                      |        |
| Chmel obecný . . . . .                                   | 56     |
| Chobzda viz bez chebd                                    |        |
| Chřastavec polní . . . . .                               | 56     |
| Chřest obecný . . . . .                                  | 57     |
| Chřpa polní, rolní, chřpa, charpa . . . . .              | 57     |
| Chřstavec viz rdesno truskavec.                          |        |
| Chudobka viz sedmikráska.                                |        |
| Chvoj, chvoť viz jedle borovice.                         |        |
| Ibišek viz proskurník.                                   |        |
| Jablečník obecný . . . . .                               | 58     |
| Jablko líčí viz mochný.                                  |        |
| Jablko zlaté viz lilek, rajské jablko.                   |        |
| Jahoda viz jahodník                                      |        |
| Jahoda zelená viz meruzalka srstka.                      |        |
| Jahodník viz moruše.                                     |        |
| Jahodník obecný, pospolitý . . . . .                     | 59     |
| Jalovec obecný . . . . .                                 | 59     |
| Janofit viz janovec.                                     |        |
| Janovec viz kručinka.                                    |        |
| Janolika viz anjelika.                                   |        |
| Janovec vřetník, metlatý . . . . .                       | 60     |
| Jarec viz ječmen.  |        |
| Jarmaz viz brukev.                                       |        |

| Strana  | Strana |  |    |
|---|--------|--|----|
| <i>Jasan manový</i> . . . . .                 | 61     | <b>Kolovratec, cypřišový viz pryšec</b>      |    |
| <i>Jasan ztepilý, jasan, jesen</i> . . . . .  | 60     | <b>chvojka</b>                               |    |
| <i>Jasmín obecný</i> . . . . .                | 62     | <i>Komonice lékařská, česká</i> . . . . .    | 77 |
| <i>Jaterník trojlaločný</i> . . . . .         | 62     | <b>Kondolík viz kontryhel.</b>               |    |
| <i>Ječmen obecný, čtyřřadý, čtverořadý</i>    | 62     | <i>Koniklec luční, visutý</i> . . . . .      | 78 |
| <i>Jedle</i> . . . . .                        | 63     | <i>Koniklec obecný, pravý</i> . . . . .      | 79 |
| <i>Jehlice trnitá, obecná</i> . . . . .       | 65     | <i>Konitrud lékařský</i> . . . . .           | 80 |
| <b>Jelení kořen viz smládník alsatský.</b>    |        | <i>Konopě setá</i> . . . . .                 | 80 |
| <b>Jelení akok, růžek viz plavuň.</b>         |        | <i>Konopice huňatá, hlinožlutá</i> . . . . . | 81 |
| <b>Jelení traňk viz srpek barvířský.</b>      |        | <b>Koňské kopyto viz blatouch.</b>           |    |
| <b>Jelcha, jelše viz olše lepká.</b>          |        | <b>Koňské kopyto viz podběl.</b>             |    |
| <i>Jeřáb obecný, jeřabina</i> . . . . .       | 65     | <i>Kontryhel obecný</i> . . . . .            | 81 |
| <b>Jesenka viz třemdava.</b>                  |        | <i>Konvalinka vonná, obecná</i> . . . . .    | 92 |
| <i>Jestřábník okoličnatý</i> . . . . .        | 66     | <i>Kopytník obecný</i> . . . . .             | 82 |
| <i>Jestřábník zední</i> . . . . .             | 67     | <b>Kopr vlášský viz fenykl obecný.</b>       |    |
| <b>Jetel neb dětel vodní, hořký, troj-</b>    |        | <i>Kopr zahradnický, koprek</i> . . . . .    | 83 |
| <b>listý viz yachtá.</b>                      |        | <i>Kopretina řimbaba</i> . . . . .           | 84 |
| <b>Jetelice viz janovec.</b>                  |        | <b>Kopřiva hluchá, mrtvá viz hlu-</b>        |    |
| <i>Jilm polní, jilem, jilma</i> . . . . .     | 67     | <b>chavka bílá.</b>                          |    |
| <b>Jirovec viz kaštan.</b>                    |        | <i>Kopřiva velká, dvoudomá, obecná,</i>      |    |
| <i>Jitrocel kopinatý, špičatý, menší</i> . .  | 67     | <i>pálivá, větší</i> . . . . .               | 84 |
| <i>Jitrocel prostřední</i> . . . . .          | 68     | <b>Kopřivník viz kokotice.</b>               |    |
| <i>Jitrocel větší</i> . . . . .               | 68     | <i>Koprník úzkolistý</i> . . . . .           | 85 |
| <b>Jitrocel vodní viz žabník.</b>             |        | <i>Koryandr setý, obecný, koliandr</i> . .   | 86 |
| <b>Jmélí dubové, zluře, hnědé viz</b>         |        | <i>Kosatec žlutý, vodní, kosáč</i> . . . . . | 87 |
| <b>ochmet.</b>                                |        | <i>Kostival lékařský</i> . . . . .           | 88 |
| <i>Jméli obecné, bílé, jmél, jmela</i> . .    | 68     | <b>Kostrounek viz medvědice.</b>             |    |
| <b>Kadeřávek viz brukev.</b>                  |        | <del><i>Kotvice uplácená</i></del> . . . . . | 88 |
| <i>Kakost luční a krvavý</i> . . . . .        | 69     | <i>Kozi brada luční, kozi bradka</i> . . . . | 89 |
| <i>Kakost smrdutý</i> . . . . .               | 68     | <i>Kozi brada východní, větší a fialová</i>  | 89 |
| <b>Kakuška viz sedmikráska.</b>               |        | <b>Kozi brada, barva viz kručinka.</b>       |    |
| <i>Kamejka lékařská, kamýka</i> . . . . .     | 69     | <b>Kozi bradka viz stračka.</b>              |    |
| <i>Kamzičník rakouský</i> . . . . .           | 70     | <b>Kozi list viz zimolez.</b>                |    |
| <b>Kaní prádlo viz kokotice.</b>              |        | <i>Kozi list německý</i> . . . . .           | —  |
| <b>Kaňka viz kokotice.</b>                    |        | <i>Kozlík lékařský, menší obecný</i> . . . . | 90 |
| <i>Kaprad samec</i> . . . . .                 | 71     | <b>Křemelák viz dub lesní.</b>               |    |
| <b>Kapusta viz brukev</b>                     |        | <i>Křen polní, obecný</i> . . . . .          | 90 |
| <b>Karafiát, karafilát viz hvozdík lesní.</b> |        | <b>Krevníček viz třezalka.</b>               |    |
| <b>Karfiol viz brukev.</b>                    |        | <b>Křín, kryn viz lilije bílá.</b>           |    |
| <b>Kaštan koňský, divoký, hořký</b> . . . .   | 72     | <b>Křížek viz třezalka.</b>                  |    |
| <i>Kerblík setý obecný</i> . . . . .          | 73     | <b>Kropáček viz prvosenka.</b>               |    |
| <b>Kerlnbny viz brukev.</b>                   |        | <i>Krtičník hližnatý, krtičné koření</i> . . | 91 |
| <b>Kychavka viz čemerice černá.</b>           |        | <i>Krtičník čtyřkrídlý, krtičník vodní</i>   | 91 |
| <i>Kýprej obecný</i> . . . . .                | 74     | <b>krtičník menší viz orsej.</b>             |    |
| <b>Kýšenec viz koryander setý.</b>            |        | <i>Kručinka barvířská</i> . . . . .          | 92 |
| <i>Kyvor lékařský, obecný</i> . . . . .       | 74     | <b>Krušiček viz měsíček.</b>                 |    |
| <b>Kmín černý viz černucha setá.</b>          |        | <i>Krušina obecná</i> . . . . .              | 92 |
| <b>Kmín černý planý viz černucha za-</b>      |        | <i>Krvavec obecný</i> . . . . .              | 93 |
| <b>hradní</b>                                 |        | <b>Krvavé koření viz toten lékařský</b>      |    |
| <i>Kmín luční, kmín</i> . . . . .             | 75     | <b>Krvavé koření menší viz krvavec</b>       |    |
| <b>Kmín vodní viz halucha.</b>                |        | <b>obecný.</b>                               |    |
| <i>Kokořík mnohokvětý, větší</i> . . . . .    | 76     | <b>Krvavnice viz kyprej.</b>                 |    |
| <i>Kokořík obecný, menší</i> . . . . .        | 75     | <b>Krvovník viz vlastovičnick větší.</b>     |    |
| <b>Kokornák viz kokořík.</b>                  |        | <b>Kndravec viz merlík.</b>                  |    |
| <b>Kokornák viz podražec.</b>                 |        | <i>Kuklík obecný, lékařský</i> . . . . .     | 93 |
| <i>Kokoška pospolitá, kokoška</i> . . . . .   | 76     | <i>Kuklík potoční</i> . . . . .              | —  |
| <i>Kokotice menší</i> . . . . .               | 77     | <b>Kuří mor viz drchnička rolní.</b>         |    |
| <i>Kokotice větší, obecná, kokoti hace</i>    | 76     | <b>Kuří noha viz šrucha obecná.</b>          |    |
| <b>Kolocír viz vraní nožka.</b>               |        | <i>Kustovnice obecná, slabá</i> . . . . .    | 94 |

| Strana  | Strana  |
|---|---|
| Kvaka viz cvikla.   | Medvědí lapa viz plavuň.                                    |
| Květél viz lnice.   | Medvědice lékařská . . . . . 113                            |
| Květina viz kručinka.   | Meduňka lékařská, medunice . . . 113                        |
| Lalije, lalia, lalijsa, laluje viz lilije<br>bílá.              | Mejlí, mylí, mélí viz jmělí.                                |
| Lavandule obecná, levandule . . . . 94                          | Melisa viz meduňka.   |
| Lebeda lesklá, divoká . . . . . 95                              | Meloun viz tykev obecná.                                    |
| Lebeda zahradní . . . . . 95                                    | Merlík vonný . . . . . 114                                  |
| Leknín bělostlý, lekní, lekno bílé,<br>lekutí . . . . . 95      | Méružalka červená, černá, horská, a<br>srstka . . . . . 114 |
| Lekno žluté, lekuta žlutá viz stulík.                           | Měsíček viz blatouch.                                       |
| Len matky boží viz lnice.                                       | Měsíček zahradní . . . . . 116                              |
| Len setý . . . . . 97   | Měchuňka viz mochyně.                                       |
| Libeček lékařský . . . . . 98                                   | Mydlíce lékařská . . . . . 117                              |
| Libeček jelení viz smlodník jelení.                             | Myší dřevo viz lilek.                                       |
| Líčidlo viz kokofík mnohokvětý.                                 | Myš ouško viz jestřábník.                                   |
| Ličok viz břechtan.   | Mýšinec viz užanka.   |
| Lýkovec obecný, lékařský . . . . . 99                           | Mléč hladký, ostrý a polní . . . . 117                      |
| Lilek brambor . . . . . 102                                     | Modrák viz chrpa polní.                                     |
| Lilek obecný, menší, černý . . . . 101                          | Modřín, modřev viz jedle modřín.                            |
| Lilek rajske jablko . . . . . 103                               | Mochyně boborolka . . . . . 118                             |
| Lilek sladkohořký . . . . . 100                                 | Mochna husí . . . . . 119                                   |
| Lilije viz denívka.   | Mochna lesní . . . . . 119                                  |
| Lilie bílá . . . . . 105  | Mochna stříbrná, plavivá a bílá . . 120                     |
| Lilije zlatá viz denívka žlutá.                                 | Moří noha viz plavuň.                                       |
| Lilije žlatohlavá . . . . . 104                                 | Moruše černá a bílá . . . . . 120                           |
| Lipa malolistá, skalní, zimní . . . 105                         | Mudatka viz vstavač obecný.                                 |
| Líšej viz kokotice.   | Mužská víra viz máčka polní.                                |
| Lnice obecná . . . . . 106                                      | Nadrahule, nadragula viz aron.                              |
| Locika zahradní . . . . . 107                                   | Narcisek, narcis, narcisová růžička 120                     |
| Lomihnat viz starček obecný.                                    | Nátržník viz mochna.  |
| Lomikamen viz hedrník obecný.                                   | Nebeský dar viz vlašovičník větší.                          |
| Lomikamen trojlaločný . . . . . 108                             | Nedvědice viz medvědice.                                    |
| Lomikamen zrnatý, bílý . . . . . 107                            | Neštovičné koření viz krtičník hlíz-<br>natý.               |
| Lopuch pavučinatý, pístnatý . . . . 108                         | Netřesk nejmenší viz rozchodník.                            |
| Maceška, macoška (polní a za-<br>hradní) viz viola trojbarevná. | Netřesk střešní . . . . . 121                               |
| Máčka polní, máčka . . . . . 109                                | Nevaza viz chrpa polní.                                     |
| Maďal viz kaštan.   | Odolen viz kozlík.  |
| Malinník obecný, malina, maliny . . 110                         | Ohníček viz mák vlčí.                                       |
| Manový strom viz jasan manový.                                  | Ochmet evropský, jmélovitý . . . . 121                      |
| Mařena planá viz mařinka vonná.                                 | Okurka viz tykev obecná.                                    |
| Mařena zahradní, mořena, mořenka<br>viz mařina.                 | Olše lepká, obyčejná, olše, olcha . 122                     |
| Mařina barvířská . . . . . 110                                  | Oman pravý, lékařský . . . . . 123                          |
| Mařinka vonná . . . . . 111                                     | Omejlí viz jmělí.   |
| Marjánka viz dobromysl voněkras.                                | Omylník viz kopytník.                                       |
| Marule, marulka viz meduňka.                                    | Opletník plotní viz svlačec větší.                          |
| Marunka viz kopretina.  | Oponec obecný, openec . . . . . 124                         |
| Maruše viz moruše.  | Ořechovec viz pór.  |
| Máslenka viz blatouch.  | Ořešák, ořech královský, vlašský . . 124                    |
| Máta kadeřavá . . . . . 112                                     | Orlíček obecný . . . . . 125                                |
| Máta pepřná . . . . . 112                                       | Ormánek viz heřmánek pravý.                                 |
| Máta polej . . . . . 112  | Orsej jarní . . . . . 126                                   |
| Matečník viz kopretina.   | Osladič obecný, osladěč . . . . . 127                       |
| Matečník viz meduňka.   | Oslýš viz svlačec rolní.                                    |
| Matečník menší viz sedmikráska.                                 | Ostropes, ostropestr, ostropec viz<br>ostropestřec obecný.  |
| Mateří douška viz douška.                                       | Ostropestřec obecný . . . . . 127                           |
| Mateří líčko viz toten lékařský.                                | Ostrožka polní viz stračka.                                 |

| Strana   | Strana |
|--|--------|
| Ostružinník, ostružiny viz malin-<br>ník ostružinník.                                  |        |
| Oves setý, pospolitý . . . . .   | 128    |
| Ořanka čpavá, česneková . . . . .  | 129    |
| Paldrián viz kozlík.   |        |
| Pampalík viz měsíček.  |        |
| Pampeliška, pampališka viz sme-<br>tanka.  |        |
| Pastuší tobolka viz kokoška.   |        |
| Pasvice obecná viz lilek rajske ja-<br>blko.   |        |
| Pařík viz česnek.  |        |
| Pěchovec viz krtičník hlíznatý.  |        |
| Pelyněk černobýl . . . . .   | 129    |
| Pelyněk dřevinka . . . . .   | 130    |
| Pelyněk pravý, peluň, peluňka, pe-<br>lynka . . . . .                                  | 129    |
| Penízek vinutý viz vršina penízková.   |        |
| Penízková bylina viz vršina pe-<br>nízková.  |        |
| Peprá vlčí, divoký viz lýkovec.  |        |
| Perlíček viz konvalinka.   |        |
| Perlokvět viz konvalinka.  |        |
| Pétilistek červený viz zábělník ba-<br>henní.  |        |
| Petrklíč, Petrův klíč viz prvosenka.   |        |
| Petržel kuchyňská, petružel petruška   | 180    |
| Píďil lékařský . . . . .   | 180    |
| Pýr plazivý . . . . .  | 181    |
| Pivoňka lékařská, pivoňková růže   | 181    |
| Plamének přímý . . . . .   | 182    |
| Plamének plotní, celolistý . . . . .   | 183    |
| <del>Plamének plotní, celolistý</del>  | 184    |
| Plešnivec viz protěž písečná.  |        |
| Pleška obecná viz smetanka.  |        |
| Pletich viz štovík.  |        |
| Plticuk obecný, lékařský . . . . .   | 135    |
| Podběl obecný . . . . .  | 185    |
| Podkovka viz podběl.   |        |
| Podleška viz prvosenka.  |        |
| Podleška, podleška, podliška viz<br>jaterník.  |        |
| Podražec obecný, dlouhý . . . . .  | 136    |
| Podražec okrouhlý viz dymnivka<br>dutá.  |        |
| Podstfel viz ostropestřec obecný.  |        |
| Polej viz máta polej.  |        |
| Polyněk, polýnek viz pelyněk.  |        |
| Popenec, poponec viz oponec.   |        |
| Pór zahradní, zimní, pór viz česnek.   |        |
| Portulák viz šrucha obecná.  |        |
| Posed černý . . . . .  | 136    |
| Potěšení očí viz světlík.  |        |
| Potočnice viz vrba.  |        |
| Potočnice lékařská . . . . .   | 137    |
| Požár viz sevlák širolistý.  |        |
| Přeslička bahenní, lesní a mokřadní  | 188    |
| Přeslička polní, přeslice, přeslička   | 187    |
| Přetržník viz mochna.  |        |
| Prha chlumní . . . . .   | 138    |
| Prhlavka, prhlínka viz kopřiva<br>veliká.  |        |
| Proskurník lékařský . . . . .  | 140    |
| Proteř písečná . . . . .   | 141    |
| Prstovec viz šíšvovec.   |        |
| Prustovec viz šíšvovec.  |        |
| Pryskýrník viz plamének.   |        |
| Pryšec chvojka . . . . .   | 140    |
| Pryšec obecný . . . . .  | 139    |
| Prvníčka viz prvosenka.  |        |
| Prvosenka obecná . . . . .   | 141    |
| Přímětné koření menší viz starček<br>obecný.   |        |
| Přímětník viz starček přímětník.   |        |
| Přitržník, přitrní koření viz roz-<br>razil lékařský.                                  |        |
| Přítula viz svízel obecný.   |        |
| Psí jazyk viz užanka.  |        |
| Psí víno, hrozno viz lilek obecný.   |        |
| Psí víno červené viz lilek.  |        |
| Psinky vodní, modré, červené viz<br>lilek.   |        |
| Pšenice obecná . . . . .   | 142    |
| Pláč zob, obecný . . . . .   | 142    |
| Pupava bílá . . . . .  | 143    |
| Puškovec viz šíšvovec.   |        |
| Ráček živý, černý viz židava.  |        |
| Radostka viz proteř písečná.   |        |
| Rajské jablko viz lilek.   |        |
| Ranné koření viz sadec konopáč.  |        |
| Ranník viz zběhovec plazivý.   |        |
| Ranocel viz jitrocel kopinatý.   |        |
| Rdesno hadí kořen . . . . .  | 144    |
| Rdest vzplývavý, vodní . . . . .   | 145    |
| Řebříček obecný . . . . .  | 145    |
| Řepíček viz řepík lékařský.  |        |
| Řepík lékařský . . . . .   | 146    |
| Řeřicha potoční viz potočnice.   |        |
| Řeva vinná . . . . .   | 146    |
| Rybíz, rybezky, rybízle, rybíz smra-<br>dlavý, černý, hluchý a planý viz<br>meruzalka. |        |
| Rytířská ostruha viz stračka.  |        |
| Řimbaba obecná viz kopretina.  |        |
| Rmen viz hermánek pravý.   |        |
| Rojovník viz meduňka.  |        |
| Rojovník viz netřesk.  |        |
| Rojovník bahenní . . . . .   | 147    |
| Rosa slunečná viz rosníčka okrou-<br>hlohlístá.  |        |
| Rozmarina obecná . . . . .   | 148    |
| Rovnatka viz rovnička okrouhlohlístá.  |        |
| Rosnička dlouhlohlístá . . . . .   | 148    |
| Rosnička obvejčitá . . . . .   | 148    |
| Rosnička okrouhlohlístá . . . . .  | 148    |
| Roupové koření viz lomikamen<br>zrnatý.  |        |
| Roupové koření, rounník viz orsej.   |        |



Strana

|  |     |
|--|-----|
| <i>Routa obecná, domácí zahradní</i> , . . . . .           | 149 |
| <i>Routička</i> pospolitá viz zemědělm.                    |     |
| <i>Rozchodník ostrý</i> . . . . .                          | 149 |
| <i>Rozrazil lékařský</i> , . . . . .                       | 150 |
| Rozrazil viz luice.  |     |
| <i>Rozrazil potoční, rozrazilka</i> . . . . .              | 151 |
| Rukev, řechica viz potočnice.                              |     |
| Rupík viz pryšec obecný.                                   |     |
| Rutka polní viz zemědělm.                                  |     |
| <i>Růže nízká, plazivá</i> . . . . .                       | 151 |
| <i>Růže stolistá</i> . . . . .                             | 151 |
| Růže z Jericha viz zimolez, kozí liat.                     |     |
| <i>Sadec konopáč, konopěvec</i> . . . . .                  | 151 |
| Salát hlávkový viz locika.                                 |     |
| Satorye, satoroje viz čibr.                                |     |
| <i>Sedmikráska ozimá, sedmikráska</i> . . . . .            | 152 |
| <i>Sevlák šírolistý</i> . . . . .                          | 153 |
| Sinokvět viz chrpa polní.                                  |     |
| Syrečky viz slez okrouhlostý.                              |     |
| Syřistová bylina viz svízel syřistový.                     |     |
| Skelní bylina viz drnavec lékařský.                        |     |
| Skorocel viz přeslička polní.                              |     |
| Skřib viz přeslička polní.                                 |     |
| Sladčec viz svlačec rolní.                                 |     |
| Sladká hořká viz lilek sladkohořký.                        |     |
| Sladuška viz osladič.                                      |     |
| <i>Slez okrouhlostý, zaječí</i> . . . . .                  | 153 |
| Slez vysoký viz proskurník.                                |     |
| <i>Slez zahradní, římský</i> . . . . .                     | 154 |
| <i>Smetanka obecná</i> . . . . .                           | 154 |
| Smil písečný viz protěž písečná.                           |     |
| <i>Smlánek alsatský, obecný</i> . . . . .                  | 155 |
| <i>Smlánek jelení</i> . . . . .                            | 155 |
| Smrádky viz meruzalka černá.                               |     |
| Smrk, smrček, smrčka, smrč, smerek, smrek viz jedle, smrk. |     |
| Sosna viz jedle.   |     |
| <i>Sporyš lékařský</i> . . . . .                           | 155 |
| <i>Srdečník obecný</i> . . . . .                           | 156 |
| Srník, srni kořen viz smlánek jelení.                      |     |
| <i>Srpek barviřský, srpek</i> . . . . .                    | 157 |
| Srstka viz meruzalka, srstka.                              |     |
| Starček viz řepík lékařský.                                |     |
| <i>Starček obecný</i> . . . . .                            | 158 |
| <i>Starček přímětník</i> . . . . .                         | 158 |
| Stínavec viz kručinka.                                     |     |
| Strachů nůžka viz strážka.                                 |     |
| <i>Strážka polní</i> . . . . .                             | 158 |
| <i>Střemcha obecná</i> . . . . .                           | 159 |
| Stříbrník viz mochna husí.                                 |     |
| Střelice viz drnavec lékařský.                             |     |
| <i>Stůlík šuplík bílý</i> viz leknín.                      |     |
| <i>Stůlík žlutý, stůlík</i> . . . . .                      | 159 |
| Svalník královský viz strážka.                             |     |
| Svalník menší viz černohlávek obecný.                      |     |
| Svalník prostřední viz zběhovec plazivý.                   |     |

Herbál.

Strana

|   |     |
|---|-----|
| Svalník větší viz kostival.                                   |     |
| Sv. Ducha kořen viz domélice černá.                           |     |
| Sv. Jana pás viz plavůň.                                      |     |
| Sv. Kunigundy traňk viz sadec konopáč.                        |     |
| Svatojanské jahůdky viz meruzalka červená.                    |     |
| Světlák viz chrpa polní.                                      |     |
| <i>Světlíce barviřská</i> . . . . .                           | 160 |
| <i>Světlík lékařský</i> . . . . .                             | 161 |
| Sviňský kořen viz krtičník hlízanatý.                         |     |
| Sviňský kořen samice viz krtičník čtyřkřídlý.                 |     |
| Sviňský ořech viz brambořík obecný.                           |     |
| <i>Svízel obecný</i> . . . . .                                | 161 |
| <i>Svízel syřistový</i> . . . . .                             | 162 |
| <i>Svlačec rolní, menší</i> . . . . .                         | 162 |
| <i>Svlačec větší, plotní</i> . . . . .                        | 163 |
| Safrán planý viz světlíce barviřská.                          |     |
| <i>Salvěj lékařská, obecná</i> . . . . .                      | 163 |
| Šeřmík viz jasmín obecný.                                     |     |
| <i>Šípatka vodní</i> . . . . .                                | 164 |
| Šípenka obecná viz šípatka.                                   |     |
| <i>Šišovec obecný</i> . . . . .                               | 164 |
| Šlakové koření viz prha.                                      |     |
| Šnitlík viz pažitka.  |     |
| Špika lesní viz kopytník.                                     |     |
| <i>Šrucha obecná</i> . . . . .                                | 165 |
| Štěrbák viz čekanka, štěrbák.                                 |     |
| Štípet viz chřest.  |     |
| <i>Štovník tupolistý, koňský</i> . . . . .                    | 165 |
| Štukovec, štukavice, štukavka, štíkovec viz rdesno truskavce. |     |
| <i>Tamaryšek obecný, pravý</i> . . . . .                      | 166 |
| <i>Taška bílá</i> viz leknín.                                 |     |
| <i>Taška žlutá</i> viz stůlík.                                |     |
| <i>Tykev obecná</i> . . . . .                                 | 166 |
| Tymián viz douška vlašská.                                    |     |
| Toito viz máčka polní.  |     |
| <i>Toilita lékařská</i> . . . . .                             | 167 |
| Poloměnka viz medvědice.                                      |     |
| <i>Topol balzámový</i> . . . . .                              | 167 |
| <i>Topol bílý</i> . . . . .                                   | 168 |
| <i>Topol černý</i> . . . . .                                  | 168 |
| <i>Toten lékařský, toten, tosten</i> . . . . .                | 168 |
| Traňk zběhový, drabský viz zběhovec plazivý.                  |     |
| Třebník viz bedrník obecný.                                   |     |
| Třebule zahradní viz kerblík setý.                            |     |
| <i>Třemdava bílá, třemdala, třemdava</i> . . . . .            | 168 |
| <i>Třezalka čtyřkřídla a čtyřhranná</i> . . . . .             | 169 |
| <i>Třezalka tečkovaná</i> . . . . .                           | 169 |
| <i>Trnka, trnky, trn</i> . . . . .                            | 169 |
| Trojan vodní viz vachta.                                      |     |
| Trojice vodní viz vachta.                                     |     |
| Trojlistník, třílistník viz vachta.                           |     |
| Trpka viz střemcha.   |     |
| Tržené koření viz mochna.                                     |     |

14

| Strana  | Strana   |
|---|--|
| Trzník viz rozrazil lékařský.                     | Vrbka sladká viz lilek.                                  |
| Trudovnsk viz krtičník hlíznatý.                  | Vstavač mužský, samčí . . . . . 178                      |
| Truskavec viz rdesno.                             | Vstavač obecný . . . . . 177                             |
| Tučný muštk viz rozchodník.                       | Všedobr horní . . . . . 178                              |
| Tulipán viz narcisek.                             | Ysop lékařský . . . . . 179                              |
| Turek viz tykev obecná.                           | Zábělník bahenni . . . . . 179                           |
| Tvář sv. Jana viz aron.                           | Zádušník viz oponec.                                     |
| Tvarožina viz brambořík obecný.                   | Zapomenutka viz sedmikráska.                             |
| Úložník viz rozrazil lékařský.                    | Zasevratec viz vratička obecná.                          |
| Užanka lékařská . . . . . 170                     | Závojek viz lilie zlatohlavá.                            |
| Užovník viz rdesno.                               | Zběhovec plazivý . . . . . 180                           |
| Vachta třílistá . . . . . 170                     | Zelí hlavaté a kaďefavé viz brukev.                      |
| Vančar, vanžar viz dřístal.                       | Zelice viz brukev obecná.                                |
| Včelník viz meduňka.                              | Zemědým lékařský . . . . . 180                           |
| Veronika viz rozrazil lékařský.                   | Zemče viz lilek brambor.                                 |
| Větrník viz máčka polní.                          | Zemská pára viz zemědým.                                 |
| Vídlák viz plavuň.                                | Zemské jablko viz lilek brambor.                         |
| Víno viz réva vinná.                              | Zeměluč obecná, lékařská, menší . 181                    |
| Víno sv. Jana viz meruzalka červená.              | Zimák, zimnák viz dub zimní.                             |
| Violka trojbarevná, trojičná, trojice 172         | Zimnař viz jasan manový.                                 |
| Violka vonná, modrá . . . . . 172                 | Zimolez, kozi list . . . . . 182                         |
| Višně mořská, židovská viz mochyňé.               | Zimolez obecný, zimolýz, zimolejz, zimoláz . . . . . 183 |
| Vítečník viz janovec.                             | Zlatá metla viz zlatobýl.                                |
| Vitod obecný . . . . . 173                        | Žlatobýl obecný . . . . . 184                            |
| Vlačeha viz plavuň.                               | Zlatohlávek viz lilie zlatohlavá.                        |
| Vlašský bedrník viz krvavec obecný                | Zlobice viz drnavec lékařský.                            |
| Vlaštovičník viz tolita.                          | Zminec viz aron.   |
| Vlaštovičník větší . . . . . 173                  | Zvoneček, zvonec viz třezalka.                           |
| Vlčí lýko větš viz lýkovec.                       | Zvonek kuchyňský viz koniklec.                           |
| Vlkové jablko viz podražec.                       | Žabník jitrocelový . . . . . 184                         |
| Vlstek viz libeček.                               | Žadovník viz douška.                                     |
| Vodní lilium bílé viz leknín.                     | Žáhavka viz kopřiva veliká.                              |
| Vodní ořech viz kotvice zplývavá.                 | Žanykl, zanykl viz žindava.                              |
| Vodní růže bílá viz leknín.                       | Železník viz sporýš.                                     |
| Vodní růže žlutá viz stulík.                      | Ženikleit viz žindava.                                   |
| Volový jazyk viz pilát lékařský.                  | Žezhulka viz vstavač obecný.                             |
| Volský neb volový jazyk planý viz hadinec obecný. | Židovinník tuhý viz tamaryšek obecný.                    |
| Voman viz oman.                                   | Židovská třešně viz mochyňé.                             |
| Voponec, vopenec viz oponec.                      | Žindava evropská . . . . . 185                           |
| Vorlíček viz orlíček.                             | Žlutá tolita viz blatouch.                               |
| Vrabí símě viz kamejka.                           | Žluták viz blatouch                                      |
| Vraní nožka, vraní noha . . . . . 175             | Žlutidlo viz kručinka.                                   |
| Vrat se zase viz vratička obecná.                 | Žlutucha jednoduchá . . . . . 186                        |
| Vrátič obecný . . . . . 175                       | Žlutucha luční . . . . . 186                             |
| Vratička obecná . . . . . 176                     | Žlutucha menší . . . . . 186                             |
| Vrba bílá . . . . . 176                           | Žlutucha orličkovitá . . . . . 186                       |
| Vrbice, vrbina viz kyprej.                        | Žlutucha smrdutá . . . . . 186                           |
| Vrbina penízková . . . . . 177                    | Žlutucha úzkolistá . . . . . 186                         |
| Vrbina obecná . . . . . 177                       |  |

## Seznam rostlin nebezpečných.

|  | Strana |  | Strana |
|--|--------|--|--------|
| <i>Bílá černý, blín, blen . . . . .</i>  | 190    | <i>Náprstník červený . . . . .</i>   | 189    |
| <i>Bolehlav bílamatý, bolehlav . . . . .</i>   | 189    | <i>Ocún jesenní, ocún, naháč, oconn,<br/>luční matečník, jeseňka, naháček,<br/>popovo moudí, zimovít . . . . .</i> | 190    |
| <i>Chvojka, klášterská, rajská, rýnská;<br/>břínka, možucha, netáta . . . . .</i>  | 190    | <i>Oměj šalamunek, šalamounek, zlý<br/>mníšek, mordovník, svolina . . . . .</i>                                    | 188    |
| <i>Kýchavice bílá, kýchavka . . . . .</i>  | 189    | <i>Rulík jedovatý zlomocný, lilík, ně-<br/>mnice, nadragula . . . . .</i>  | 189    |
| <i>Mák vlčí, pleskanec ohníček, tle-<br/>skanec, panenka. Mák pohní neb<br/>rolní, mák pochybný neb malo-<br/>kvěťý, mák setý neb snodárný . . . . .</i> | 191    | <i>Vraní oko, vranovec čtyřlístý . . . . .</i>   | 191    |

## Seznam nemocí.

Číslice naznačuje vždy rostlinu, která proti jmenované nemoci se užívá; na př. proti běhavce pod číslem 12 dle abecedního pořádku najde se 12. Brusnice borůvka, proti blednici pod č. 145c. Pelyněk dřevinka atd.

- Běhavka* 12, 31, 34, 35, 45, 60, 62, 67, 73, 84, 87, 89, 106, 118, 130, 134, 147, 158, 163, 166, 167, 169, 207, 208, 215.  
*Bělouk* 20, 28, 34, 36, 41, 43, 58, 60, 62, 64, 65, 71, 73, 76, 81, 84, 103, 106, 109, 123, 130, 136, 164, 166, 168, 180, 195, 208, 209, 213, 215, 216, 224, 229.  
*Blednice* 17, 45, 52, 102, 136, 145c, 154, 168, 197.  
*Bolesti v bedrách* 38, 110b.  
*Bolesti v kyčlích* 13, 89, 110b, 142, 150, 224.  
*Bolesti v ledvích* 13, 38, 110b.  
*Bolesti v těle* 66, 82, 91, 97, 110b, 129.  
*Bradavice* 3, 126, 159, 175, 212.  
*Břicha bolení* 40, 57, 63, 110b, 224.  
*Břicha nadmutí, naduření* 5a, 19, 35, 53, 69, 75, 88, 172.  
*Čípek ochablý* 34, 130, 166, 195.  
*Čmýra nepravidelná (obtížná)* 7, 24, 88, 108, 111, 121, 188, 212.  
*Čmýra přílišná* 42, 77, 101, 118b, 157, 164, 168, 200, 229.  
*Čmýra zadržaná (zastavená)* 3, 4, 8, 9, 17, 21d, 23, 28, 80, 90, 91, 97, 117, 119, 139, 142, 145c, 149, 165, 172, 174, 178, 180, 185, 202, 219.  
*Dýchavičnost* 2, 23, 28, 44, 121c, 124, 136, 153, 155, 220, 225.  
*Dna* 14, 45, 54, 60, 68, 82, 97, 105, 109, 111b, 112, 116, 127, 132, 134, 141, 154, 155, 158, 167, 171, 179, 184, 198, 201, 203, 209, 212, 223, 224.  
*Dušnost* 2, 5a, 5b, 91, 95, 128, 173, 176, 183.  
*Filky* 87, 98, 186, 212.  
*Hysterie* 40, 121c, 122, 134, 145c, 149, 172, 174, 183, 214.  
*Hlavy bolení* 3, 11, 14, 18, 47, 86, 91, 110b, 125, 150, 162, 164, 170, 183, 198, 201.  
*Hlavnička* 1, 158, 219.  
*Hlísty* 2, 10, 15, 17, 21, 26, 45, 49, 69, 91, 96, 130b, 138, 144, 145, 161, 166b, 178, 188, 198, 209, 212, 214, 224.  
*Hlíza* 21d, 49, 111b, 134, 164.  
*Horečka* 13, 32, 59, 107, 118, 121, 125, 144, 148, 158, 201.  
*Hostec* 1, 2, 6a, 10, 45, 54, 60, 89, 109, 110, 112, 116, 122, 148, 158, 171, 184, 197, 203, 206.  
*Hryžení v břiše* 1, 19, 57, 72, 75, 87, 90, 111b, 117, 130b, 134, 139, 183.  
*Cholera* 168.  
*Chraplivost* 5b, 160, 173, 210, 218, 221.  
*Chrasty* 49, 60d, 98, 106, 118b, 151, 165, 170, 178, 198b, 199, 210.  
*Chrlení krve* 36, 65, 73, 77, 89, 93, 180b, 187, 157, 164, 166b, 184, 198, 200, 206, 208, 211, 213, 216, 217, 221.

- Kámen (vůbec)* 30, 42, 74, 94, 128, 157, 160, 165, 170, 188.  
*Kámen ledvinový* 10, 47, 72, 117, 118b, 142, 219.  
*Kámen močův* 10, 24, 61, 68, 95, 115, 125, 129, 139, 143, 166b, 180, 183, 194b, 226.  
*Kámen říční* 60, 212.  
*Kapavka* 65, 74, 77, 106b, 215.  
*Kašel* 5, 6, 23, 38, 35, 49, 52, 65b, 72, 80, 82, 83, 85, 105, 110, 114, 135, 137, 141, 149, 153, 157, 160, 159, 178, 188, 201, 208, 210, 218.  
*Kašel dušný* 6a, 21, 80, 121c, 171.  
*Křeče* 29, 40, 47, 88, 96, 104, 111b, 112, 114, 117, 121, 122, 124, 132, 134, 149, 172, 174, 183, 185, 205, 208, 214.  
*Křivice* 84, 119, 172, 197.  
*Krtice* 84, 45, 48, 69, 98, 110, 126, 138, 140, 150b, 153, 156, 196, 197, 202, 224.  
*Krvácení nosu* 19, 21, 77, 130b, 157, 166b, 193b, 198, 217, 221, 229.  
*Krve počištění* 13, 24, 43, 49, 116, 127, 128, 178, 199, 209.  
*Krvotok* 18, 34, 65, 67c, 71, 77, 84, 101, 102, 106, 118, 125, 130, 157, 166, 168, 180, 198, 204, 207, 209, 213, 216, 221, 222, 229.  
*Kurděje* 10, 21d, 32, 59, 62, 97, 106, 125, 138, 139, 140, 141, 156, 175, 176b, 195, 197, 198, 209, 217, 225, 227.  
*Kuří oka* 9, 91, 111b, 126, 133, 175.  
*Lišej* 17, 31, 38, 49, 55, 60d, 64, 80, 91, 103, 132, 165, 170, 199, 210, 212, 228.  
*Maso divoké* 17, 150.  
*Mdloba* 3, 47, 69, 126, 172.  
*Městky* 34, 130.  
*Mléka při kojení málo* 38, 87, 95, 128, 142.  
*Mléka při kojení mnoho* 190, 227.  
*Moč vypuzující léky* 3, 6b 15, 21d, 23, 24, 50, 53, 64, 74, 86, 87, 90, 99, 108, 116, 129, 130b, 145, 156, 157, 174, 178, 188, 189, 212.  
*Močení bílkovinné* 55, 97.  
*Močení krvavé* 58, 89, 123, 157.  
*Močení obtížné* 48, 53, 69, 90, 111, 149, 150, 151.  
*Močení palčivé, řezavé, kapavé* 63, 95, 106, 110b, 123, 128, 129, 149, 194, 198.  
*Močení zastavené* 33, 61, 91, 117, 123, 139, 142, 151, 161, 180, 185.  
*Mor* 7, 37, 49, 144, 165.  
*Moučník* 32, 112, 131, 133, 195.  
*Mrtvice* 17, 47, 158.  
*Nadýmání* 28b, 40, 45, 90, 104, 121, 145, 197.  
*Nádory (horké, zanícené, studené, tvrdé, krtičnaté a rakovité)* 27, 43, 76, 79, 82, 87, 91, 104, 105, 111, 117, 128, 143, 155, 167, 187, 201, 208.  
*Nemoce dásní* 13, 15, 32, 130, 135, 139, 166.  
*Nemoce dělohy a pomoc při porodu* 7, 57, 90, 111b.  
*Nemoce dýchadel* 1, 5b, 6a, 112, 136, 160, 211, 220, 228.  
*Nemoce duševní* 3, 16, 17, 45, 74, 78, 81, 104, 122, 155, 180, 182, 209, 223.  
*Nemoce jater* 45, 86, 95, 100, 106, 110c, 111b, 115, 141, 169, 201, 221.  
*Nemoce kostí* 26, 80, 81, 133, 223.  
*Nemoce ledvin* 90, 93, 106, 115, 123, 137, 141, 147, 156, 198, 201, 223, 226, 229.  
*Nemoce měchýře* 50, 61, 68, 90, 106, 107, 115, 123, 141, 151, 158, 183, 198, 226, 229.  
*Nemoce nervů* 14, 60d, 85, 96, 124, 149, 162, 172, 184, 216.  
*Nemoce plic* 1, 5a, 6a, 19, 27, 28, 39, 63, 83, 106, 109, 110c, 141, 152, 159, 176, 184, 220, 221, 228.  
*Nemoce prsní* 2, 21b, 22, 35, 49, 52, 63, 90, 136, 152, 153, 162, 176, 228.  
*Nemoce sleziny* 16, 45, 74, 86, 91, 100, 105, 147, 183, 200.  
*Nemoce ucha* 11, 15, 21b a d, 23, 33, 82, 128, 166b, 183, 193.  
*Nemoce údů* 80, 82, 90, 104, 108, 130b, 135, 136, 149, 179, 193b, 194, 221.  
*Nemoce úst a krku* 3, 5b, 6a, 13, 18, 19, 34, 40, 109, 118b, 135, 139, 143, 160, 169, 177, 195.  
*Nemoce žaludku* 1, 5a, 22, 58, 63, 75, 90, 110b, 121, 128, 186, 145, 148, 160, 187, 197, 209.  
*Neštovice modrá* 21d, 76.

- Nežít* 21d, 164, 227.  
*Oči křhavé* 3, 221.  
*Oči slabé* 11, 21d, 30, 37, 104, 172, 174.  
*Oči zakalené* 3, 21d, 23, 63b, 80, 92, 158, 170, 180, 212, 224.  
*Oči zanícené, zaplavené, vřbec bolavé* 3, 9, 10, 36, 40, 51, 63, 65, 80, 109, 110d, 129, 180b, 170, 177, 188, 192, 198, 201, 212, 221, 225.  
*Ochromení* 44, 89, 104, 109, 111b, 124, 155, 158, 172, 179, 185.  
*Opatení* 65, 82, 110c, 193b, 206.  
*Opružení* 60a, 60d, 151, 168.  
*Opuchliny* 21b, 40, 41, 87, 126, 201.  
*Ozýpky* 6a, 7, 64, 139, 164, 224.  
*Otekliny* 6a, 6b, 28b, 30, 36, 41, 60, 87, 91, 94, 106, 112, 117, 134, 155, 179, 186, 187, 194b, 200, 225, 227.  
*Otrávení* 8, 37, 84, 90, 165, 221.  
*Padůcnice* 14, 17, 112, 117, 184, 145b, 149, 155, 175, 183, 185.  
*Píhy* 10, 21b, 21d, 57, 76, 106, 130b, 132, 133, 224.  
*Písek močový* 24, 33, 118b, 123, 142, 166b, 226, 227.  
*Pištel* 23, 46, 47, 65, 101, 102b, 166b, 221.  
*Podlomky bradavek* 3, 151.  
*Posuncina* 124, 134.  
*Pot zaražený* 6b, 9, 23, 56, 108, 112, 189, 212.  
*Pot přílišný* 195.  
*Přijíce* 4, 24, 74, 109, 110, 150, 225.  
*Prsy po porodu naběhlé* 63b, 111, 190, 198.  
*Průjem* 12, 77, 98, 110, 130, 158, 163, 217, 218.  
*Psotník* 17, 221.  
*Rány* 9, 10, 11, 18, 20, 21b, 23, 30, 31, 33, 36, 46, 47, 60a, d, 63b, 65, 67b, c, 84, 95, 101, 102b, 111b, 132, 135, 144, 158, 164, 166b, 169, 178, 179, 186, 188, 190, 194, 201, 204, 206, 217, 221, 224, 225, 228, 229.  
*Rána kousnutí (psem)* 30, 47, 91, 208, 227.  
*Rána krvácející* 47, 77, 106, 157, 193.  
*Rýma* 30, 91, 224.  
*Růže* 6a, 9, 13, 33, 40, 67, 105, 106, 112, 157.  
*Skvrny kožní* 10, 21b, d, 23, 57, 76, 102b, 106, 130b, 180.  
*Slabost těla* 13, 34, 58, 60d, 71, 102, 145, 173, 195, 196.  
*Sněť* 13, 21b, 33, 36, 132, 158, 164, 193b.  
*Souchotiny* 2, 14, 39, 60a, d, 63a, b, 65, 83, 95, 114, 134, 137, 153, 173, 176, 184, 189, 203, 206, 211, 218.  
*Spdleniny* 9, 65, 82, 110c, 111b, 132, 133, 175, 193b, 206, 208.  
*Spaní nepokojné a přílišné* 106, 114, 183, 198.  
*Srdeční vady, tlučení, třesení* 3, 47, 50, 69, 112, 120, 125, 185.  
*Svrab* 17, 31, 49, 100, 136, 150, 178, 199, 212, 225, 229.  
*Tasemnice* 21, 60, 70, 131, 165.  
*Úbyté* 9, 34, 59, 61, 136, 145c, 182, 218.  
*Uhry* 33, 132, 210, 224.  
*Ústknutí hadem* 13, 21b, 23, 30, 37, 38, 47, 56, 69, 91, 94, 111b, 147, 200, 208, 213, 227.  
*Úplavice (červená)* 12, 18, 31, 36, 42, 62, 65, 67, 73, 77, 84, 89, 92, 93, 101, 106, 110d, 118b, 130, 157, 161, 163, 166b, 167, 170, 180, 189, 198, 204, 206, 208, 215, 217, 218, 221, 222.  
*Věry* 5a, 35, 69, 75, 87, 88, 117, 174, 183, 219.  
*Vyhřez pošvy a střeva* 30, 34.  
*Vymknutí z kloubů* 111b, 132, 145.  
*Vyrdčky kožní* 6a, 17, 44, 49, 50, 53, 55, 59, 60d, 80, 81, 98, 109, 110, 113, 116, 117, 118b, 127, 132, 147, 148, 165, 171, 175, 193b, 199, 209, 210, 221, 223.  
*Vodnatelnost* 4, 6a, b, 8, 10, 17, 20, 21d, 30, 44, 50, 54, 55, 60, 63b, 74, 81, 86, 92, 97, 99, 100, 108, 109, 111b, 113, 115, 117, 120, 129, 142, 145, 146, 150b, 155, 165, 178, 182, 193, 194b, 197, 202, 205, 209, 212, 213, 223, 224, 227.

*Vole* 98, 193, 208, 221.

*Vředy* (vřbec) 9, 17, 21a, d, 26, 27, 33, 65, 67, 84, 101, 102b, 103, 111b, 130, 132, 134, 135, 150, 166b, 170, 190, 204, 212, 215, 217, 224, 227, 229.

*Vředy pŕŕijícné* 80, 138.

*Vředy rakovité* (zlé) 72, 80, 150, 174, 175, 209, 221.

*Vředy rozŕŕající se* (rozjedlé, krtičné) 15, 23, 30, 33, 109, 138, 222.

*Vředy hnisající, mokvající* 11, 30, 40, 46, 47, 106, 144, 167, 180, 200, 221.

*Vředy sněživé* (hnílé, smrduté, zastaralé) 55, 60, 64, 81, 93, 98, 144, 175, 183, 201, 209.

*Vředy v ústech a krku* 10, 18, 94, 118b, 131, 139, 164, 166b, 174, 221.

*Vřetnutí pro:* 8, 9, 17, 76, 132, *proti:* 45, 58, 86, 121.

*Vš a hnidy* 15, 17, 72, 188, 200, 224, 229.

*Vzteklina* 45, 47, 99, 126, 213, 224, 227.

*Zácpa* 4, 6b, 8, 9, 11, 16, 17, 56, 69, 76, 81, 85, 86, 99, 100, 103, 105, 111b, 113, 120, 125, 127, 131, 179, 188, 191, 193, 194, 199, 201, 207, 223, 229,

*Zácpa jater* 8, 16, 24, 30, 37, 52, 63b, 105, 117, 142, 161, 165, 178, 182, 209, 222, 223, 224.

*Zácpa nosu* 3, 17, 19, 86, 286.

*Zácpa sleziny* 8, 16, 24, 37, 52, 74, 117, 161, 165, 178, 182, 222, 223, 224.

*Zácpa žlázy okružní* 59, 61, 78, 81, 115, 148, 182, 212, 223, 224.

*Zánět mandlí* 6a, 26, 33, 34, 166, 177, 195, 225.

*Záškrt* 18, 18, 20, 86, 144, 177.

*Závrat* 47, 104, 125, 162, 172, 183.

*Zaŕŕtvání* (trávení) *slabé, nesnadné, špatné* 28b, 29, 32, 45, 48, 58, 121, 122, 136, 138, 145a, c, 170, 197, 209, 216, 224.

*Zhmoŕŕděnny vnější a vnitřní* 21b, 48, 65, 104, 155, 158, 172, 186, 228.

*Zlínice* 10, 13, 17, 21, 24, 31, 40, 45, 56, 63b, 65, 71, 74, 78, 81, 86, 97, 102, 106, 134, 149, 150, 154, 157, 166b, 175, 178, 189, 197, 200, 207, 209, 212, 216, 219, 221, 223, 224.

*Zlatá žíla* (vřbec) 30, 65, 77, 100, 140, 157, 182, 198, 206, 212, 223, 224, 229.

*Zlatá žíla krvácející:* 60, 71, 89, 168, *oduřelá* (oteklá), *s nádorky:* 21b, 26, 34, 111, 118, 133, 186, *zastavená:* 17, 80.

*Zubů bolení* 15, 47, 53, 63b, 89, 91, 130b, 135, 142, 150, 183, 200, 213, 221.

*Žáha* 35, 45, 87, 95, 145, 198.

*Žlázy opuchlé* 6a, 79, 105.

*Žloutenice* 7, 8, 10, 15, 16, 24, 32, 45, 48, 51, 52, 53, 60, 63b, 72, 74, 78, 86, 91, 105, 111b, 113, 115, 117, 120, 125, 126, 127, 129, 134, 138, 139, 142, 145, 147, 150b, 165, 169, 178, 182, 193, 199, 200, 209, 212, 221, 222, 223, 224, 229.

## Seznam některých soujmen nemocí, u lidu obvyklých.

- Apostema, apostíla viz hlíza.  
Bakule, boule viz nádor.  
Běhavka prudká viz průjem.  
Bélmo viz oči zakalené.  
Bésnost viz vzteklna.  
Bílý tok, bílý květ viz bělotok.  
Bílková moč viz močení bílkovinné.  
Bledá nemoc, blednička viz blednice.  
Boláky, bolavé nohy viz vředy.  
Bolesti v údech viz nemoce údů.  
Boule krvavá viz nežít.  
Božec viz psotník.  
Boží moc viz padůcnice.  
Bradavky prs rozprýkané, bolavé viz  
podlomky bradavek.  
Cecek, cic zapálený viz podlomky bra-  
davek.  
Čas nebo běh ženský, žen viz čmýra.  
Červenka, červený tok, červená nemoc  
viz úplavice.  
Červi ve střevách viz hlísty.  
Dýchání obtížné, krátký dech viz duš-  
nost.  
Dýchavice, dýchavost, dušení na prsou  
viz dýchavičnost.  
Dýmnost viz hysterie.  
Fistule viz pšátěl.  
Francouzská nemoc, francouzi viz pří-  
jice.  
Gicht, gift viz dna.  
Hypochondrie to jest zádumčivost, těž-  
komyslnost viz nemoce duševní.  
Honeček bolavý viz podlomky bradavek.  
Hoř viz záha.  
Hostí neb věci dostati viz čmýra.  
Houby v ústech viz moučnisk.  
Chrapot, chraptivý neb sípavý hlas viz  
chraptivost.  
Chřadnutí viz slabost těla.  
Chronická nemoc tolik co počasná,  
dlouho trvající.  
Chvístačka viz běhavka.  
Jahody na těle viz skvrny kožní.  
Kámen v měchýři viz kámen moční.  
Kámen sutý v moči viz písek močový.  
Kapačka viz kapavka.  
Kašel zádušný, dávný viz kašel dnšný.  
Kašláni, pliváni neb chrkání krve viz  
chrlení krve.  
Křeče od matky viz hysterie.  
Křepčivost viz posuncina.  
Kvítek viz čmýra.  
Lichodárka viz zimnice.  
Maso vojenské, vojské, plíné viz maso  
divoké.  
Měsíčky viz čmýra.  
Městky v zadku viz zlaté žíly nádorky.  
Moč vyhánějící, na moč ženoucí věci  
viz moč vypuzující léky.  
Mze viz úbytě.  
Nemoc sv. Valentina viz padůcnice.  
Nemoci matky, matěrníku, matečnicku,  
dětince viz nemoci dělohy.  
Nemoc tajná, ženská viz čmýra.  
Nemoc vnitřní horečnatá, palčivá, zá-  
nětná viz horečka.  
Neštovice krevné viz zlatá žíla odn-  
řelá, nádorky.  
Obmék viz běhavka.  
Oblak černý viz oči zakalené.  
Oči lojdaivé viz oči krhavé.  
Oheň svatý viz růže.  
Ohnipera, ohnipara viz chrasty.  
Omdlení, padnutí do mdlob viz mdloba.  
Opálení, opáleníny viz spáleníny.  
Opar viz chrasty.  
Opaření od potu, tepla viz opruzení.  
Padoucí nemoc viz padůcnice.  
Pakostnice viz dna.



Paměť slabá viz nemoce duševní.  
 Píštělka viz píštěl.  
 Plavel očí viz oči krhavé.  
 Počasná nemoc tolik co chronická,  
 provléklá, loundavá, dlouho trvající.  
 Pomatenost viz nemoce duševní.  
 Pominulost viz vzteklina.  
 Popálení, popáleniny viz spáleniny.  
 Povlak oční viz oči zakalené.  
 Prašivina viz chrasty.  
 Řezavka viz močení palčivé neb ka-  
 pavé.  
 Revma, rekma viz hostec.  
 Rheumatické bolesti viz hostec.  
 Roupý viz hlísty.  
 Ruka Páně se ho dotkla neb mrtvice  
 ho ranila viz mrtvice.  
 Sesek, sosec, struk bolavý viz pod-  
 lomky bradavek.  
 Syfilis viz pŕŕjice.  
 Škleslost sil viz slabost těla.  
 Skorbut viz kurděje.  
 Skrofule viz krtice.  
 Slezotok viz bělotok.  
 Slezotok viz oči krhavé.  
 Smahy viz skvrny kožní.  
 Smrkavka viz rýma.  
 Snědek viz úbytě.  
 Spanlivost viz spaní přílišné.  
 Stok talový viz hlíza.  
 Strouhavka viz močení palčivé, kapavé.  
 Strupy viz chrasty.  
 Suché lámání viz dna.  
 Šílenost viz nemoce duševní.  
 Škrkavky viz hlísty.  
 Štětky viz fiky.

Těkačka jedovatá viz kapavka.  
 Temnota oční viz oči zakalené.  
 Těžkomyslnost viz nemoce duševní.  
 Tyfus viz hlavnička.  
 Tracení viz běhavka.  
 Trávení viz zažívání.  
 Treštivost viz nemoce duševní.  
 Tripper, tripr, tripl viz kapavka.  
 Trudy viz uhry.  
 Uhlík viz nežit.  
 Ujímání břicha viz hrýzení.  
 Úročky viz chrasty.  
 Vřed tajný viz hlíza.  
 Vrtošivost viz nemoce duševní.  
 Vsteklost viz vzteklina.  
 Záděch, záduch, záducha viz kašel  
 dušný.  
 Zádumčivost viz nemoce duševní.  
 Zákal očí viz oči zakalené.  
 Zástava moče viz močení zastavené.  
 Zhmoždění viz zhmožděniný.  
 Zimnice studená dvou-tří-čtvrto denní  
 viz zimnice.  
 Zlá pára viz hysterie.  
 Znamení, znaménka neb kazy na těle  
 od narození viz skvrny kožní.  
 Zrak slabý, zesláblý viz oči slabé.  
 Zrak zakalený, nečistý, temný viz oči  
 zakalené.  
 Žábry viz mončnŕk.  
 Žíly krvavé v zadku viz zlaté žíly  
 nádorky.  
 Žíly napuchlé, křečovité, potrhané (na  
 nohou) viz městky.  
 Žlutiny viz skvrny kožní.

# Kalendář ku sbírání rostlin pro lékárnu.

## Leden.

V lednu se nesbírá nic.

## Únor.

*Kořen.* Čemeřice černá. — Jmélí obecné; ochmet evropský.

## Brezen.

*Kůra* krušiny obecné, kaštanu, lýkovce obecného, střemchy, dubu, vrby, jilmu. *Kořen* anjeliky větší, proskurníku lékařského a lopuchu pavučinatého (2letý), aronu skvrnatého, prhy chlumní, šíšvorce, kostivalu lékařského, omanu pravého, pýru plazivého, všedobru horního, libečku lékařského, jehlice trnité, pivoňky lék., petržele kuchyňské, osladiče obecného, smetanky obecné, mochny lesní, kozlíku lék. *Větvičky* lilku sladkohořkého.

## Duben.

*Kůra* dubu, vrby. *Květ* trnky, podběle obecného, violky vonné. *List* medvědice lékařské. *Nať* jaterníku trojlaločného, plicníku obecného, koniklece, smetanky obecné i s kořenem. *Kořen* prhy chlumní, lopuchu pavučinatého, šíšvorce čekanky obecné, kostivalu lék., omanu pravého, pýru plazivého, libečku lék., jehlice trnité, pivoňky lék., smetanky i s natí, mochny lesní.

## Květen.

*Květ* konvalinky, hluchavky bílé, lilie, broskve, prvosenky neb petrklíče, rosmariny, violky vonné. *List* plicníku. *Nať* medvědice, vlašovičnicku, křenu, bolehlava, podběle, zemědýmu, oponce, macešky, slezu, plicníku, febríček, routy, šalvěje, vrátíče.

## Červen.

*Květ* proskurníka, prhy, brutnáka, měsíčka, heřmánku, chrpy, slézu, máku, růže, bezu, lípy. *List* čekanky, dubu, medvědice. — Jahody červené. — *Nať* pelyňky, prhy, brutnáku, konopě, zeměžluče, plaménku, podběle, zemědýmu, konitrodu, ysopu, rojovníku, slézu, jablečnicku, heřmánku, melisy, máty, bažanky, febríčku, vítođu, rosmariny, routy, šalvěje, mydlice, chrastavce, bindase, ožanky, donáky, rozrazilu, macešky.

## Červenec.

*Plod* meruzalky červené, malinníka, černé jahody, makovice. *Květ* světlice, heřmánku, třezalky, levandule, lilie, slézu zahradního, lípy, divizny. *List* ořechu a nezralé ořechy. — *Nař* pelyňky, proskurníka, zeměžluče, merlíku, čekanky, světlíku, konopíce, třezalky, lociky, lnice, jablečníku, marjánky, komonice, máty, dobromyslu, poleje, satureje, ožanky, chrastavce, vrátice, divizny.

## Srpen.

*Plod* moruše, černé jahody, malinníku, bezu, kaštany, žaludy. *Květ* proskurníku, levandule, slézu zahradního, komonice. *Nař* pelyňky, černobýla, konitrudu, komonice, šibru, zlatobýlu. *Kořen* prhy, čemežice. *Semeno* lnu, plavaně, haluchy, maku, hořčice.

## Září.

*Plod* dřívěálu, chebdí, jalovce, bezu, chmele; zelené šlupky ořechu. *Crocus*. *Kůra* ořechu. *Kořen* prhy, pelyňky, šišvorce, čekanky, omanu, kapradě samce, hořce, osladiče, mařiny barviřské, mydlice, pampelišky, mochny, kozlíku. *Semeno* anýsu, petržele, hořčice černé; větvičky lilku sladkohořkého.

## Říjen.

*Plod* dřívěálu, chebdí, jalovce, bezu, chmele; zelené šlupky ořechu; *Crocus*, *Kůra* ořechu. *Kořen* prhy, proskurníku, aronu, pelyňky, chřestu, posedu, šišvorce, čekanky, omanu, kapradě samce, hořce, pýru plazivého, konitrudu, všedobru, kosatce, osladiče, mařiny barviřské, mydlice, pampelišky, mochny, kozlíku. *Semeno* anýsu, petržele, hořčice černé. *Větvičky* lilku sladkohořkého.

## Listopad.

Listopad nemá rostlin ku sbírání jako i následující měsíc

## Prosinec.

---

# Seznam hospodářsko-průmyslový.

Číslice naznačuje rostlinu dle abecedního pořádku v jmenované věci potřebnou.

- Barva černá** 10, 106, 123, 135, 138, 170, 190, 207.  
" **červená** 32, 109, 119, 130, 149, 191, 193, 212, 216, 221, 224.  
" **fialová** 6a, b, 125c.  
" **hnědá** 6, 31, 32, 56, 106, 125a, c, d, 135, 138, 190.  
" **modrá** 6a, b, 13, 56, 139, 170, 212.  
" **rezavá** 9, 31, 109.  
" **šedá** 9, 71, 106, 190, 224.  
" **zelená** 32, 80, 99, 100, 109, 144, 188, 209, 224.  
" **žlutá** 6, 10, 31, 32, 41, 55, 56, 64, 71, 80, 110c, 125, 186, 193b, 209, 212, 217, 223, 224, 229.
- Bednářství** 10, 31 56, 60, 100, 110.  
**Bezové kuličky elektrické** 6.  
**Cídění nádobí a šatu** 32, 148, 157.  
**Cukr** 15, 110c.  
**Čerň pro knih- a mědotiskaře** 10, 106, 170, 190.  
**Dehet, kolomaz** 10, 60.  
**Dříví ku stavbám pevným a vodním** 34, 60, 135.  
**Draslo** 55, 71, 209.  
**Hnojivo zvláštní** 71, 167.  
**Hříběcí koní** 150, 204.  
**Chmel a jeho zástupce** 28, 45, 48, 55, 171, 200, 209, 224.  
**Inkoust černý** 34, 106, 190.  
" **červený** 32.  
" **zelený** 80, 188.  
" **žlutý** 7.
- Kadidlo** 60d.  
**Káva** 16, 32.  
**Kolářství** 10, 31, 56, 60, 125b.  
**Koření kuchyňské** 19, 22, 28b, 29b, 35, 54, 75, 101, 146, 170, 195.  
**Kořalka** 1, 6, 12, 31, 32, 45, 53, 54, 62, 71, 75, 110c, 118, 125a, c, 143, 163, 170, 189.  
**Košikářství** 64, 110, 112, 150, 163, 216.  
**Košata** 10, 55, 99.  
**Koželužství** 6, 9, 10, 12, 31, 32, 34, 56, 60, 62, 64, 67, 106, 110c, 123, 130, 135, 171, 200, 203, 221, 224.  
**Lak a fermež** 107, 119.  
**Lep na ptáky a mouchy** 66, 134.  
**Lícidlo červené** 76, 191.  
**Mouka** 7, 23, 59, 71, 76, 94, 110c, 123, 140, 143, 163, 209.  
**Nakládané plody** 31, 32, 87, 110c, d, 125, 129, 138, 201c.  
**Nemoci travidel dobytka, žloutenice a vodnatelnost** 6, 17, 45, 209.

- Obrazy zvukové k silozpytu** 151.  
**Ocet** 6, 32, 53, 62, 110c, 118, 125a, d, 170.  
**Ohňostrojetví** 60d, 151.  
**Olej k jídlu, malířství a svícení** 32, 44, 75, 82, 107, 112, 138, 170, 177, 212.  
**Omáčka k jídlu** 6, 7, 21, 44, 87, 97, 110d.  
**Papír** 109, 131b, 150.  
**Píce pro dobytek vůbec** 7, 11, 15, 32, 59, 61, 64, 71, 84, 101, 107, 110c, 112, 123, 124, 125b, d, 135, 167, 190.  
**Píce zvlášť pro koně** 143, 188, 209.  
   "   "   "   kozy 125, 139, 167, 188, 209.  
   "   "   "   ovce 55, 64, 75, 125, 188, 194.  
   "   "   "   vepřový dobytek 34, 94, 125, 166b, 167, 170.  
**Pivo** 48, 59, 110c, 125c, 143, 163.  
**Plody jedlé, syrové neb nakládané** 31, 32, 53, 125, 129, 131, 138, 170, 201b.  
**Ploty živé** 32, 42, 103, 125b, d, 135, 164.  
**Polévka bylinná** 43, 137, 140, 163.  
**Potrava bonrcům hedvábným** 131b.  
**Potrava ptákům** 9, 32, 54, 60, 62, 65, 82, 164.  
**Povidla** 6, 12, 118.  
**Příze a plátno** 82, 89, 110c, 107.  
**Prašivina koňů a ovcí** 6, 17.  
**Provaznictví** 55, 82, 107, 150.  
**Puškarství** 6, 138, 189, 225.  
**Řezbářství** 60, 62, 64, 71, 112, 135, 203, 216.  
**Salát** 1, 13, 15, 16b, 48, 50, 72, 76, 89, 95, 103, 105, 128, 129, 142, 156, 201c, 213.  
**Silice** 5, 54.  
**Sýr** 193b.  
**Syrub** 53, 54.  
**Sláma** 59, 143, 163.  
**Smdla** 60d.  
**Soustružnictví** 6, 10, 31, 32, 42, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 71, 112, 131b, 135, 138, 164, 189, 200, 216, 225.  
**Stelivo zvláštní** 55, 60, 64, 70.  
**Svíce** 110c.  
**Škrob** 71, 110c, 149, 163.  
**Tabák kuřlavý** 110c, 123.  
**Terpentin** 60.  
**Thé** 12, 28, 31, 125c, 149, 176.  
**Truhlářství** 6, 10, 31, 32, 34, 54, 55, 56, 60, 64, 112, 131b, 135, 138, 150, 189, 203, 216, 225.  
**Uhlí ku cídění mosaze, mědi, ocele** 6.  
**Uhlí ku kreslení** 112.  
**Uhlí k letování** 10, 56, 60.  
**Uhlí k střelnému prachu** 100, 112, 203, 225.  
**Upevnění hrází a břehů** 110, 135, 216.  
**Včelařství** 7, 29, 32, 38, 71, 112, 125a, d, 139, 171, 207, 209, 224, 225, 227.  
**Víno** 6, 10, 31, 32, 53, 54, 110c, 118, 120, 125a, c, d, 136, 170, 207.  
**Vysušení bahen** 209, 216.  
**Vředy talovité koňů** 80, 212.  
**Zahradnictví ozdobné** 9, 42, 44, 54, 57, 58, 67, 103, 127, 132, 145c, 150, 161, 164, 172, 179, 181, 191, 203, 205, 210, 216, 220, 225.  
**Zapuzení štěnic, blech, švábů, cvrčků, molů, pilousů, včel, mšic a housenek ob,**  
   67, 71, 104, 110, 189, 190, 208, 214.  
**Zavařenina** 32, 53, 118, 125, 201b.

# Seznam hlavních druhů rostlin

dle čísel a pořádku abecedního.

1. *Anjelika* větší.
2. *Aron* skvrnatý.
3. *Bazalika* obecná.
4. *Bažanka* polní.
5. *Bedrník* anýz, a *bedrník* obecný.
6. *Bez* černý; bez chebd.
7. *Blatouch* bahní.
8. *Brambořík* obecný.
9. *Břečtan* obecný.
10. *Bříza* obecná.
11. *Brukev* obecná; kerlubna, karfiol, zelí hlavaté, kapusta, jarmuz.
12. *Brusnice* borůvka.
13. *Brutnák* obecný.
14. *Bukvice* lékařská.
15. *Cvikla*.
16. *Čekanka* obecná; štěrbák.
17. *Čemeřice* černá; čem. zelená.
18. *Černohlávek* obecný.
19. *Černucha* rolní; čer. setá a zahr.
20. *Čertkus* luční.
21. *Česnek* kuchyňský, pažitka, pór zahradní, cibule opečná.
22. *Čibr* obecný.
23. *Ďáblík* bahenní.
24. *Dejvovec* mrkvovitý.
25. *Denivka* žlutá; den. plavá.
26. *Dymnívka* dutá; dym. prstnatá a bobovitá.
27. *Divižna* velkokvětá a malokvětá.
28. *Dobromysl* obecná a voněkras.
29. *Douška* úskolistá a vlašská.
30. *Drchnička* rolní.
31. *Dřín*.
32. *Dřítáň* obecný.
33. *Drnavec* lékařský.
34. *Dub* zimní, šipák a letní.
35. *Fenykl* obecný.
36. *Hadí jazyk* obecný.
37. *Hadí mord* španělský a nízký.
38. *Hadinec* obecný.
39. *Halucha* kmín vodní.
40. *Heřmánek* pravý a římský.
41. *Hlaváček* jarní.
42. *Hloh* obecný, ostrolistý, červcový a leskutý.
43. *Hluchavka* bílá.
44. *Hořčice* bílá a černá.
45. *Hořec* šumavský, tolitový, brvitý, křížatý a obecný.
46. *Hruštička* menší, prostřední a okrouhlostá.
47. *Hvozdík* lesní a zahradní.
48. *Chmel* obecný.
49. *Chrastavec* polní.
50. *Chřest* obecný.
51. *Chřpa* polní.
52. *Jablečník* obecný.
53. *Jahodník* obecný.
54. *Jalovec* obecný.
55. *Janovec* vítečník.
56. *Jasan* ztepilý a manový.
57. *Jasmín* obecný.
58. *Jaterník* trojlaločný.
59. *Ječmen* obecný, dvouřadý, rýžový, nahý, čtyřřádkový, zimní, himalajský, jeruzalemský.
60. *Jedle*, modřín, smrk, borovice.
61. *Jehlice* trnitá.
62. *Jeřáb* obecný.
63. *Jestřábek* okoličnatý, zední, chlupáček a myší ouško.
64. *Jilm* polní.
65. *Jitrocel* kopinatý, prostřední a větší.
66. *Jméli* obecné.
67. *Kakost* smrdutý, luční a krvavý.
68. *Kamejka* lékařská.
69. *Kamzičník* rakouský.
70. *Kaprad* samec.
71. *Kaštan* koňský.
72. *Kerblík* setý.
73. *Kyprej* obecný.

74. *Kyvor lékařský.*  
 75. *Kmín luční.*  
 76. *Kokořík obecný a mnohokvětý.*  
 77. *Kokoška pastuší tobolka.*  
 78. *Kokotice větší a menší.*  
 79. *Komonice lékařská.*  
 80. *Koniklec luční a obecný.*  
 81. *Konitrud lékařský.*  
 82. *Konopě setá, poskonná a hlavatá.*  
 83. *Konopice huňatá.*  
 84. *Kontryhel obecný.*  
 85. *Konvalinka vonná.*  
 86. *Kopytník obecný.*  
 87. *Kopr zahradnický.*  
 88. *Kopretina řimbaba.*  
 89. *Kopřiva veliká.*  
 90. *Koprník úzkotistý.*  
 91. *Koryandr setý.*  
 92. *Kosatec žlutý a florentinský.*  
 93. *Kostival lékařský.*  
 94. *Kotvice vzplývavá.*  
 95. *Koží brada luční, východní, větší a fialová.*  
 96. *Kozlík lékařský.*  
 97. *Křen polní.*  
 98. *Krtičník hliznatý a čtyřkrídlý.*  
 99. *Krucinka barvířská.*  
 100. *Krušina obecná.*  
 101. *Krvavec obecný.*  
 102. *Kuklík obecný a potočný.*  
 103. *Kustovnice obecná.*  
 104. *Lavandule obecná.*  
 105. *Lebeda lesklá a zahradní.*  
 106. *Leknín bělostný.*  
 107. *Len setý, mlatcový a hledivý.*  
 108. *Libeček lékařský.*  
 109. *Lýkovec obecný.*  
 110. *Lílek sladkohořký, obecný, brambor a rajske jablko.*  
 111. *Lilie zlatohlavá a bílá.*  
 112. *Lipa malolistá, široolistá, stříbrná a americká.*  
 113. *Luice obecná.*  
 114. *Locika zahradní.*  
 115. *Lomikámen zřnatý a trojlaločný.*  
 116. *Lopuch pavučinatý.*  
 117. *Máčka polní.*  
 118. *Maliník obecný a ostružník.*  
 119. *Mařina barvířská.*  
 120. *Mařinka vonná.*  
 121. *Máta peprná, kadeřavá a polej.*  
 122. *Meduňka lékařská.*  
 123. *Medvědice lékařská.*  
 124. *Merlík vonný.*  
 125. *Meruzalka červená, horská, černá a srstka.*  
 126. *Měsíček zahradní.*  
 127. *Mydlíce lékařská.*  
 128. *Mléč hladký, ostrý a polní.*  
 129. *Mochyně boborolka.*  
 130. *Mochna lesní, husí, stříbrná, plavá a bílá.*  
 131. *Moruše černá a bílá.*  
 132. *Narcisek bílý, žlutý a tulipán.*  
 133. *Netřesk střešní.*  
 134. *Ochmet evropský.*  
 135. *Olise lepká.*  
 136. *Oman pravý.*  
 137. *Oponec obecný.*  
 138. *Ořešák královský.*  
 139. *Orlíček obecný.*  
 140. *Orsej jarní.*  
 141. *Osladič obecný.*  
 142. *Ostropěstřec obecný.*  
 143. *Oves setý a smeták.*  
 144. *Ožanka ěpavá.*  
 145. *Pelyněk pravý, černobýl a dřevinka.*  
 146. *Petržel kuchyňská.*  
 147. *Pilát lékařský.*  
 148. *Pýr plazivý.*  
 149. *Pivoňka lékařská.*  
 150. *Pamének přímý a plotní.*  
 151. *Plavuň obecná.*  
 152. *Plícník obecný.*  
 153. *Podběl obecný.*  
 154. *Podražec obecný.*  
 155. *Posed černý.*  
 156. *Poločnice lékařská.*  
 157. *Přeslička polní, bahenní, lesní a mokřadní.*  
 158. *Prha chlumní.*  
 159. *Pryšec obecný a chvojka.*  
 160. *Proskurník lékařský.*  
 161. *Protěž písečná.*  
 162. *Prvosenka obecná.*  
 163. *Pšenice obecná.*  
 164. *Ptáci - ob.*  
 165. *Pupava bílá.*  
 166. *Rdesno hadí kořen a truskavec.*  
 167. *Rdest vzplývavý, prorostlý, hřebovitý, hustolistý, dlouhý a špičatolistý.*  
 168. *Řebříček obecný.*  
 169. *Řepík lékařský.*  
 170. *Réva vinná.*  
 171. *Rojovník bahenní.*  
 172. *Rosmarina obecná.*  
 173. *Rosnička okrouhlostá, dlouhostá a obvejčitá.*  
 174. *Routa obecná.*  
 175. *Rozchodník ostrý.*  
 176. *Rozrazil lékařský a potoční.*  
 177. *Růže nízká a stolistá.*  
 178. *Sadec konopáč.*  
 179. *Sedmikrás ozimá.*  
 180. *Sevlák široolistý.*  
 181. *Sléz okrouhlostý a zahradní.*  
 182. *Smetanka obecná.*  
 183. *Smlánek jelení a alsatský.*  
 184. *Sporyš lékařský.*

185. *Srdceček* obecný.  
 186. *Srpek* barvířský.  
 187. *Starček* obecný a příměťak.  
 188. *Šmačka* polní.  
 189. *Šťemcha* obecná.  
 190. *Stulík* žlutý.  
 191. *Světlice* barvířská.  
 192. *Světlik* lékařský.  
 193. *Svízel* obecný a syřišťový.  
 194. *Sylačec* rolní a většl.  
 195. *Salvěj* lékařská.  
 196. *Šipatka* vodní.  
 197. *Šišvorec* obecný.  
 198. *Šrucha* obecná.  
 199. *Štovík* tupolistý.  
 200. *Tamaryšek* obecný.  
 201. *Tykev* obecná, meloun a okurka.  
 202. *Tolita* lékařská.  
 203. *Topol* balšámový, černý a bílý.  
 204. *Toten* lékařský.  
 205. *Třemdava* bílá.  
 206. *Třezalka* tečkovaná, čtyřkřídla a čtyřhranná.  
 207. *Trnka*.  
 208. *Užanka* lékařská.
209. *Vachta* třílistá.  
 210. *Violka* vonná a trojbarevná.  
 211. *Vitod* hořký a obecný.  
 212. *Vlašťovičník* většl.  
 213. *Vraní nožka*.  
 214. *Vratič* obecný.  
 215. *Vratička* obecná.  
 216. *Vrba* bílá, žlutá, křehká, mandlová, koňarská, smutková a jíva.  
 217. *Vrbina* penízková a obecná.  
 218. *Vstavač* obecný a mužský.  
 219. *Všedobr* horní.  
 220. *Ysop* lékařský.  
 221. *Zábělník* bahenní.  
 222. *Zběhovec* plazivý.  
 223. *Zemědým* lékařský.  
 224. *Zeměžiuč* obecná.  
 225. *Zimoléz* obecný, kozí list německý a obecný.  
 226. *Zlatobýl* obecný.  
 227. *Žabník* jitrocelový.  
 228. *Žindava* evropská.  
 229. *Žlutucha* menší, orlíčkolistá, smrdutá, jednoduchá, luční a úzkolistá.

